

Supplementa as lichenæam africanam

Autor(en): **Stizenberger, E.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft**

Band (Jahr): **33 (1891-1892)**

PDF erstellt am: **04.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-834592>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

IV.

SUPPLEMENTA

AD

LICHENÆAM AFRICANAM

—
I.

DENUO ADDENDA ET CORRIGENDA

SCRIPSIT

DR. E. STIZENBERGER.

11 et 16. Etiam in Persia.

16^{bis}. **Omphalaria arabica** Müll. in Flora 1891 p. 371. —
Supra terram in Wadi Mokottab peninsulæ Sinaiticæ:
Rüttimeyer. — Persia.

21. *Collema furvum* extra Africam etiam in Tonkin.

31. Loco „Ach. l. c.“ inserendum est „(Meth. p. 233)
L. U.“

35. F. **isidiosa** Müll. in Flora 1882 p. 292. — In Usam-
bara: Hans Meyer. — Extra Africam in Java et Nova
Hollandia.

36. *Corticicola* in Usambara: Hans Meyer. — Extra Afri-
cam etiam in Japonia.

51. Extra Africam etiam in Tonkin.

52 et 57. Potius in genere *Stephanophoro* collocanda.

60. *Leptogium bullatum* in Madagascar: Hildebrandt. Var.
dactylinoides etiam in Mexico et Nova Granata.

- 71 et 72. Utrumque nunc a Müllero sub genere *Heppia*
nuncupatur.
100. Etiam in Brasilia.
101. Etiam in Columbia.
106. Loco „Bory Voy. 3“ legendum „Bory Voy. 2“.
111. Extra Africam etiam in Japonia.
112. In insulis Canariis teste Leight.
114. Teste Leight. in Teneriffa: Perraudière. Extra Africam in Nova Hollandia occidentali.
117. In Algeria et in insula Teneriffa.
119. Var. *tubæformis* in insula Tristan d'Acunha; var. *chondroidea* cum f. *chlorophæoide* et var. *Balfourii* extra Africam in Australia et America distributa; var. *pulverulenta* etiam in Australia.
121. In insula Madagascar; extra Africam in Asia, Australia et America centrali et septentrionali reperta.
123. Etiam in Japonia.
126. In insulis Teneriffa: Bourgeau et Ascensionis: Hooker.
131. Teste Wainio in Africa endem.
135. F. *foliolosa* etiam in Japonia et Brasilia.
136. Typus super ligna in insula Madagascar.
- 136^{bis}. **Cladonia Delessertii** (Del., Nyl.) var. **subdivaricata** Wain. in lit. — Super ligna in insula Madagascar. — Endem.
140. Etiam in Brasilia.
- 144^{bis}. **Cladonia flabelliformis** (Flk.) var. **tenella** Müll. in Flora 1891 p. 372. — Super ligna cariosa in Monte Tabulari ad Promontorium Bonæ Spei: Wilms. — Endem.
145. *C. macilenta* ad flumen Kongo: Hens.
- 146^{bis}. **Cladonia pileata** Mnt. Chil. p. 161. — In monte Pouce insulæ Sancti Mauritii: Ayres. — Chile.

- 149^{bis.} **Cladina alpestris** (L. Spec. p. 1153) Nyl. Ber. p. 19.
 — In insula Sancti Mauritii: Boyer. — Europ., Asia,
 Austral., Amer.
153. Etiam in insula Madagascar.
163. Nunc ab ipso autore ad 168 (*Ramalinam gracilem*)
 refertur.
165. Var. *minor* etiam in Australia et Brasilia; var. *nodu-*
losa etiam in Japonia.
175. *Vulgaris* prope Taveta in territorio Sansibar: Hans
 Meyer.
184. Etiam in Costarica.
185. Etiam in Tonkin.
186. Etiam in Australia.
188. *Typus* etiam in Japonia.
193. Circa lacus de Natro cognominatos in occidentali in-
 ferioris Aegypti parte: Sickenberger.
195. Etiam in Arabia petræa.
197. Loco „(Dicks. Pl. crypt. 3 p. 18)“ legendum „(Retz.
 Obs. bot. IV p. 30)“.
222. Var. *sorediifera* etiam in Brasilia. — Var. **farinosa**
 Müll. in Flora 1891 p. 373. — In Africa australi:
 MacOwan. — Endem.
223. Etiam in Australia.
224. Etiam in Brasilia et Costarica.
226. *U. dasypogoides* et 227 var. *flexuosa* etiam in Costarica.
229. „Brasilia“ delenda est.
230. F. *scabrosa* etiam in Japonia; F. *aspera* teste Müll.
 in Hedw. 1891 p. 223 ad *U. floridam* var. *comosam*
 (Ach. in N. Act. Stockh. V, 16 p. 209) Wain. Bras. I
 p. 3 referenda; extra Africam in India orientali reperta.
223. Var. **horridula** Müll. in Flora 1891 p. 372. — Port
 Natal: Plant. — Endem.

242. Etiam in Birma.
245. Etiam in Asia arctica.
- 254^{bis}. **Parmelia ecaperata** Müll. in Flora 1891 p. 378.
— Supra truncos Palmarum secus flumen Shire inter lacum Nyassa et flumen Zambesi: Kirk. — Endem.
259. Var. *hypoclysta* et f. *isidiosa* extra Africam etiam in Nova Hollandia. — Var. **polyphylla** Mey.-Fw. in N. Act. Leop. XIX Suppl. I p. 220 f. **sorediosa** Müll. in Flora 1891 p. 378. — In insula Azorica San Miguel: Godmann. — Endem.
271. Etiam in Japonia.
282. F. *sorediifera* etiam in Columbia et Costarica.
284. Etiam in Australia.
292. F. *isidiosa* etiam in Brasilia et in India orientali; f. *sorediata* etiam in Manipur et in Antillis.
- 292^{bis}. **Parmelia Macleyana** Müll. in Flora 1891 p. 376.
— In Africa meridionali capricornica (Hb. Kew). — Endem.
294. Non est *P. urceolata* Eschw., sed potius **P. Hildebrandtii** Krmpfh. (cfr. Müll. in Flora 1891 p. 376). F. *nuda* etiam prope Lydenburg: Wilms et extra Africam in republica Ecuador; f. *sorediifera* in insulis Johanna et Socotra: Schweinfurth, Nossi-be: Rensch, in Abyssinia et Terra Somali: Hildebrandt et in regione Zambesi: Kirk.
299. Etiam in Japonia.
300. In Africa orientali, occidentali et centrali, item plurimis in insulis africis inventa; extra Africam in Asia orientali, Australia et America calidiore.
302. Etiam in Costarica.
- 303^{bis}. **Parmelia subquercina** Müll. in Flora 1891 p. 377.
— Saxifraga in Africa australi: MacOwan. — Endem.

307. In insula Sancti Mauritii: Robillard. Extra Africam in Manipur.
- 307^{bis}. **Parmelia cervicornis** Tuck. in Wilkes Exp. p. 140
f. **isidiosa** Müll. in Flora 1891 p. 376. — Sterilis in insula Sancti Mauritii (Hb. Kew). — Planta typica in Amer. trop. et inss. Sandwich.
318. In monte Kilimandscharo: Hans Meyer.
- 321^{bis}. **Parmelia leptophylla** Müll. in Flora 1891 p. 377.
— Corticicola in Baziya: Baur (Hb. Kew). — Endem.
325. Etiam in Costarica.
348. Var. *sorediifera* etiam in Australia.
- 351^{bis}. **Stictina foveolata** (Del. Stict. p. 101) Nyl. Syn. I p. 337. — Sterilis supra trunco muscosos in Schoa: Antinori. — Austral., Amer.
367. Var. *isidiosa* etiam in Japonia.
369. Var. *hypomela* etiam in India orientali.
370. Var. **scrobiculata** Müll. in Flora 1891 p. 374. — In insula Madagascar: Baron. — Endem.
- 373 et 388. Etiam in Brasilia.
387. Typus etiam prope Manipur.
389. Etiam in Columbia.
404. Etiam in Japonia.
405. Extra Africam in Gallia occidentali. *P. polydactylæ* subsumenda videtur.
408. Var. *intermedia* etiam in Costarica; var. *crocea* etiam in Australia, Costarica et Brasilia.
- 411^{bis}. **Physcia perrugosa** Müll. in Flora 1891 p. 376 sub *Theloschiste*. — Prope Lupata in regione Zambesi: Kirk. — Endem.
415. Typus etiam in Nova Hollandia; de var. *aureola* primo apud Ach. L. U. p. 487 fit mentio.

425. Var. *angustifolia* etiam in Australia; var. *subcomosa* in Usambara et in Monte Kilimandscharo: Hans Meyer.
426. Etiam in Japonia.
430. Var. *sorediifera* etiam in Costarica et Brasilia.
438. Etiam in insula Labuan.
448. Etiam in Persia.
449. Est *Physcia speciosa* (Wulf.) var. *dactyliza* Nyl.
450. Typus etiam in Nova Hollandia; var. *virella* ibidem et in Costarica.
454. Etiam in Pyrenæis et in Nova Granata.
462. Super corticem arborum in insula Madagascar.
464. F. *sorediata* extra Africam in Asia orientali, Australia, Costarica et Paraguay; f. *isidiophora* etiam in Australia.
469. Var. *endoleuca* etiam in Costarica.
472. Etiam in Manipur et in insula australiensi Victory.
493. Etiam in Australia.
494. In linea infima loco „emortuorum“ legendum est „emortuarum“.
- 499 et 501. Etiam in Japonia.
- 514, 527 (*L. crassa*), 529 (f. *deserti*) et 534 (typus necnon var. *versicolor*) etiam in Persia.
547. Etiam in Costarica.
551. Ibidem supra ramulos *Salsolæ*; sporæ longit. 0,₀₁₄₋₁₉, crassit. 0,₀₀₆ mm. (longitudine superante crassitiem partibus duabus et dimidia vel tribus et dimidia): Hermann. Potius juxta *L. pyraceam* collocanda.
560. Late distributa in Europa; etiam in Persia.
570. Etiam in Europa.
574. Typus extra Africam etiam in Nova Hollandia.
577. Post „Ach.“ legendum „(Prodr. p. 43)“. Extra Africam etiam in Persia.

596. Etiam in Costarica.
601. Var. *lactea* etiam in Persia.
604. Etiam in Costarica.
613. Etiam prope Botzen in Tirolia.
640. Etiam in Persia.
647. Typus etiam in insula Labuan.
648. Etiam in Costarica.
650. Etiam in India orientali.
659. Typus etiam in Nova Hollandia; var. *aegyptiaca* etiam
in Persia.
660. Etiam in Australia.
676. Typus super saxa silicea prope Cairo: Sickenberger.
682. Var. *campestris* etiam in Nova Hollandia. Var. *glabra*
in India orientali.
685. Etiam in Australia.
691. Etiam in Costarica.
694. Etiam in India orientali et Costarica.
694^{bis.} (Add. et Corrig. I). In insulis Canariis (Bourgeau
exs. 634).
698. Etiam in insula Labuan.
699. Etiam in Australia.
702. Lichen africus endemicus.
707. Etiam in Japonia et Australia.
708. Etiam in India orientali.
716. Etiam in Europa.
719, 724 et 726. Etiam in Persia.
736. Etiam in insula Labuan.
741. Etiam in Australia.
751. Typus etiam in Hibernia.
753. Extra Africam etiam in Persia.
758. Typus etiam prope Manipur.
762. Etiam in India orientali et Australia.

764. Etiam in Lusitania.
774. Etiam in India orientali et Nova Hollandia.
777. Lichen africus endemicus.
781. Var. *Hoffmanni* etiam in Persia et in Japonia.
794. Typus etiam in Costarica.
802. Etiam in Nova Hollandia.
- 808 (typus), 809, 811 et 819 (typus) etiam in Persia; 811 insuper in Nova Hollandia.
829. Typus etiam in India orientali, Australia et Costarica.
832. Var. *arenaria* etiam in Nova Hollandia.
834. Etiam in Persia.
838. Etiam in Japonia.
851. In insula Madagascar.
- 853^{bis}. (Add. et Corrig. I). Etiam in Japonia et Australia; pariter 859 varr. *octospora* et *trypeteliiformis*.
866. Etiam in India orientali.
870. *P. pustulata* etiam in India orientali et Japonia.
875. Etiam in Costarica.
- 906^{bis}. **Ascidium postpositum** Nyl. in Nov.-Gran. Add. p. 552. — Corticicola ad flumen Kongo: Hens. — Nov.-Granat. — Prima et una sola *Ascidii* species quæ in Africa lecta est.
908. Etiam in insulis Antillis.
909. Etiam in Australia.
910. Etiam in Brasilia.
911. Etiam in Antillis et in Brasilia.
923. Typus etiam in Manipur.
933. Etiam in Australia.
940. Etiam in India orientali et Tonkin.
946. Nomen prius et proprium hujus speciei est **L. impressa** Krmpfh. in Flora 1876 p. 318. — Brasil.
981. Etiam in India orientali.

983. Etiam in Costarica.
1008. Cavendum ne hunc lichenem cum *L. subspadicea* Nyl.
Lab. p. 39 nec cum *L. subspadicea* Krmplh. in lit. ad
Glaziou (Flora 1876 p. 316) confundes.
- 1021 (typus), 1026 et 1030 etiam in Australia.
1040. Etiam in Persia.
1062. Typus etiam in India orientali et Japonia; var. *exigua*
in Costarica.
1078. Typus etiam in Australia.
1080. Typus in India orientali et Australia.
1081. Typus etiam in Japonia.
1093. Etiam in Australia et Costarica.
1115. Etiam in Persia.
- 1127 (typus), 1129 etiam in Australia.
1138. Typus in India orientali et Australia.
1148. Supra saxa arenacea prope lacus de Natro eognomina-
tos in Aegypto inferiore: Sickenberger. Extra Afri-
cam in Nova Hollandia.
1155. Varr. *epipolia* et *intermedia* etiam in Persia; var. *areo-
lata* supra saxa arenacea prope lacus de Natro cognominatos
in occidentali inferioris Aegypti parte: Sicken-
berger.
1157. Etiam in Japonia.
1160. F. *rugulosa* etiam in Australia.
1214. Etiam in Costarica.
1219. Etiam in Tonkin, Labuan et Costarica.
1225. Typus etiam in Nova Hollandia.
1226. Etiam in Singapore, Tonkin et Japonia.
1227. Est **Graphis analoga** * *subradiata* Nyl. Nov.-Gran.
p. 75 ut ait ipse Nylander in Lab. p. 12.
- 1229 et 1245 (typus) etiam in Costarica.
1247. Var. *plurifera* etiam in Australia.

1255. Eundem lichenem ac 1227 Nyl. in Lab. p. 12 esse demonstrat.
1256. Etiam in India orientali, insula Labuan et in Australia.
- 1263 (typus) et 1290 (typus) etiam in Australia; var. *abbreviata* extra Africam etiam in Costarica.
1291. Etiam in insula Labuan.
1352. Etiam in Australia et Costarica.
1357. Etiam in insula Labuan.
1373. Etiam in India orientali.
1375. Etiam in Tonkin.
1416. Etiam in insula Victory.
1418. Etiam in Australia.
1419. Etiam in Tonkin, insula Labuan et Costarica.
- 1421 (var. *favulosa*), 1423 et 1425 etiam in Australia.
- 1427 (var. *complicatum*), 1432, 1433 (typus), 1448 et 1456 (typus) etiam in Persia; 1433 (typus) insuper in Nova Hollandia.
1428. Etiam in Japonia.
1461. Typus etiam in Nova Hollandia.
1468. Typus etiam in Persia.
1489. Etiam in insula Labuan.
1495. Etiam in Australia.
1513. Etiam in insula Victory.
1517. Etiam in India orientali, Tonkin et Costarica.
1522. Etiam in Australia.
- 1530 et 1531 (var. *nitidella*) etiam in Tonkin.
1540. Etiam in Australia.
1556. Etiam in Tonkin.
1557. Etiam in Costarica.
1559. Typus etiam in Tonkin et Costarica.
1561. Etiam in Costarica et Brasilia.
- 1565 et 1567. Etiam in Tonkin.
- 1570 et 1572. Etiam in Australia.

Hoc loco annotandum est collectionem lichenum quam
C. Flagey sub titulo „Lichenes Algerienses exsiccati cent.
I—II“ edidit me adhuc oculis non perlustrasse ac mihi
prorsus ignotam esse ; sed in supplementis posteriore tem-
pore prodituris me de eis accuratius referre posse mihi videor.

Conscriptum extremo mense Decembri 1892.
