Zeitschrift: Berichte der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft

Herausgeber: St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft

Band: 89 (2000)

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Wissenschaftliche Artikel

tott.): Ziemlich selten. Juli–August. 23. – S: Rht. 12.7.33. Chastenloch: 93, 5.6.93 K. Dorf: 23.7.93 K. Hol- 5 H. Lobenschwendi: 7.5.94 K. Tro- 8.6.94 K. Zweibrücken: 21.5.93 K.

spadicearia **Denis & Schiffermül-** 10.5.45, 12.5.45, 18.5.23 (GP: falsch ls 3355), 18.5.35, 21.5.46, 21.5.33, 33, 30.7.44, 9.8.38, 10.8.39, 14.8.44, enloch: 7.5.94 GP K. Dorf: 23.7.93, 93, 27.8.94 K. Fuchsloch: 22.7.94 K. 6.96 H. Lobenschwendi: 16.6.95, 94 K.

ferrugata **Clerck** (*Larentia ferru-* Häufig und überall zu finden. , f. *unidentaria* Hw. gleich häufig. – falsch bestimmt, siehe 3354. Hol-, 8.8.96 GP, 19.8.95 H. Loben- 6.94 GP D, 6.8.93 GP K.

quadrifasciata **Clerck** (*Larentia ria* Cl.): 1.8.38, 4.8.38. – Dorf, 93, 19.7.95, 23.7.93 K. Kolenrüti,

montanata **Denis & Schiffermül-** *montanata* Bkh.): Häufig und im iet zu finden. Ende Juni bis Anfang Rht, 13.5.46, 8.6.23, 12.6.41, 14.6.47, 3. Chastenloch, 5.6.93, 18.6.93 K.

fluctuata **Linnaeus** (*Larentia fluc-* cht häufig, doch fast jedes Jahr ver- den, aber in hiesiger Gegend nur Sept. gefangen. Halden und Gi- 14.4.39, 28.5.41, 10.7.44, 12.8.28, Rht, 25.8.45. Dorf: 7.5.94, 26.6.94, 93 K. Hal 13.8.93 K. Holdern: 96 H.

incursata **Hübner** (*Larentia inc-* Selten. Halden, 16.5.10 am Licht. – 10.

uculata **Hufnagel** – Dorf: 27.8.94 wendi: 20.8.94 K.

tristata **Linnaeus** (*Larentia tristata* lten. Juni–August. Im ganzen Ge- mmbach, 24.6.33 H. He: Rht, 31.5.25.

ernata **O. F. Müller** (*Larentia ko-* Nicht häufig. Mai–Juni. Halden mmbachtobel 1.6.25. – S: Krumm- 34, Rht, 12.5.34. Krummbach, Rht, 7.8.31. Chastenloch: 5.6.93 K. endi: 6.8.93, 1.10.94 K.

ivata **Hübner**: – S: Krummbach, 4.7.41.

olluginata **Hübner** (*Larentia mo-*): Zwei Stück bei Halden, 23.7.07, Rht, 23.7.07, 28.7.44, 29.7.44. Dorf: 94 K. Holdern: 27.6.95, 3.7.96 H.

ma bilineata **Linnaeus** (*Larentia*): Häufig im ganzen Gebiet. , f. *infuscata* Gnppbg. nicht s die Stammform. – S: Rht, 9.6.25, 0. R: Rht, 1.7.38. Dorf: 5.6.93, 93, 23.7.93, 8.8.96 K. Holdern: olenrüti: 3.8.94 Ko.

yanata **Hübner** (*Larentia cyanata* ten. August–September. Gigern, 6. Im Dorf, 7.6.34. – S: Rht, 27.6.26, 7. R: Rht, 25.8.45, 28.8.40. Fuchs- Ko. Wald: 14.9.87 G.

nfidaria LAH.: – Trogen Brändli, 96 K.

caesiata **Denis & Schiffermüller** *esiata* Lang.): Erst ein Stück gefan- 1.7.17.

diata **Denis & Schiffermüller** (*La- ta* Hb.): Nicht häufig, jedoch im iet, März–Mai. – S: Rht, 23.3.18, ht, 21.3.38. He: Rht, 30.3.30. Dorf: 94 K. Zweibrücken: 24.4.93 K.

rivata **Denis & Schiffermüller** (*La- grofasciaria* Goeze.): Selten. Halden, 24.4.15. – S: Rht, 4.4.40, 40. Dorf: 15.5.94 D.

Eulithis populata **Linnaeus** (*Lygris populata* L.): Nicht selten. In manchen Jahren häufig auf Gigern, Anfang Juli–Aug. auf Heidelbeerplätzen, wo Raupen im Mai–Juni zu finden sind. In Gefangenschaft gut zu ziehen. – S: Rht, 12.7.33, 17.7.37, 26.7.36. R: Rht, 15.7.29, 17.7.37. Fuchsloch, 22.7.94, 31.7.96 K.

Eulithis pyraliata **Denis & Schiffermüller** (*Larentia dotata* L. [Stgr.?]): Nicht häufig, bei Halden und Gigern. Juli–August. 16.7.26, 3.8.23. – S: Rht, 18.7.28, 3.8.23, 5.8.23. He: Rht, 2.7.33. Dorf: 21.7.94 K. Kolenrüti: 1.7.93 K. Lobenschwendi: 14.7.96 K.

Ecliptopera silaceata **Denis & Schiffermüller** (*Larentia silaceata* Hb.): Nicht häufig. Mai–Juni. Halden und Gigern. 8.5.34, 24.5.14, 26.5.27. – S: Rht, 24.5.14, 26.5.27. He: Rht, 18.8.30. Chastenloch: 22.5.93 K. Dorf: 23.8.94 K. Fuchsloch: 30.7.94 Ko. Holdern: 18.7.96, 4.8.95, 8.8.96, 18.8.96 H. Küeloch: 1.5.93 K.

Ecliptopera capitata **Herrich-Schäffer**: – Chastenloch: 5.6.93 K. Dorf: 8.7.94, 27.8.94 K. Trogen Brändli: 24.6.94, 13.7.96 K.

Chloroclysta siterata **Hufnagel** (*Larentia siterata* Hufn.): Nicht besonders häufig, einzig im Herbst 1907 war sie bei Halden ganz häufig. 25.9.02 in Anzahl, 21.4.11, 3.6.33. – S: Rht, 3.8.25, 30.8.26, 5.9.44, 12.9.44, 22.9.27, 28.9.33, 2.10.41, 24.10.13. He: Rht, 1.4.11. Holdern: 6.6.96 H. Lobenschwendi: 1.10.94, Trogen Bad: 30.4.94 K. Zweibrücken: 93 K.

Chloroclysta miata **Linnaeus** (*Larentia miata* L.): Ziemlich selten. Halden, 11.5.23, 6.6.33, 10.9.15. – S: Säge Wald, 26.4.34. Rht, 10.5.23, 10.9.15.

Chloroclysta citrata **Linnaeus** (*Larentia immanata* Hw.): Flugzeit und Vorkommen wie die folgende Art. Halden und Gigern. f. *unicolorata* am 22.9.27 ein Stück im Bad Unterrechstein gefangen. – S: Rht, 26.6.43, 18.7.23, 7.41 eb. Dorf: 21.7.94 GP K. Moos: 7.8.94 GP K. Wald: 27.8.90 GP G.

Chloroclysta truncata **Hufnagel** (*Larentia truncata* Hufn.): Im ganzen Gebiet zu finden, jedoch nicht häufig. Juli–Aug.–Sept. Halden 8.7.12, 12.7.11. f. *mediorufaria* Fuchs, das erste Mal am 3.7.43 auf Blüten von Wasserdost auf Gigern gefangen. – S: Rht, 3.7.43, Gigern, 3.7.43, Unterrechstein, 12.9.27. R: Rht, 26.6(?).35. Chastenloch: 22.5.93 K. Dorf: 13.7.37, 20.8.93, 27.8.94, 12.10.94 K. Fuchsloch: 24.7.94 K. Gstalden: 21.7.94 K. Lobenschwendi: 1.10.94 K. Trogen Brändli: 24.6.94 K.

Cidaria fulvata **Forster** (*Larentia fulvata* Forst.) – **Rollenspanner**: Mai–August. Nicht besonders häufig, doch hie und da zu finden. 24.7.16, 6.8.23, 16.8.09. – S: Rht, 18.7.24, 15.8.09, 24.8.16. Dorf: 18.6.93, 30.6.93, 20.8.93 K.

Plemyria rubiginata **Denis & Schiffermüller** (*Larentia bicolorata* Hufn.): Selten, am 16.7.11 im Moos gefangen, 14.7.24 und 28.7.31 bei Halden. – S: Rht, 8.7.37, Moos, 16.7.11, Rht, 24.7.33. Fuchsloch: 22.7.94 K.

Thera firmata **Hübner** (*Larentia firmata* Hb.): Erst ein Stück gefangen, Halden 5.8.16. – S: Rht, 5.8.16, 13.8.39. Dorf, 8.7.94, 22.7.94 K.

Thera variata **Denis & Schiffermüller** (*Larentia variata* Schiff.): Ganz verschieden, in manchen Jahren sehr häufig, dann wieder fast wie verschwunden. Überall in zwei Generationen zu finden. Frühling bis September. f. *scotica* Stgr. Gigern und Gupfloch, Juni–Juli, 11.6.11, 1.7.31. – S: Rht, 11.6.11 (falsch bestimmt als 3415). Kaien, 23.6.11 (falsch bestimmt als 3415). R: Rht, 27.8.38, 27.8.39, 4.9.34. Zwei Exemplare falsch bestimmt, siehe 3412. Chastenloch: 7.8.93 K. Dorf: 18.6.93, 20.8.93, 18.9.93 K. Halden: 24.9.93 K. Lobenschwendi: 1.10.94 K. Midegg: 5.11.94 Ko.

Thera britannica **Turner**: – S: Rht, 4.6.44 (2 Ex. falsch bestimmt als 3411). Chastenloch: 22.5.93

Juni–Juli. Auf Heidelbeerplätzen, wo auch die Raupen gut zu finden sind. – S: Rht, 25.6.15, 28.6.14, 28.6.15, 17.7.37, 18.7.27. R: Rht, 10.7.42 GP. Dorf: 30.6.93, 11.7.94, 19.7.95 K. Halden: 19.6.93 K. Kolenrüti: 1.7.93 K. Lobenschwendi: 6.8.93 K.

Hydriomena impluviata **Denis & Schiffermüller** (*Larentia autumnalis* Strom. [*trifasciata* Bkh.]): Nicht häufig. Gigern, 12.5.10, 5.6.31, 15.6.25. – S: Rht, 3.5.37, 12.5.10, 4.6.44, 15.6.25, [illegible] Gigern, 26.4.16, 5.5.22, 3.6.33, und einen Falter aus einer Raupe erhalten. – S: Rht, 10.4.18, 26.4.16, Gigern, 4.5.40, Rht, 9.5.15, 28.5.24.

Horisme tersata **Denis & Schiffermüller** (*Phibalapteryx tersata* Schiff.): Nicht selten. Juni–Juli. Halden. – S: Rht, 8.7.10 GP. He: Rht, 2.7.34 GP.

Horisme aemulata **Hübner** (*Phibalapteryx emulata* Hb.): Nicht so häufig wie die vorige Art. Mai–Juni. Habe aber auch schon ein Stück am 18.4.34 bei Halden gefangen. – S: Rht, 22.5.35 GP, 5.6.32 GP, 10.6.32 GP.

Melanthia procellata **Denis & Schiffermüller** (*Larentia procellata* F.): Seltener als *L. albicillata* L. Mai–Anfang Juli. Im ganzen Gebiet. – S: Rht, 28.5.24. M: Rht, 2.5.46. He: Rht, 12.6.23. Holdern: 9.6.96 H. Lobenschwendi: 6.8.93 K. Zweibrücken: 1.7.95 K.

Pareulype berberata **Denis & Schiffermüller**: – Wald: 16.5.88, 18.5.90, 1.6.93, 3.6.89 G.

Spargania luctuata **Denis & Schiffermüller** (*Larentia transversata* Thnbg. *lugubrata* Stgr.]): Nicht häufig. Mai–Juni. Gigern, 28.5.13, 1.6.25, 20.6.26, 3. Juni, Gstalden. – S: Rht, 28.5.13, 1.6.25, 20.6.26. He: Rht, 19.7.3[illegible]

Rheumaptera cervialis **Scopoli** (*Eucosmia certata* Hb.) – **Berberitzenspanner**: Selten. Erst ein Stück am Zimmerfenster gefangen 12.5.20. *E. umbratica* Wackerzapp hinter einem Rollladen im Dorf Rohrtobel. – S: Rht, 1.5.40 (falsch bestimmt als 3452), 12.5.20, 12.5.26, 7.24. Dorf: 3[illegible].3.94, 23.4.94 K. Gstalden: 21.7.94 K. Trogen Bad: 30.4.94 K. Zweibrücken: 24.4.93 K.

Rheumaptera undulata **Linnaeus** (*Eucosmia undulata* L.) – **Wellenspanner**: Selten. Bei Halden im Juni 1908 gefangen, 29.6.25. – S: Rht, 19.6.25, Singrüeni, 1908. Wald, 23.6.94, 20.7.95, 1.8.95 G.

Triphosa sabaudiata **Duponchel**: S: Rht, 3.4.26.

Triphosa dubitata **Linnaeus** (*Triphosa dubitata* L.) – **Höhlenspanner**: Nicht häufig, aber im ganzen Gebiet zu finden. Im September und wieder im Frühling an den blühenden Weidenkätzchen. 20.4.37 bei Halden, 31.8.25 in Holdern. – S: Rht, 20.4.27, 14.9.27. – R: Rht, 29.3.[illegible] Beleg falsch bestimmt, siehe 3448. Dorf: 23.4.95 K. Halden: 9.8.94 D. Wald: 14.9.87 G.

Epirrita dilutata **Denis & Schiffermüller** (*Larentia dilutata* Schiff.): Selten. Halden, 12.10.33. – Dorf: 7.10.95 K. Midegg: 1.10.95 Ko.

Epirrita christy **ALLEN**: – Dorf: 12.10.94 K. Lobenschwendi: 7.10.95 K. Midegg: 1.10.94 K. Wald: 4.10.91, 14.10.87, 17.10.87 G.

Epirrita autumnata **Borkhausen**: – S: Rht, 19.9.11 (GP: falsch bestimmt als 3464), 9.10.32 GP. Wald: 16.10.94 K, 17.10.88, 12.11.88 G.

Operophtera brumata **Linnaeus** (*Cheimatobia brumata* L.) – **Kleiner Frostspanner**: Häufiger als die folgende Art. Oktober–November. Man findet sie oft mit dem Licht an Obstbaumstämmen, wo auch das flügellose W zu finden ist. – S: Rht, 15.9.11. Holdern: 14.11.94, 24.11.95 H. Wald: 17.10.87, 17.11.90 G.

Operophtera fagata **Scharfenberg** (*Cheimato-*

Rht, 28.7.27, 24.8.42, 27.8.40. T: Rht, 2.8. Dorf: 19.8.94 K. Gstalden: 27.8.94 K. Zw brücken: 20.8.93 K.

Eupithecia tenuiata **Hübner** (*Tephroclys tenuiata* Hb.): – Halden am Licht, 18.7.14. – Rht, 18.7.14 GP.

Eupithecia immundata **Lienig & Zeller** (*phroclystia immudata* Z.): – Halden, 31.5.25 Beleg falsch bestimmt, siehe 3488.

Eupithecia plumbeolata **Haworth** (*Teph plumbeolata* Hw.): – Halden am Lic Rht, 31.5.25, 31.5.25 (GP: falsch b stimmt als 3487), 1.6.41 GP.

Eupithecia abietaria **Goeze** (*Tephroclys abietaria* Goeze.): – Halden, 24.7.32 am Lich S: Rht, 13.6.31 (GP: falsch bestimmt als *abie* [whs. falsche Schreibweise, *abjecta* = Noct dae]). 5.7.40. Ein Beleg falsch bestimmt, sie 3575. Fuchsloch: 22.7.94 GP, 31.7.96 K. Zw brücken: 1.7.95 K.

Eupithecia linariata **Fabricius**: – Dorf: 27.8 GP K.

Eupithecia exiguata **Hübner** (*Tephroclys exiquata* Hb.): Juni–Juli. Gupfloch, Gigern u Halden, 12.6.31, 1.7.34, 16.7.28. – S: R 28.5.28, 9.6.24, 12.6.31, 16.7.28. Chastenlo 5.6.93 GP K. Dorf: 22.7.94 GP, 23.8.94 GP K

Eupithecia venosata **Fabricius** (*Tephroclys venosata* F.): Juni–Juli. Halden, Gigern, u Gupfloch, 17.6.13, 18.7.18, 25.6.24. – S: R 17.6.13 (an Blüte von Selene), 25.6.24, 18.7.2

Eupithecia centaureata **Denis & Schifferm ler** (*Tephroclystia [Eupithecia] oblong* Thnbg.): Selten, Halden, 31.8.26. Gupflo 19.8.32. – S: Rht, 19.8.32, 31.8.26.

Eupithecia intricata helveticaria **Boisduva** Dorf: 21.6.94 GP, 19.7.95 GP K. Holde 11.6.96 H.

Eupithecia veratraria **Herrich-Schäffer**: Fuchsloch: 31.7.96 K.

Eupithecia cauchiata **Duponchel** (*Tephrocl ia cauchiata* Dup.): – Halden, 15.6.24, 28.6.2 Die Belege falsch bestimmt, siehe 3524, 353

Eupithecia satyrata **Hübner** (*Tephroclystia satyrata* Hb.): Ziemlich häufig. Mai–Juni. Hald und Gigern. 10.6.18, 13.6.31. – S: Rht, 5.5 GP, 1.6.41 GP, 15.6.28 GP, 28.6.26 (GP: fals bestimmt als 3523).

Eupithecia absinthiata **Clerck** (*Tephroclys absinthiata* Cl.): Juni–Juli. Halden, 29.6. 2.7.31, 12.7.28. Gigern, 9.8.40. – S: Rht, 29.6. 12.7.28, 2.8.31, 9.8.40 (GP: falsch bestimmt 3525z). Fuchsloch: 30.7.94 GP D.

Eupithecia expallidata **DOUBLEDAY**: Beleg falsch bestimmt, siehe 3525.

Eupithecia vulgata **Haworth** (*Tephroclys vulgata* Hw.): Mai–Juli. Halden und Gige 25.5.24, 20.7.34. – S: Rht, 25.5.24 GP, 1.7.39 (7.7.34 GP. Dorf: 6.6.94 GP K.

Eupithecia tripunctaria **Herrich-Schäffer** Chastenloch: 22.5.93 GP K. Dorf: 23.7.94 (19.8.96 GP, 7.9.8.94 GP K. Fuchsloch: 22.7 GP K. Holdern: 18.7.96 GP H.

Eupithecia denotata **Hübner**: – Dorf: 18.8 GP K. Halden: 28.7.[illegible] Ko.

Eupithecia subfuscata **Haworth** (*Tephroc stia castigata* Hb.): Ende Mai–Juni. Halden u Gigern, 30.5.15, 13.6.31, 15.6.30. – S: R 30.5.15 GP, 5.8.35 (GP: falsch bestimmt 3557). Zwei Belege falsch bestimmt, sie 3570. Dorf: 6.6.94 GP, 18.6.93 GP K. Lob schwendi: 22.6.94 GP D. Trogen Brän 24.6.94 GP K. Zweibrücken: 1.7.95 GP K.

Eupithecia ictterata **de Villers** (*Tephroclys sucenturiata* Hb.): Nicht selten. Juni–Juli, f. *su fulvata* Hw. so häufig wie die Stammform. Ra pen auf Schafgarbe Ende September–Oktol mit dem Licht gut zu finden. Zucht leicht. – Rht, 25.6.14 GP, 28.6.28, 5.7.39, 7.7.39, 8.7. 13.7.41. Chastenloch: 7.8.93 K. Holde 14.7.96 H. Lobenschwendi: 20.8.94 K.

Eupithecia impurata **Hübner**: – Dorf, 13.8