

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Band: 52 (1957)

Artikel: Die Vögel des Kantons Tessin. 3. Nachtrag, Periode 1952 - 1956
Autor: Corti, A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1003574>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Vögel des Kantons Tessin

3. Nachtrag. Periode 1952 = 1956*

Von Ulrich A. Corti, Zürich

Die Berichtsperiode war durch eine erfreuliche Aktivität verschiedener Feldbeobachter gekennzeichnet, ein Faktum, das nicht nur durch die im Literaturverzeichnis zitierten Arbeiten, sondern auch durch die Fülle der neuen Beobachtungen belegt wird.

Bis Ende 1956 sind im Kanton Tessin 266 Vogelarten (+ 10 Rassen) nachgewiesen worden, davon allein im Zeitraum 1952-1956 8 Species und 1 Subspecies erstmals, nämlich Beutelmeise, Rohrschwirl, Bartgrasmücke, Rauhfusskauz, Rauhfussbussard, Seidenreihler, Mornellregenpfeifer, Raubseeschwalbe sowie die alpine Form des Grossbuntspechtes.

L. Hoffmann (1955) hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass heute den Brutvögeln des Tessins vermehrte Beachtung geschenkt werden sollte. Es scheint uns auch der Zeitpunkt gekommen zu sein, die topo- bzw. kartographische Bearbeitung der Brutvorkommen in Angriff zu nehmen. Zudem bedarf das Sopraceneri einer intensiveren Durchforschung in ornitologischer Hinsicht. Noch immer fehlen Nachweise des Vorkommens des Dreizehenspechtes und der Sperlingseule auf tessinischem Territorium.

Die vornehmste Aufgabe der im Tessin arbeitenden Vogelkenner wird jedenfalls noch auf lange Zeit hinaus die möglichst klare Herausarbeitung der für den Kanton spezifischen avifaunistischen Verhältnisse bilden.

Die Literatur ist im allgemeinen bis Ende 1956 berücksichtigt. Die darin enthaltenen Angaben sind in der vorliegenden Uebersicht bei weitem nicht vollständig referiert worden. Die Namen der Beobachter wurden im Text meist abgekürzt aufgeführt :

BBC	: Prof. Dr. B. Baur-Celio, Küsnacht/ZH
UC	: U. A. Corti, Zürich
BCa	: B. Carrara, Zürich
ECa	: E. Carrara, Zürich
WF	: W. Fuchs, Sempach
LH	: Dr. L. Hoffmann, La Tour-du-Valat, Bouches-du-Rhône
SH	: St. Hüttenmoser, Zürich
HI	: Dr. H. Iselin, Davos
RM	: Dr. R. Melcher, Sils Maria/GR
GR	: G. Roux

*) 2. Nachtrag siehe : Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali 47/48 15-40 (1952-53).

AS	: Dr. A. Schifferli, Sempach
FS	: Dr. F. Suter, Davos
JS	: Frl. Dr. h.c. J. Schinz, Zürich
MS	: M. Schwarz, Basel
PT	: P. Teichert, Ascona
ThT	: Th. Tinner, Zürich
AW	: A. Witzig, Lugano

Weitere Abkürzungen : u.B. = und Begleiter; OB = Der ornithologische Beobachter; NO = Nos Oiseaux; VdH = Die Vögel der Heimat.

Seinen Freunden und Helfern, insbesondere den Herren Prof. B. Baur-Celio, E. und B. Carrara, St. Hüttenmoser, Dr. H. Iselin, Dr. W. Knopfli, Dr. R. Melcher, Dr. E. Sutter, P. Teichert, Th. Tinner und A. Witzig dankt der Verfasser bestens für die freundliche Mitteilung wertvoller Daten.

A. DIE VOGELFORMATION DES HYDROSITONS

Wasseramsel, Cinclus cinclus. Das Museum Zofingen besitzt ein Belegstück der Rasse *C. cinclus meridionalis* (= *C. albicollis* Vieill.) vom 10. Dez. 1901 aus Magadino sowie ein juv. Exemplar vom 17. Juni 1910 aus Lugano. — Am 30. Dez. 1951 1 W. an der Maggia im Delta bei Locarno; UC. — Am 12. März 1953 eine W. an der Maggia zwischen Solduno und Ponte Brolla; UC. — Ambrì : 4. Okt. 1953, 4 dunkelbäuchige W. am Ticino; UC. — Locarno : 23. April 1956, W.-Nest mit 5 wenige Tage alten Jungen in einer Buhne am Ufer der Maggia; PT. — 28. Okt. 1956, 1 W. an der Tessinmündung gegen die Strömung schwimmend und von Zeit zu Zeit tauchend; BCa.

Eisvogel, Alcedo atthis. MS beobachtete am 5. Aug. 1942 ein Ex. zwischen Someo und Riveo (Valle Maggia). — Vom 23. September bis 3. Okt. 1951 war *A. atthis* an der Maggia bei Locarno, im Verzascadelta, an der Bolla rossa, im Gebiet der Tessinmündung und in der Seebucht bei Magadino täglich zu sehen, teils vorüberfliegend, teils fischend (auch rüttelnd), Schilfrohrhalme als Jagdwarte und Warte zum Verschlingen der Beute benützend. Mit Ruderbooten liess sich der Eisvogel oft bis auf sehr geringe Distanz annähern (verringerte Fluchtdistanz); UC u.B. — Am 30. Dez. 1951 1 E. an der Maggia im Delta bei Locarno; UC. — In der Zeit vom 27. Juli bis 8. Aug. 1952 trafen E. und BCa 10 - 15 E. zwischen Magadino und Tenero an. — Locarno : 11. März 1953, 1 E.; UC. — Lugano : 22. Jan. 1954, 1 E. beim Parco civico; UC. — Tessin-delta : 1. Okt. 1954, 1 E.; HI. — Maggiadelta : 15. April 1956, Brutröhre an einem Altwasser, Höhleneingang ca. 70 cm über dem Wasserspiegel in einer etwa 100 - 120 cm hohen Böschung. Am 19. April war die Röhre wegen des hohen Seestandes überschwemmt, am 26. April aber schien sie bei tieferem Wasserstand wieder besetzt zu sein, da ein E. aus derselben herausflog; PT. — Am 30. April 1956 zwei E. im Maggiadelta bei Ascona, am 4. Mai 1956 1 Ex. an der Bolla rossa (Pian Magadino); UC.

— Maggiadelta : 2. Juni 1956, 1 E.; E. und BCa. — Magadino : 28. Okt. 1956, 1 E. einem Schilfsaum entlang fliegend; BCa.

Seemilan, Milvus migrans. Ein Belegexemplar vom 28. Juni 1902 von Melide in Coll. Mus. Zofingen. — GR traf im April 1951 mindestens 4 Brutpaare des S. am San Salvatore bei Lugano, u.a. ein Nest auf einem Felsvorsprung (27. April) an; NO. 21 170. — Am 19. April 1952 fischten 8 S. bei starkem Wind nahe beisammen im Uferbezirk des Ceresio (Bucht von Lugano); UC, AW. — Am 29. Juli 1955 1 S. im Verzascadelta, am 1. Mai 1956 1 S. im Pian Magadino, Höhe Gudo, am 2. Mai 1956 2 S. bei Melano (Ceresio) und 3 Paar S. an den Abhängen des Mte. Generoso ob Mendrisio; UC.

Fischadler, Pandion haliaëtus. Am 29. März kreiste ein F. mehrmals über dem Maggiadelta; PT.

Seeadler, Haliaëtus albicilla. Neu für den Tessin. Am 8. Okt. 1933 sass um 10 Uhr, bei regenrischem Wetter, im Pian Magadino, etwa in der Mitte zwischen Gordola und Quartino, auf einem grossen Streuehaufen ein S. Der gewaltige Vogel ergriff bei der Annäherung von zwei Personen (Herr und Frau Dr. Ganzoni) in einer Entfernung von etwa 60 Schritten die Flucht und flog gemächlich etwa 200 m weit fort, um sich auf einem anderen Streuehaufen niederzulassen, wo er sich wieder bis auf etwa 50 Schritte annähern liess, um nach dem Abflug zirka 300 m weiter entfernt auf einer Weide aufzubaumen; Dr. Ganzoni, in litt, 24. Mai 1934.

Graureiher, Ardea cinerea. Am 20. April 1952 ein Trupp von 8, zeitweilig rufenden G., bei ziemlich starkem Gegenwind über den Auenwald des Verzascadeltas fliegend; UC. — Verzasca- und Tessindelta (Pian Magadino): 29. April 1956, 6 G., am folgenden Tage 3 Ex., am 3. Mai 1956 ein Verband von 19 G. im Fluge, dann wieder nur 2 Individ. am 4. und 1 Ex. am 5. Mai 1956 (Bolla rossa); UC u.B. — Tessinmündung : 28. Okt. 1956, 1 G. auf Schlick ruhend; BCa. — Im Herbst 1956 wurde ein G. am Lago di Muzzano erbeutet; AW.

Purpurreiher, Ardea purpurea. E. und BCa scheuchten am 6. Aug. 1952 einem P. an einem Altlauf des Ticino (Pian Magadino) auf. — Am 5. Aug. 1953 ein, am nächsten Tage 2 P. in der Schilfzone des Tessindeltas; BBC. — Am 25. Mai 1955 ein juv. Ex. an der Tessinmündung; AS, OB. 53 21. — Tessindelta : 19. April 1956, 3 P., 2 ad. und 1 juv. Ex.; BBC. — Gebiet zwischen Bolla rossa und Tessinmündung (Pian Magadino): 2 P. am 23., 3 P. am 24. April 1956; RM. — Ebenda am 29. April 1956 3 P., am folgenden Tage 1 Ex. in der Seeuferzone des Maggiadeltas bei Ascona, am 3. Mai 1956 immer noch 3 P. im Verzasca-Tessindelta; UC u.B. — 3 P. am 1. Mai 1956 an einem Seitenarm der Bolla rossa. Am 20. Mai 1956 ein Individ. auf einer z.T. überschwemmten Riedwiese im Gebiet der Bolla rossa; PT.

Silberreiher, Casmerodius alba. Unetikettiertes Belegexemplar in Coll. Castello di Locarno; kontr. UC, Juli 1955. Es dürfte sich um das am 30. Okt. 1904 im Pian Magadino erbeutete Exemplar handeln. Die erwähnte Vogelsammlung enthält keinen Seidenreiher!

Seidenreiher, Casmerodius garzetta. Neu für den Tessin. Am Morgen des 28. Mai 1954 hielt sich ein schneeweisser S. nahrungssuchend im seichten Wasser am Schilfrand der Magadino-Ebene nahe beim Dorf Magadino auf. Die Schmuckfedern spielten im Winde; JS, OB. 52 15. — Am 24. und vom 26. - 28. April 1956 ein S. im Gebiet der Bolla rossa (Pian Magadino); RM. — Am 28. April 1956 konnte UC das zuletzt erwähnte Exemplar im gleichen Gebiet ebenfalls wahrnehmen.

Nachtreiher, Nycticorax nycticorax. Am 14. Mai 1953 (18-19 Uhr) stöberten E. und BCa im Maggiadelta bei Ascona aus dem Wald hinter dem Castello del Sole 5 N. aus einer Baumgruppe auf. Die Vögel flogen rufend über den Verbano hinaus. — 22. April 1956, 2 N. an einem Altwasser im Maggiadelta, am 29. April 1956 ein Ex. ebenda, am 1. Mai d.J. ein N. die Bolla rossa überfliegend und am 24. Mai 1956 6 Individ. im Maggiadelta; PT. — Am 3. Mai 1956 ein ad. N. an der Bolla rossa (Pian Magadino); UC u.B. — Am 19. Aug. 1956 scheuchten ECa, Herr u. Frau Dickenmann bei Claro am Tessin einen juv. N. aus einem Buschkomplex auf, in welchen der Vogel später zurückkehrte.

Zwergreiher, Ixobrychus minutus. Nest mit Jungen vom Juli 1916 von Magadino in Coll. Castello di Locarno; UC kontr., Juli 1955. — Tessindelta : 6. Aug. 1953, 2 ♂♂; BBC. — Verzasca-Tessindelta : 22. Juli 1955, 1 Z. an der Bolla rossa über den Schilfwald fliegend; UC. — Im Herbst 1955 wurde ein ♂ am Lago di Muzzano erbeutet; AW. — Je 2 Ex. am 1. und 6. Mai 1956 an der Bolla rossa. Schon am 13. Mai 1956 ein Z.-Nest mit 6 Eiern (4 Ex. messen 34 x 26 mm, eines 35 x 26, eines 36 x 25 mm), 125 cm hoch über trockenem Boden auf einer jungen Weide in einem von einzelnen jungen Weiden durchsetzten Schilfbestand auf einem Inselchen (Altwasser) im Maggiadelta. Als Nestunterlage diente ein vorjähriges Amselnest. Am 3. Juni 1956 ein Z.-Nest mit 6 Eiern, 25 - 30 cm über dem Boden, nur etwa 25 m vom vorerwähnten Nest entfernt; PT.

Stockente, Anas platyrhynchos. Am 30. Dez. 1951 4 St. an der Bolla rossa (Pian Magadino), von einem Jäger hochgemacht; UC. — Locarno : 20. April 1952, 1 ♀ im Verzascadelta, 1 Paar an einem Graben im Auenwald ebenda; UC. — Pian Magadino, Höhe Riazzino, 11. März 1953, 1 Paar (♂, ♀) Stockenten an kleinem Graben, Nähe Tessindamm; UC. — Tessindelta : 6. Aug. 1953, ca. 30 St. überhinfliegend; BBC. — Am 22. Juli 1955 St. auf der Bolla rossa (Pian Magadino); UC. — Am 29. April 1956 3 St. an der Bolla rossa; UC.

Knäkente, Anas querquedula. Auf der stark eutrophierten Bolla rossa (Verzascadelta) hielt sich am 20. April 1952 ein Trupp von ca.

18 K., in der Mehrzahl ♂ ♂, auf; UC. — Tessindelta/Verzascadelta : 10. März 1953, 2 K.-♂ ♂ an der Bolla rossa; UC. — Am 9. Juni 1954 flog an der Tessinmündung aus üppigem Pflanzenwuchs ein Erpel auf und verschwand gegen die Bolla rossa. Die Fluchtdistanz betrug nur wenige Meter. Das späte Datum lässt an ein Brutvorkommen denken; LH, OB. 52 15. — Bolla rossa : 29. April 1956, 1 K., am folgenden Tag 4 ♂ ♂, 1 ♀, am 4. Mai 1956 6 ♂ ♂, am nächsten Tag 1 ♂, 1 ♀; UC u.B.

Krickente, Anas crecca. Am 12. April 1948 2 Paar K. an der Tessinmündung, später ebenda 150 - 200 Individuen; BBC. — Verzascadelta: 10. März 1953, mehrere K. an der Bolla rossa; UC.

Löffelente, Spatula clypeata. Am 4. Mai 1956 eine L. an der Bolla rossa (Verzascadelta); UC u.B.

Reiherente, Aythya fuligula. Lugano : 1. Jan. 1952, 12 - 15 R., am 22. Jan. 1954 ebenda beim Parco civico 5 ♂ ♂, 1 ♀; UC.

Bergente, Aythya marila. Am 19. und 22. Febr. 1956 1 ♂, 1 ♀ unter ca. 20 Reiherenten vor dem Maggiadelta, am 18. März 1956 ebenda 2 ♀♀; PT.

Schellente, Glaucionetta clangula. 14. Febr. 1956, 3 ♂ ♂ vor dem Maggiadelta, am 22. Februar ebenda 1 ♂, 12 ♀♀, am 18. März d.J. ebenda 2 juv. ♂ ♂, am 29. März noch 2 ♂ ♂; PT.

Sammetente, Oidemia fusca. Vom 19. - 22. Febr. 1956 ein ♂ vor dem Maggiadelta; PT.

Kormoran, Phalacrocorax carbo. Belegstück vom 18. März 1915, See bei Magadino, in Coll. Castello di Locarno. Es handelt sich vielleicht um das Exemplar (♂), welches in « Die Vögel des Kantons Tessin » (1945, p. 82) als im April 1915 auf dem Verbano bei Locarno erlegt erwähnt wurde. — Am 5. Nov. 1952 ist von Herrn Antognini (Muralto) an der Tessinmündung ein K., wahrscheinlich *Ph. carbo sinensis* (Schnabellänge des Exemplares zirka 68 mm), erlegt worden; AW.

Pelikan, Pelecanus onocrotalus. Das Belegexemplar des am 14. Juni 1902 vor dem Pian Magadino erbeuteten P. befindet sich z. Zt. im Castello di Locarno; UC, kontr., Juli 1955.

Haubentaucher, Podiceps cristatus. Am 27. Juli 1952 vor der Verzasca- und Tessinmündung 40 H., darunter auch junge Exemplare. Ein junger, halbwüchsiger H., der sich in ein Fischernetz verrirt hatte, konnte gefangen werden; BCa. — Am 13. März 1953 2 H. vor dem Maggiadelta bei Locarno tauchend; UC. — Am 6. Aug. 1953 1 H. westlich der Einmündung des Ticino in den Verbano; BBC. — Maggiadelta-Ascona, 30. Sept. 1954, 2 H.; UC, HI. — Am 22. Juli 1955 ein H. auf dem Unterlauf der Bolla rossa (Verzascadelta); UC. — Ebenda am 29. Juli 1955 2 H. mit kleinen, gestreiften Jungen; UC. Bolla rossa : 30. April 1956, 2 Paar

H.; UC. — Am 2. Juni 1956 2 Ex. vor der Bolla rossa auf dem See; E. und BCa.

Horntaucher, Podiceps auritus. Am 22. April 1923 beobachtete A. Masarey einen H. im Prachtkleid bei Ascona (in litt. an W. Knopfli). — Am 31. Dez. 1951 zwei H. zirka 150 - 200 m vom Ufer entfernt vor dem Maggiadelta bei Ascona fleissig tauchend. Es sind z. Zt. die einzigen auf dem spiegelglatten Verbano sichtbaren Vögel; UC.

Schwarzhalstaucher, Podiceps caspicus. Maggiadelta : 3. Febr. 1956, 3 Ex. in einem Altwasser; PT.

Zwergtaucher, Podiceps ruficollis. Am 4. Mai 1956 ein Z. mit Balztrillern an der Bolla rossa (Verzascadelta); UC. — Am 28. Okt. 1956 ein Z. bei Magadino; BCa.

Prachtseetaucher, Gavia arctica. Maggiadelta : 22. Dez. 1956, 1 P. auf dem Verbano vor Ascona, am 25., 26., 28. und 29. Dez. 1956 1 P. ebenda beim Camping. Tauchzeiten im Mittel 35 Sekunden; PT.

Sternseetaucher, Gavia stellata. Maggiadelta : 22. Dez. 1956, 2 Ex. vor Ascona auf dem Verbano; PT.

Bachwasserläufer, Tringa ochropus. E. und BCa trafen in der Zeit vom 27. Juli bis 8. Aug. 1952 im Tessindelta 6 - 7 B. an. — Tessindelta : 6. Aug. 1953, 2 B. gegen die Bolla rossa abfliegend; BBC. — Tessindelta : 2. Aug. 1955, 1 B. an Altlauf mit Schlickufern; UC. — Am 19. April 1956 2 B. an der Tessinmündung; BBC. — Am 4. und 5. Mai 1956 je 1 B. an der Bolla rossa; UC u.B.

Bruchwasserläufer, Tringa glareola. Am 5. Mai 1956 3 B. auf Schwimmpflanzendecke der Bolla rossa (Verzascadelta); UC u.B.

Gambettwasserläufer, Tringa totanus. Am 29. April 1956 1 Ex. im Maggiadelta (Sandbank), ebenda 1 Ex. am 6., 2 Individ. am 13. Mai 1956; PT.

Trauerwasserläufer, Tringa erythropus. Am 19. April 1956 3 T. am Kiesufer rechts der Tessinmündung, ferner 1 T. mit 2 Bruchwasserläufern auf einer submersen Wiese in der Nähe der Bolla rossa; BBC.

Silberwasserläufer, Tringa nebularia. Tessindelta : 23. Sept. 1954, 1 Ex.; HI. — Am 1. Okt. 1954 ebenda ein (wohl dasselbe) Ex., das ab und zu ruft. Der Vogel setzt sich an der Wasserkante nieder und lässt uns im Ruderboot bis auf eine Distanz von zirka 7 m herankommen, bevor er flieht; UC, HI. — Maggiadelta : 22. April 1956, 2 Ex., am 6. Mai d.J. 1 Ex. im Verzascadelta, am 20. Mai 1956 ein Trupp von etwa 25 Ex. im Tessindelta; PT. — Am 30. April 1956 1 S. im Mündungsgebiet der Verzasca; UC u.B.

Schmalschnäbliger Wassertreter, Phalaropus lobatus. Das in « Die Vögel des Kantons Tessin » (1945, p. 90) erwähnte Exemplar, das gegen

Ende November 1930 auf dem Verbano erbeutet wurde, steht heute unter der Bezeichnung «*Phalaropus hyperboreus*, Piano di Magadino, Dez. 1930 » als Belegstück in Coll. Castello di Locarno; UC, kontr., Juli 1955.

Avosette, Recurvirostra avosetta. Belegexemplar von der Maggia-Mündung, 26. Jan. 1915, in Coll. Castello di Locarno; UC, kontr., Juli 1955.

Trauerseeschwalbe, Chlidonias niger. Tessindelta : 27. Juli bis 8. Aug. 1952, bis zu 30 T., darunter auch juv. Individ.; E. und BCa. — AW konstatierte am 15. Aug. 1954 drei T. am Lago di Lugano. Gewöhnlich zeigen sich die T. am Ceresio gegen Caprino oder beim Ponte di Melide; Il nostro Paese 4 401. — Tessindelta : 21. und 23. Sept. 1954, je zirka 30 T.; HI. — Ebenda am 27. Sept. 1954 eine einzelne T. über der Bolla rossa und über dem Uferbezirk des Verbano jagend. Ein tot gefundenes angeschossenes Ex. wog 51 g; UC, HI. — Tessinmündung : 2. Juni 1956, 1 Ex. über den Schilfbuchten fliegend; E. und BCa.

Weissflügelseeschwalbe, Chlidonias leucopterus. Am 9. Juni 1954 flogen über dem Verbano vor der Tessinmündung und der Bolla rossa 6 Seeschwalben hin und her. Neben 4 Trauerseeschwalben zeigte sich eine W., deren schwarze Unterflügel gut sichtbar waren. Die sechste Seeschwalbe konnte wegen zu grosser Entfernung nicht bestimmt werden; H. Suter, OB. 52 15.

Raubseeschwalbe, Hydroprogne tschegrava. Neu für den Tessin. Am 6. Aug. 1953 beobachtete BBC vor der Mündung des Tessins (Verbano) 2 R. in Gesellschaft von 4 juv. Silbermöwen; Näheres siehe OB. 50 148.

Zwergmöwe, Larus minutus. Am 3. Mai 1956 eine einzelne ad. Z., assoziiert mit einer Gesellschaft von ca. 50 Lachmöwen, bei Ascona; RM.

Lachmöwe, Larus ridibundus. Am 30. Dez. 1951 ca. 80 L. in der Seebucht bei Locarno, am 1. Jan. 1952 gegen 60 L., meist ad. Ex. im Winterkleid, in Lugano; UC. — Am 10. und 14. März 1953 in der Seebucht bei Locarno zirka 30-40 L., etwa 50 % der Individuen ausgefärbt. Am 13. März 1953 einige Ex. bei Brissago; UC. — Lugano (Parco Civico): 22. Jan. 1954. Bei schönem Wetter 1 beringte L., 1 Ex. mit beinahe ausgefärbtem dunklem Kopfgefieder, 3 Ex. auf starken Aesten von Platanen, 1-6 m hoch über dem Wasserspiegel sitzend; UC. — Maggiadelta bei Ascona : 30. Sept. 1954, ca. 6 juv. L.; UC, HI. — Locarno : Am 22. Juli 1955 eine einzelne juv. L. über der Bolla rossa (Verzascadelta); UC. — Am 1. Aug. 1955 eine juv. L. bei Magadino, desgl. am 2. Aug. 1955 an der Tessinmündung, vermutlich dasselbe Individ.; UC. — Am 4. Mai 1956 eine Gesellschaft von ca. 50 L. in der Seebucht bei Locarno; UC.

Sturmmöwe, Larus canus. ♂ im Jugendkleid vom August 1902 aus dem Pian Magadino in Coll. Mus. Zofingen.

Silbermöwe, Larus argentatus. Am 31. Dez. 1951 1 ad. Ex. vor dem Maggiadelta bei Ascona über dem Verbano; UC. — E. und BCa sahen

3 S. im Tessindelta in der Zeit vom 27. Juli bis 8. Aug. 1952. — Am 5. Nov. 1952 wurde im Maggiadelta eine S. erlegt, die am 12. Juli 1952 auf der Vogelinsel Mellum im Jadebusen beringt und am 13. Juli 1952 nach München-Hellabrunn gesandt worden war. Der Vogel trug den Ring 357518 der Vogelwarte Helgoland und steht im Zusammenhang mit Versuchen dieser Warte [vergl. OB. 48 177 (1951)]; AW, OB. 50 30; AS, OB. 50 197 (ebenda eine weitere Meldung!). — Am 10. März 1953 3 ad. S. an der Peripherie des Maggiadeltas bei Locarno, Richtung Brissago fliegend, ebenda 1 ad. Individ. am 13. März 1953; UC. — Am 14. Mai 1953 2 S. am Verbano vor dem Maggiadelta Ascona, ebenda 4 Ex. am folgenden Tage; E. und BCa. — R. Hauri beobachtete am Morgen des 2. Sept. 1953 südlich des Seedammes von Melide eine Schar von 19 S., *L. argentatus michahellis*. Darunter befanden sich 5 ausgefärbte ad. Exemplare. Sämtliche Vögel hielten sich in einer geschlossenen Gruppe auf dem Wasserspiegel auf; OB. 51 28. — Am 4. Sept. 1953 ein ad. Ex. bei Lugano; UC. — Osteno : 7. Nov. 1953, 3 ad. S.; AW. — Vom 28. November bis 7. Dez. 1953 hielt sich bei der Badanstalt Lugano eine adulte unberingte S. mit fleischfarbenen Füßen auf; AW. — Am 29. April 1956 2 S. im Tessindelta, am folgenden Tage 2 ad. Ex. an der Maggiamündung, ebenda 1 Ex. am 3. Mai 1956; UC u. B. — Am 2. Juni 1956 beobachteten E. und BCa im Maggiadelta einen Flug von etwa 10 juv. S., die Richtung Magadino zogen.

Schmarotzerraubmöwe, Stercorarius parasiticus. Am 5. Sept. 1909 wurde an der Grenze des Val Colla, auf der Alpe Bolla (1016 m) am Mte. Boglia eine Sch. erbeutet, deren Magen *Geotrupes*, *Otiorrhynchus armadillo*, *Liparus (Molytes)*, *Silpha obscura*, Larven von *Colymbetes*, Reste von *Agrotis*, viele Ameisen, kleine Hymenopteren, *Tettix* und andere Orthopteren enthielt; A. Mathey-Dupraz, nach freundl. Mitteilung von Dr. W. Knopfli (Zürich).

Blässralle, Fulica atra. Lugano : 1. Jan. 1952, relativ wenige B. Ebenda beim Parco civico am 22. Jan. 1954 54 Ex.; UC. — Tessin- und Verzascadelta : 1. Okt. 1954 (schön) 2 B.; UC, HI. — Am 22. Juli 1955 viele ad. und juv. B. an der Bolla rossa im Verzascadelta; UC. — Am 30. April 1956 und 4. Mai 1956 je 1 B. an der Bolla rossa; UC.

Teichralle, Gallinula chloropus. Ein am 29. Nov. 1948 in Lugano beringtes Ex. wurde nach 4 Tagen in den Sümpfen von Viareggio erlegt (Entfernung in der Luftlinie ca. 265 km); Riv. Ital. Orn. (2) 19 79 (1949). — Am 1. Jan. 1952 eine T. beim Parco civico in Lugano; UC. — Am 20. April 1952 auf der stark eutrophierten Bolla rossa (Verzascadelta) mindestens 7 ad. T., ziemlich nahe beisammen; UC. — Verzascadelta : 6. Aug. 1953, 1 + 2 ad. T., je mit einigen ganz schwarzen Jungen; BBC. — Auf der üppig verkrauteten Bolla rossa am 4. Sept. 1953 viele T., zirka 6 erwachsene Junge neben ad. Individuen; UC. — Am 1. Okt. 1954 2 ad. Ex. auf der Bolla rossa; UC, HI. — Locarno : Am 22. Juli

1955 viele ad. und juv. T. auf der Bolla rossa, ebenda viele junge Individ. des Jahres am 29. Juli 1955, ferner 5-6 T. am selben Wasserlauf am 30. April 1956; UC.

B. DIE VOGELFORMATION DES GEOSITONS

Kolkrabe, Corvus corax. MS beobachtete am 18. April 1951 7 K. des im unteren Tessin seltenen K. zwischen Contra und Mergoscia im Verzascatal; OB. 49 90. — Gotthardpasshöhe : 14. Okt. 1954, mindestens 2 K.; BBC. — Pian Magadino : 19. April 1956, 2 K. gegen den Mte. Tamaro ziehend; BBC. — Am 2. Juni 1956 2 km vor der Lukmanier-Passhöhe 1 K.; E. und BCa. — Pian Magadino : 17. Sept. 1956, 2 K. an der mittleren Bolla rossa; PT, WF u. B. — Maggiadelta : 8. Dez. 1956, 2 K. Richtung Mte. Verità fliegend, am 23. Dez. 1956 2 Ex. am rechten Tessinufer (Pian Magadino); PT.

Nebelkrähe, Corvus corone cornix. Am 13. April 1951 an der Maggiamündung ein Paar N. am Nest, am 14. d.M. in dieser Gegend bis 8 Ex. beisammen, auch Mischpaare Raben-Nebelkrähe, während weiter oben in den Tälern nur Rabenkrähen beobachtet wurden; MS, OB. 49 90. — Am 24. Sept. 1951 viele N. im Pian Magadino, am nächsten Tage 16 Individ. im Maggiadelta bei Locarno. Am 2. Okt. 1951 N. im Maggiadelta bei Ascona; UC u. B. — Am 31. Dez. 1951 zirka 30 Nebel- und 10 Rabenkrähen (Mischschwarm) im offenen Feldgelände E Losone Nahrung suchend; UC. — Am 20. April 1952 mehrere N. + 1 Rabenkrähe im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Maggiadelta bei Locarno : 10. März 1953, zirka 10 N., ebenda mehrere Individ. auch am folgenden Tage, am 12. März 1953 4 N. zwischen Solduno und Ponte Brolla; UC. — Am 4. Sept. 1953 zwischen Biasca und Acquarossa 3-4 N. auf einer Wiese mit grossen Felsblöcken; UC. — Am 20. Juni 1955 3 N. — Bastarde bei Bodio (Leventina); UC. — Locarno : 19. Juli 1955, 2 N. an der Maggia; UC. — Am 30. April 1956 Nebelkrähen im Maggiadelta-Locarno und Bastarde bei Ascona; UC. — Maggiadelta : 2. Juni 1956, 3 N.; E. und BCa. — Am 28. Okt. 1956 1-2 N. mit 3 Rabenkrähen auf einer apertn Futterwiese bei Faido; BCa.

Rabenkrähe, Corvus c. corone. Am 14. März 1953 R. bei Faido; UC. — Pian Magadino : 4. Mai 1956, 1 R. auf Vierergelege brütend, Horst auf einer Weide (Salix) an der Bolla rossa; UC u. B. — Pian Magadino: Am 28. Okt. 1956 zwischen Gaggiolo und Gudo ca. 40 R. auf einem Brachacker, weitere 30 Individ. im Flug; BCa.

Elster, Pica pica. Im Mai 1945 traf RM 1-2 Paar E. bei Arogno an. Am 2. Mai 1956 war daselbst kein einziges Ex. festzustellen; UC. — Laut R. Sartori, *Il nostro Paese* 4 281 (1952) soll die E. vor etwa 30-40 Jahren am Mte. Crocette und auf den unteren, nördlichen Abhängen des Mte. Generoso in guter Anzahl vorgekommen sein. Sartori, der in der

genannten Gegend seit 1939 beobachtet, konnte nie eine E. konstatieren. AW hat während seines über 37 Jahre dauernden Aufenthaltes im Tessin daselbst nie eine E. gesehen; *Il nostro Paese* 6 536 (1956).

Alpendohle, Pyrrhocorax graculus. Am 22. Sept. 1951 oberhalb des Gotthardospizes ein Verband von 150-200 A.; UC, SH. — Am 11. Dez. 1952 sah R. Sartori auf dem Mte. Crocette (Generosomassiv) bei zirka 1000 m ü. M. einen Verband von etwa 80, am 30. Dez. 1952 in derselben Gegend bei zirka 700 m ü. M. einen Trupp von 8 A. — Am 2. Juni 1956 3 km vor der Lukmanier-Passhöhe 30 A. im Flug; E. und BCa.

Star, Sturnus vulgaris. Am 23. Sept. 1951 1 Star im Pian Magadino (Aeroporto), am folgenden Tag 1 juv. Ex. im Pian Magadino, ebenda 3 Ex. am 25. Sept. 1951, am folgenden Tag (regnerisch) ebenda ca. 30 Indiv., desgl. einige Ex. am 1. Okt. 1951 und viele Indiv. am 2. Okt. 1951 im Maggiadelta bei Ascona; UC u. B. — Ein am 10. Juni 1952 in Rauschwitz bei Bürgel (Thüringen) beringter Star wurde am 20. Okt. 1952 bei Cresciano (Bellinzona), 560 km SSW erlegt; OB. 50 180. — Ein am 23. Mai 1952 nestjung in der Bjelowescher Wüste, 60 km W Brest (Russland) beringter Star wurde am 26. März 1953 bei Giubiasco, 1150 km SW aufgefunden; OB. 52 186. — Am 10. März 1953 1 Star in Gesellschaft von Rot- und Wacholderdrosseln im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Tessindelta : 6. Aug. 1953, etwa 1 Dutzend Stare; BBC. — Maggiadelta-Locarno : 27. Sept. 1954 (schön), ca. 50 Ex. Maggiadelta-Ascona, 30. Sept. 1954, ca. 20 Stare. Tessindelta, 1. Okt. 1954, 6-7 Ex. im Schilf; UC, HI. — Am 28. April 1956 ca. 10 Stare im Flugplatzareal (Pian Magadino), am 30. April 1956 1 Ex. im Maggiadelta bei Ascona, am 2. Mai 1956 5-6 Indiv. bei Melano; UC. — Ascona : 29. Juni 1956, ein Flug von ca. 20-25 ad. und juv. Ex. Ebenda am 21. Juli 1956 ein Trupp von 35-50 Indiv.; PT. — Maggiadelta : 13. Aug. 1956, 3-4 Ex. auf Viehweiden, 15-20 Indiv. auf Rasenflächen im Golfareal Ascona; PT. — Pian Magadino : Am 28. Okt. 1956 ein Flug Stare über den Wiesen bei Gaggiolo, ca. 100 Ex. auf Schafweiden beim Flugplatz Magadino; BCa. — Tenero : 23. Dez. 1956, 3 Ex. in Obstbaumallee. Am folgenden Tage je 3 bzw. 7-8 St. in Ascona; PT.

Rosenstar, Pastor roseus. ad. ♂, leg. Donini, Gentilino, in Coll. Mus. Liceo Lugano. Vergl. dazu: Die Vögel des Kantons Tessin (1945, p. 124).

Zitronfink, Chloroptila citrinella. Airolo : 21. März 1941. Am Nordausgang des Dorfes singt bei schönem warmem Wetter ein Z. auf einem Draht; E. M. Lang. — Am 22. April 1956 1 Ex. im Maggiadelta bei Locarno; RM. — Am 2. Juni 1956 10 Z. 3 km vor der Lukmanier-Passhöhe; E. und BCa.

Bluthänfling, Linota cannabina. Maggiadelta bei Locarno: 11. März 1953, 1 B., am 30. April 1956 1 Ex. im Pian Magadino; UC.

Girlitz, Serinus canaria serinus. Am 10. März 1953 3 G. am Uferdamm der Maggia bei Locarno; UC. — Locarno : 25. Juli 1955, Gesang

in Locarno; UC. — Am 2. Juni 1956 ein singender G. bei Valico, 890 m ü. M. am Lucomagno; E. und BCa.

Buchfink, Fringilla coelebs. Am 30. Dez. 1951 wenige B. im Maggiadelta bei Locarno, weitere Ex., besonders ♂♂, im Verzascadelta. Am folgenden Tage viele Individ. im Maggiadelta bei Ascona; UC. — Am 20. April 1952 guter B.-Schlag in der Gegend des Lido von Locarno (auch « Regenruf » vernommen) sowie im Auenwald des Verzascadeltas; UC. — Maggiadelta bei Locarno : 10. März 1953, mehrere B. bei wolkenlosem Himmel gut schlagend; UC. — Locarno : Am 22. Juli 1955 schlägt im Auenwald des Verzascadeltas 1 ♂ um 10.30 Uhr wiederholt und gut, ebenso am folgenden Tage bei heissem Wetter um 11 Uhr bei Costa ob Intragna. Am 24. Juli 1955 « Regenruf » des B. bei Fusio, am 27. Juli 1955 B. auf der Isola di Brissago, am 30. Juli 1955 1 B. mit « Regenruf » auf der Alpe Cardada, ca. 1700 m ü. M., ob Locarno. Am 31. Juli 1955 verzehrt ein B. die roten Beeren (oder die Samen derselben) einer exotischen Abies-Art im Garten des Hotels Belvedere in Locarno. Am 2. Aug. 1955 schlagen Buchfinken in einem Pappelhain des Verzascadeltas; UC. — Am 30. April 1956 guter Schlag des B. im Maggiadelta bei Locarno und im Garten des Hotels Belvedere (Locarno); UC.

Nordfink, Fringilla montifringilla. Ein am 10. Febr. 1950 bei Rokycany (Pilsen, Tschechoslowakei) beringtes ad. ♂ ist am 11. Dez. 1951 bei Lugano, ca. 550 km SW, tot aufgefunden worden; OB. 50 181. — Am 24. Dez. 1950 hielten sich etwa 200 N. an der Gandriastrasse (Lugano) auf. Zwischen dem 10. und 14. Febr. 1951 ob Brissago (600 m ü. M.) einige N. unter vielen Buchfinken im Reb Gelände. Der Schnee reichte damals auf etwa 700 m herab; AS, OB. 50 72. — Maggiadelta bei Locarno : 11. März 1953, ein N. mit « quät »-Ruf; UC. — Am 29. Okt. 1956 4 N. am Grat zum Mte. Croce bei 1050 m ü. M. nach SSW überhinfliegend; BCa.

Goldammer, Emberiza citrinella. Am 31. Dez. 1951 einige Ex. in Gebüschhecken am Feldrand bei Losone; UC. — Am 2. Juni 1956 ca. 10 km unterhalb der Lukmanier-Passhöhe 1 G.; E. und BCa. — Am 28. Okt. 1956 vis-à-vis von Gudo, auf der linken Seite des Tessin, 30 G. auf einem gedüngten Winterweizenfeld zwischen den Furchen Nahrung suchend; BCa.

Zaunammer, Emberiza cirrus. Am 30. April 1951 ein Paar Z. bei Vacallo; GR, NO. 21 171. — Ein ♂ singt regelmässig im Buschwald oberhalb eines Weinberges bei Salorino, 550 m ü. M., zuerst gehört am 13., zuletzt am 22. Juni 1954 (später nicht mehr kontrolliert). Das Revier ist sehr gross, etwa 250 m lang; E. Stresemann, OB. 52 8.

Gartenammer, Emberiza hortulana. Pian Magadino : 26. Sept. 1951 (regnerisch), 8-10 G.; UC. — Am 30. April 1956 ein ♀ im Maggiadelta bei Locarno, am 3. Mai 1956 1 ♂ im Pian Magadino b. Gordola; UC.

— Am 28. Okt. 1956 vis-à-vis von Gudo 8 G. in Gesellschaft von ca. 30 Goldammern in einem Winterweizenfeld; BCa.

Zippammer, Emberiza cia. GR beobachtete am 25. April 1951 ein ♂ bei Cavallino, am 30. April d.J. eines am Mte. Brè (Lugano); NO. 21 171. — Am 31. Dez. 1951 2 Z. auf Bäumen am Ufer der Maggia zwischen Ponte Brolla und Solduno, E Losone; UC. — AW sah am 6. Jan. 1952 ein ♂ in den Rebenanlagen zwischen der Gandriastrasse und S. Domenico - Castagnola. — Ueber ein fast ganz albinotisches ♀ der Z., das zwischen dem 20. und 25. Nov. 1952 durch E. Pigazzini in der Gegend von Cugnasco erlegt worden ist, berichtet AW, OB. 50 30f. — AW beobachtete am 28. Dez. 1952 2. Z. an der Gandriastrasse (Luganese). — Am 10. März 1953 eine Z. im Verzascadelta, am 12. März d. J. Dutzende von Z. (♂, ♀) im Strauchwerk an der Maggia zwischen Solduno und Ponte Brolla, ein Ex. bei Avegno; UC. — Am 13. Juni 1954 Gesang oberhalb des Steinbruchs beim Grotto Loverciano, 500 m ü. M. (Mendrisiotto). Am 23. Juni 1954 singen 2 ♂ ♂ in Hörweite voneinander von den Spitzen mittelhoher Bäume im Buschwald nahe grossen Felsplatten oberhalb des Kirchleins Sant'Antonio bei Obino, etwa 550 m ü.M. Am 25. Juni 1954 singt ein ♂ auf einem Telefondraht unterhalb der steilen Felswände von Gandria; E. Stresemann, OB. 52 8. — Am 3. Febr. 1956 ca. 40-50 Z. in einer Baumgruppe im Maggiadelta; PT. — Am 29. April 1956 2-3 Z. in einer Ginsterformation bei Losone; UC, HI, RM. — Am 28. Okt. 1956 bei Magadino ca. 6 Z. in über mannshohen Sanddornbüschen und dichten Weiden. An den Nordhängen Schneefall bis ca. 500 m herab. Am 30. Okt. 1956 ca. 5 Z. an den von Haselsträuchern bestandenen Hängen am Fusse der Cima di Medeglia oberhalb des Ceneri; BCa.

Rohrammer, Emberiza schoeniclus. 1 Ex. am 1. Okt. 1951 im Pian Magadino; UC. — Pian Magadino (Uferschilf): 27. Juli bis 8. Aug. 1952, 1 R.; E. und BCa. — Am 10. März 1953 4 ♀♀ in kleinen Schilfbeständen im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Bolla rossa (Pian Magadino): 30. April 1956, R.; UC. — Tessinmündung: 2. Juni 1956, 10 R.; E. und BCa.

[*Lapplandammer, Calcarius lapponicus.*] A. Brenni erbeutete am 3. Okt. 1954 in Gaggiolo di Cantello (Prov. di Varese), nur etwa 150 m jenseits der Schweizergrenze bei Stabio, ein ♂ der L. von 27 gr Gewicht. Das Exemplar wurde präpariert und wird der Vogelwarte Sempach übergeben; AW, OB. 52 45.

Rotkopfsperling, Passer domesticus italiae. Am 11. März 1953 im Maggiadelta bei Locarno R. in Schilfbeständen; UC. — Am 28. Sept. 1954 R. in Sonogno (Valle Verzasca); UC, HI. — Am 24. Juli 1955 R. zahlreich in Fusio, auch in Steinbrüchen bei Riveo angetroffen; UC. — Am 31. Juli 1955 ein isabellfarbiges ♀ in Locarno. Gleichtags und am 1. Aug. 1955 füttern ♂ und ♀ laut bettelnde Junge in einer Nische

neben einem Balkon der 3. Etage des Hotels Belvedere ob Locarno. Am 3. Aug. 1955 ein flügger junger R. auf Abies im Garten des genannten Hotels; UC. — Siehe auch H. Mühlemann, VdH 22 75-77 (1952).

Feldsperling, Passer montanus. Am 30. Dez. 1951 1 F. im Maggiadelta bei Locarno, weitere Individ. im Verzascadelta, am 31. Dez. 1951 auch im Maggiadelta bei Ascona festgestellt; UC. — Maggiadelta bei Locarno, 10. März 1953, Maggiadelta bei Ascona, 30. April 1956, F.; UC. — Am 28. Okt. 1956 bei Ponte 30 F. in Weidengebüschen auf dem linken Tessindamm; BCa.

Schneesperling, Montifringilla nivalis. Am 26. Nov. 1956 erhielt AW ein ♂ von der Alpe Traorno am Camoghè.

Ohrenlerche, Eremophila alpestris. Belegexemplar (♂) vom September 1922 aus dem Pian Magadino in Coll. Liceo Locarno. Vergl.: Die Vögel des Kantons Tessin (1945, p. 153f.).

Heidelerche, Lullula arborea. Vom 23. September bis 1. Okt. 1951 H. da und dort im Pian Magadino (Tessinmündungsgebiet, Cugnasco) und namentlich im Maggiadelta bei Locarno, wo am 25. Sept. d.J. drei Ex. gut sangen. Diese Lerchen halten sich mit Vorliebe auf ariden Böden (Sandfluren, dürre Grassteppen) auf; UC u. B. — Am 31. Dez. 1951 im Maggiadelta bei Ascona (Areal des Aerodromo) Trupp von 12 H.; UC. — Am 12. März 1953 eine H. südlich Ponte Brolla um 10.15 Uhr singend; UC. — Am 30. Sept. 1954 3 H. im Maggiadelta - Ascona; UC, HI. — Am 29. April 1956 singende Ex. bei Losone, am folgenden Tag 1 H. im Maggiadelta Locarno und am 1. Mai 1956 2 Ex. im Pian Magadino, Höhe Gudo; UC. — Am 30. Okt. 1956 strich unterhalb der Cima di Medeglia (Ceneri) bei 950 m ü. M. eine H. Richtung Rivera, etwa 25 m über dem Boden rufend der Berghalde entlang; BCa.

Feldlerche, Alauda arvensis. Am 29. April 1951 nahm GR in der Ebene zwischen Capolago und Mendrisio eine einzige singende F. wahr; NO. 21 171. — Am 23. Sept. 1951 F. im Verzascadelta, am nächsten Tage F. im Tessindelta, am 26. Sept. d.J. viele Individ. im Pian Magadino, am 28. Sept. 1951 F. auf der Vedeggio-Ebene (unterer Abschnitt), am 1. Okt. 1951 viele Ex. im Pian Magadino, am 2. Okt. 1951 F. im Maggiadelta bei Ascona; UC, SH. — Am 10. März 1953 1 F. im Maggiadelta-Locarno, 1 Ex. mit Gesangsfragmenten im Verzascadelta, am 11. März 1953 4 Ex. im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Am 2. Aug. 1955 F. an der Tessinmündung, am 29. April 1956 desgl. im Pian Magadino; UC. — Am 31. Dez. 1951 1 F. im Maggiadelta bei Ascona (Aerodromo); UC. — Am 28. Okt. 1956 ca. 80 F. unterhalb des Gutes «Demanio» in einem sehr grossen Brachfeld (Pian Magadino); BCa.

Brachpieper, Anthus campestris. ♂ vom Pian Vedeggio (Luganese) von 10. Mai 1892 in Coll. Mus. Zofingen. — Am 23. Sept. 1951 einige B. im Pian Magadino, Höhe Riazzino, auf gemähter Feldwiese und 1 Ex.

auf Brache mit Sandfluren und spärlichem Grasbewuchs neben dem Flussdamm, wenig oberhalb der Tessinmündung, ein weiterer B. im Wiesengelände in der Gegend der Tenuta del Piano; am 26. Sept. 1951 2 B. im Feldgelände des Pian Magadino, Höhe Riazzino, auf Wiese neben Mais- und Tabakkulturen, am 1. Okt. 1951 5-6 Ex. im Pian Magadino, Höhe Cugnasco, auf Sand- und Kiesböden (Ueberschwemmungen des Ticino); UC u. B. — Maggiadelta-Ascona : 15. Mai 1953, 1 B.; E. und BCa. — Locarno : Maggiadelta, 27. Sept. 1954 (schön), 1 B., auch auf 6 m hoher Pappel. Am 30. Sept. 1954 im Golfareal des Maggiadeltas-Ascona 3 B., die sich u.a. auch auf eine Umzäunung setzen. Am 1. Okt. 1954 einige B. im Tessin- und Verzascadelta; UC, HI. — Am 29. April 1956 1 B. im Tessindelta; UC.

Baumpieper, Anthus trivialis. Am 14. April 1951 B. bei Losone; MS, OB. 49 92. — Vom 24. September bis 2. Okt. 1951 vereinzelt im Pian Magadino, im Maggiadelta bei Locarno und Ascona, in der Vedeggioebene, bei Mendrisio (Laveggioebene) und bei Stabio. Durchzug sehr schwach; UC u. B. — Maggiadelta-Ascona : 14. Mai 1953, 3 B. im Golfareal; E. und BCa. — Maggiadelta bei Locarno : 27. Sept. 1954 (schön), 1 B.; UC. — Pian Magadino : 29. April 1956, B., am folgenden Tage im Maggiadelta bei Ascona diverse Ex.; UC.

Wiesenpieper, Anthus pratensis. Pian Magadino : 29. April 1956, 1 W.; UC u. B.

Bergpieper, Anthus spinoletta. Am 22. Sept. 1951 nur noch wenige B. in der Umgebung des Gotthardospizes, ca. 2100 m ü. M.; UC, SH. — Am 30. Dez. 1951 mehrere B. im Maggiadelta bei Locarno, diverse Individ. im Verzascadelta; UC. — Am 10. März 1953 mehrere B. im Maggiadelta bei Locarno und an der Bolla rossa (Verzascadelta); UC. — Am 2. Juni 1956 4 km unterhalb der Lukmanier-Passhöhe 15 B. in den blühenden Krokusfeldern zwischen Schneeflecken Nahrung suchend; E. und BCa. — Am 30. Okt. 1956 drei B. in den Wiesen bei Cadenazzo; BCa.

Schafstelze, Motacilla flava. Belegstück von *M. f. rayii* (♂) vom 8. April 1910 in Coll. Castello di Locarno; kontr. UC, Juli 1955. — MS sah am 14. April 1951 ein Ex. der Rasse *M. f. cinereocapilla* im Maggiadelta unter Vertretern der Nominatform; OB. 49 92. — Vom 23. September bis 2. Okt. 1951 Sch. zahlreich im Pian Magadino sowie im Maggiadelta (Locarno, Ascona), öfters Verbände von über 50 Individ., meist auf kurzgrasigen, auch gemähten Wiesen, überhinfliegend, rufend; UC u. B. — Locarno : 27. Sept. 1954 (schön), vereinzelt Sch., 4 Ex. im Tessindelta. Am 1. Okt. 1954 div. Ex. im Tessin- und Verzascadelta; UC, HI. — Am 30. April 1956 3 Sch. im Maggiadelta-Ascona. Am 4. Mai 1956 eine *M. f. flava* und eine *M. f. thunbergii* an der Bolla rossa (Pian Magadino); UC.

Bergstelze, Motacilla cinerea. Am 23. Sept. 1951 B. im Verzasca-delta, am 2. Okt. 1951 B. im Pian Magadino; UC, SH. — Am 7. Nov. 1951 zwei B. am Seeufer im Parco civico Lugano, eine einmal singend, 1 Ex. am Quai in Lugano-Paradiso; ThT. — Am 30. Dez. 1951 1 B. im Maggiadelta bei Locarno, 2 Ex. im Verzascadelta, am 31. Dez. d.J. 1 B. auf Monte Verità (Ascona), am 1. Jan. 1952 1 B. am Seeufer in Lugano; UC. — Locarno : 20./21. April 1952, 1 B. am Bach (Trockenbett) neben dem Hotel Belvedere; UC. — 10. März 1953, 1 B. im Maggiadelta bei Locarno, am folgenden Tage 2 Ex. bei Riazzino, am 12. März 1953 Bn. zwischen Solduno und Ponte Brolla; UC. — Am 24. Juli 1955 B. bei Fusio, am 3. Aug. 1955 B. bei Ponte Brolla, am 29. April 1956 B. im Pian Magadino; UC. — Giubiasco : 28. Okt. 1956, einige B. auf Steinen am Tessin Nahrung suchend; BCa.

Bachstelze, Motacilla alba. Am 30. Dez. 1951 2 B. an der Maggia im Delta bei Locarno, 1 Ex. im Verzascadelta; am 31. Dez. 1951 2 B. am Seeufer bei Ascona; UC. — Am 10. März 1953 mehrere B. an der Maggia bei Locarno, am 12. März 1953 Bn. zwischen Solduno und Ponte Brolla; UC. — Am 27. Sept. 1954 vereinzelt Bn. im Maggiadelta bei Locarno, 1 Ex. im Tessindelta; UC, HI. — B. am 27. Juli 1955 auf der Isola di Brissago; UC. — Tessinmündung : 2. Juni 1956, 2 B.; E. und BCa.

Mauerläufer, Tichodroma muraria. Piottino, 20. April 1956, 1 M. am Strassentunnel; BBC. — Vergl. R. Sartori (1954).

Dornwürger, Lanius collurio. Am 29. Juli 1955 1 D. im Verzasca-delta, am 2. Aug. 1955 1 D. an der Tessinmündung, am folgenden Tage 1 D. bei Ponte Brolla; UC. — Am 29. April 1956 zwei ♂♂ im Pian Magadino; UC. — Vergl. H. Mühlemann, VdH 20 115 (1950) und R. Sartori (1953).

Rotkopfwürger, Lanius senator. AW hat uns einen R. vom Herbst 1955 aus Lamone gemeldet. — Am 30. April 1956 1 ♂ bei Gordola; UC. — Am 27. Mai 1956 ein singendes ♂ bei Dalpe-Cornone, ca. 1200 m ü. M., W Faido; AW. — Am 29. Juni 1956 1-2 R. im Golfareal Ascona, ebenda 3 Ex. am 21. Juli d.J.; PT.

Schwarzstirnwürger, Lanius minor. Am 13. Aug. 1956 ein Ex. im Golfareal bei Ascona; PT.

Raubwürger, Lanius excubitor. Am 11. und 14. März 1956 je 1 R. im Maggiadelta; PT.

Feldschwirl, Locustella naevia. Am 3. Mai 1956 ein F. an der Bolla rossa (Pian Magadino) schwach und unregelmässig schwirrend; UC, RM. — Maggiadelta : 20. Sept. 1956, 1 F. in jungem Robiniengebüsch (Feld-gelände); PT, WF.

Rohrschwirl, Locustella luscinioides. Neu für den Tessin. Am 11. und 12. Juni 1954 konnten BBC, MS u. B. am linken Ufer des Tessin, etwa 300 m oberhalb seiner Mündung, während längerer Zeit einen sin-

genden R. beobachten. Der Vogel hielt sich an beiden Tagen an genau derselben Stelle auf und bewegte sich nur im Umkreis von 3-4 Metern in einem von einigen Schilfhalmern durchwachsenen Dickicht von etwa 2-4 Meter hohen Weidengebüschen, das sich am Rande einer Senke mit üppiger Sumpfflora in 10-30 cm tiefem Wasser befand. Am 9. Juni 1954 beobachteten auch H. Suter u. B. einen R., jedoch am linken Verzascaufer, sodass es sich möglicherweise um einen zweiten Standort dieser Art handelt; MS, H. Suter, OB. 52 13f.

Wacholderdrossel, Turdus pilaris. Am 30. Dez. 1951 1 W. im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Ein am 18. Juli 1952 bei Fulda (Hessen) beringtes juv. Ex. wurde am 18. Nov. 1952 bei Bodio, 460 km S erlegt; OB. 50 183. — Am 10. und 13. März 1953 im Maggiadelta bei Locarno mindestens 3 W. mit mind. 2 Rotdrosseln in den Kronen entlaubter Bäume. Am folgenden Tag ebenda (Gegend des Lido) zirka 10 W. unweit der Strandzone mit 10 Rotdrosseln, singend; UC. — Melanotisches Ex. vom Oktober 1905 aus dem Tessin in Coll. Mus. Zofingen.

Misteldrossel, Turdus viscivorus. Am 11. März 1953 im Tessindelta (Richtung Cadenazzo) 7 M. in etwas moorigem Wiesengelände, unweit des Ticino; UC. — Am 2. Juni 1956 ein Ex. 3 km vor der Lukmanier-Passhöhe; E. und BCa. — Am 29. Okt. 1956 15 M. unterhalb des Mte. Croce-Grates an der mit Ginster bestandenen Ostflanke; BCa.

Singdrossel, Turdus ericetorum. Am 30. April 1956 S. im Pian Magadino, am 5. Mai 1956 S. im Maggiadelta bei Ascona; UC. — Pian Magadino : 28. Okt. 1956, 1 S. am Tessindamm; BCa.

Rotdrossel, Turdus musicus. Pian Magadino : 28. Okt. 1956, 2 R. in den Feldern von Gaggiolo; BCa. — Siehe auch unter Wacholderdrossel !

Schwarzdrossel, Turdus merula. Eine am 14. Juli 1949 nestjung in Chleny bei Kostelec a/Orl. beringte Amsel wurde im Februar 1950 tot am Mte. Generoso, 700 km SSW aufgefunden; OB. 48 194. — Eine von R. Sartori am 14. Mai 1950 bei Arogno nestjung beringte Sch. wurde im Februar 1951 bei Civitavecchia (Roma), ca. 480 km SSE erlegt; OB. 50 183. — Am 28. Okt. 1956 vier Sch. bei Giubiasco in einem Buschkomplex an der Morobbia; BCa. — Am 30. Okt. 1956 5 Amseln auf dem Mte. Ceneri; BCa.

Blaumerle, Monticola solitarius. An der Gandriastrasse bei Lugano beobachtete AW am 8. Dez. 1951 längere Zeit auf etwa 35 m Distanz ein B. — ♂ an einer Felswand. Am 16. Dez. 1951 flog ein ♂, vom See herkommend und nach der Höhe strebend, in ein Felstobel oberhalb der Gandriastrasse ein. Im gleichen Gebiet nahm AW am 24. und 31. Dez. 1951 wiederum je eine B. wahr; OB. 49 97 f. — GR konnte die B. am 25. April 1951 an den Felsen bei Cavallino und am 27. April d. J. am S. Salvatore beobachten; NO. 21 171. — Am 10. Juni 1954 wurde bei

Gandria ein ♀ gesichtet, das offenbar im Felsgeröll ein Nest mit Jungen hatte; E. Stresemann, OB. 52 10. Die B. nistet nicht in Felsgeröll, sondern in Felsspalten; Anm. UC.

Steinmerle, Monticola saxatilis. Ein ♂ singt im Fluge am 1. Mai 1951 in der Nähe des Gipfels des Mte. Brè (Lugano); GR, NO. 21 171. — Das Naturhistorische Museum Basel erhielt am 1. Juli 1951 einen flüggen Jungvogel von der Passhöhe Gola di Lago, 960 m ü.M., Val Capiasca bei Tesserete. — R. Sartori (1952) berichtet, er habe die St. im Gebiet des Mte. Generoso, wo früher an bestimmten Orten alljährlich im Frühjahr unfehlbar ein Nest dieses Vogels zu finden gewesen sei, anno 1935 zum letzten Male beobachtet. — E. Stresemann konstatierte am 23. Juni 1954 ein singendes ♂ auf einem Grenzstein des Nebengipfels des Mte. Generoso bei 1700 m ü.M. und am 25. Juni 1954 ein ♀ etwa 800 m vom Singplatz des vorigen entfernt bei 1600 m ü.M. an Felsschroffen; OB. 52 10.

Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe. Locarno : 20. April 1952, 5 St. im Maggiadelta, auf Acker verteilt, 1 Individ. auf Steinhäufen ebenda, alle Ex. im schlichten Kleid; UC. — Maggiadelta-Locarno : 27. Sept. 1954 (schön), 1 St. in Acker; UC. HI. — Ein St. am 29. April 1956 im Pian Magadino, 1 Ex. am 30. April d.J. im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Am 2. Juni 1956, 1 ♂ 3 km vor der Lukmanier-Passhöhe; E. und BCa.

Braunkehlchen, Saxicola rubetra. Gordola, 20. April 1952, 1 B. auf Feldbäumchen; UC. — Pian Magadino (Felder): 27. Juli bis 8. Aug. 1952, 3-4 B.; E. und B. Ca. — Maggiadelta-Ascona : 15. Mai 1953, 2 B.; E. und BCa. — Am 2. Aug. 1955 (schön) 1 B. an der Tessinmündung, am 29. April 1956 B. im Pian Magadino, ebenda viele Individ. am 3. Mai d.J.; UC.

Schwarzkehlchen, Saxicola torquata. Am 29. April 1951 ein Brutpaar zwischen Capolago und Mendrisio. Am folgenden Tag fütterte bei Vacallo ein Paar Sch. 3 Junge, die soeben das Nest verlassen hatten; gleichentags 1 ♂ zwischen Roggiana und Chiasso sowie ein Paar und 6 selbständige Junge in einem Acker bei Chiasso. Am 1. Mai 1951 ein ♂ am Mte. Brè bei Lugano; GR, NO. 21 171. — Pian Magadino : 23. Sept. 1951; Sch., ebenda 2 Ex. am 26. Sept. 1951; am 27./28. Sept. 1951 1 Sch. bei Mendrisio. Am 2. Okt. 1951 2-3 Ex. im Maggiadelta bei Ascona; UC u. B. — Am 31. Dez. 1951 1 ♂ E. Losone im Feldgelände (Aecker, Maisfelder, Wiesen); UC. — Gordola: 20. April 1952, 1 Ex. mit Futter auf Wiesenzaun und Leitungsdrähten, Nähe Bahnstation; UC. — H. Mühlemann sah vom 1.-4. Aug. 1951 täglich ein Paar Sch. zwischen Mendrisio und Casvegno; VdH 22 98. — Maggiadelta bei Locarno: 10. März 1953, 1 ad. ♂ in der Krone einer grossen laubkahlen Weide, beim Wechsel der Warte auch im Fluge singend; UC. — Am 4. Sept. 1953 2 Ex. zwischen Biasca und Acquarossa; UC. — Maggiadelta bei Locarno: 27. Sept. 1954 (schön), 3-4 Sch. Am 28. Sept. d. J. in Weingärten am

Eingang zur Valle Verzasca 2 ♂ ♂ ; UC, HI. — Am 5. Mai 1956 1 ♂ im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Giubiasco : 28. Okt. 1956, 1 Paar Sch. auf kleinen Büschen längs einer Wiese bei der Einmündung der Morobbia in den Tessin; BCa.

Gartenrötel, Phoenicurus phoenicurus. Locarno : 21. April 1952, 1 ♂ neben Hütte und Misthaufen; UC. — Locarno : Am 27. Sept. 1954 (schön) 1 ad. G. und 1 ♂ (Kopfgefieder in der Mauser) im Maggiadelta; UC, HI. — Am 29. April 1956 viele G. im Pian Magadino, am folgenden Tage viele Ex. im Maggiadelta bei Locarno; UC.

Hausrötel, Phoenicurus ochruros. GR gewahrte am 24. April 1951 ein singendes ♂ am S. Salvatore, konnte aber sonst nirgends in der Gegend einen weiteren Vertreter dieser Art beobachten; NO. 21 171. — Am 2. Juni 1956 ein H. 3 km vor der Lukmanier-Passhöhe; E. und BCa.

Rotkehlchen, Erithacus rubecula. Am 30. Dez. 1951 div. R. im Maggiadelta bei Locarno (Gesangsfragmente); UC. — Lugano : 22. Jan. 1954, 3 R. im Parco civico; UC. — Am 23. Juli 1955 R. bei Costa ob Intragna, ca. 750 m ü.M., singend, am 27. Juli 1955 R. auf der Isola di Brissago; UC.

Nachtigall, Luscinia megarhynchos. Ende April 1951 konstatierte GR viele singende N. bei Bissone, wo Vögel dieser Art bis in nächste Nähe der Häuser angetroffen wurden; NO. 21 171. — Am 20. April 1952 kurzer Schlag einer N. im Auenwald des Verzascadeltas. Laut AW ist die N. im Mendrisiotto 1952 schon vor einigen Tagen eingetroffen. — N. am 22. Juli 1955 im Verzascadelta wenige Male kurz anschlagend; UC.

Blaukehlchen, Luscinia svecica. Am 10. April 1956 2-3 B., am 19. April d.J. 1 ♀ im Maggiadelta; PT. — Am 18. Sept. 1956 im Maggiadelta/Locarno ein ♂ der rotsternigen Form (Fängling); PT, WF u. B. — Maggiadelta : 21. Sept. 1956, 1 weissterniges B. (Fängling) im Oedland unterhalb des Wälchligutes; PT, WF u. B.

Alpenflüßvogel, Accentor collaris. Am 28. Dez. 1952 3 A. an der Gandriastrasse (Luganese); AW. — Am 30. Okt. 1956 süßen an den fast schneefreien Hängen der Cima di Medeglia bis zu 15 A. Nahrung; BCa.

Heckenbraunelle, Prunella modularis. Am 28. Dez. 1952 1 H. bei Castagnola; AW. — Am 12. März 1953 1 H. bei Solduno (Maggiabrücke), sehr wenig scheu auf Strauchzweig; UC.

Zaunkönig, Troglodytes troglodytes. Am 30. Dez. 1951 1 Z. im Maggiadelta bei Locarno, 1 Ex. im Verzascadelta; UC. — Am 24. Juli 1955 Gesang bei Fusio; UC. — Pian Magadino : 29. April 1956, Z.; UC. — Magadino : Am 29. Okt. 1956 ein Z. mit vollem Gesang; BCa.

Wièdehopf, Upupa epops. Magadino-Tenero : 27. Juli bis 8. Aug. 1952, W. gegen 30 mal beobachtet; E. und BCa. — Am 14. und 15. Mai 1953 je ein W. im Golfareal Ascona; E. und BCa. — Tessindelta : 6.

Aug. 1953, 3 W.; BBC. — Maggiadelta : 3. April 1955 und 2 Ex. am 28. März 1956; PT. — Am 19. April 1956 ein W. in der Nähe der Tessinmündung; BBC. — Am 29. April 1956 2 W. im Pian Magadino, 2 Ex. bei Losone; UC. — Tessinmündung : 2. Juni 1956, 2 W.; E. und BCa.

Blauracke, Coracias garrulus. Beleg (♂) vom 21. Sept. 1942, erlegt von G. Stefanoni im Pian Magadino, in Coll. Liceo Lugano. — Maggiadelta : 23. April 1956 1 B., am 29. Juni 1956 ein Ex. im Golfareal bei Ascona; PT. — Am 16. Juli 1956 fand J. Sargenti ein verletztes ♂ auf dem Mte. Ceneri. Der Vogel wurde in Sempach bis am 9. Aug. 1956 gepflegt. Beleg in Coll. Naturhist. Mus. Basel; Dr. E. Sutter, in litt.

Grünspecht, Picus viridis. ad. ♂ vom 14. Juli 1901 aus Stabio in Coll. Mus. Zofingen. — Bei Ronco sopra Ascona rief der G. am 23./24. Sept. 1951; UC, SH. — Am 30./31. Dez. 1951 je ein G. im Verzascadelta und im Maggiadelta bei Ascona; UC. — Am 10. und 13. März 1953 je 1 G. im Maggiadelta bei Locarno, bei Ponte Brolla und bei Avegno rufend; UC. — Locarno : Rufe des G. am 19. Juli 1955 in Villengarten, am 23. Juli 1955 bei Intragna, am 3. Aug. d.J. bei Ponte Brolla rufend; UC. — Am 29. April 1956 Rufe des G. bei Losone, am nächsten Tag desgl. in einem Park ob Locarno und im Maggiadelta bei Ascona, am 2. Mai 1956 desgl. bei Arogno rufend; UC. — Maggiadelta : 2. Juni 1956, Rufe eines G.; E. und BCa. — Pian Magadino : 28. Okt. 1956, G.-Rufe aus Obstgärten und Feldgehölzen; BCa.

Wendehals, Jynx torquilla. Locarno : 20. und 21. April 1952, W.-Rufe beim Lido, in einem Hotelpark und an verschiedenen Stellen auf Monti della Trinità; UC. — Am 4. Sept. 1953 ein W. zwischen Biasca und Acquarossa in einer Berberitzenassoziation; UC. — Maggiadelta : 1. April 1955, 30. März 1956 (Erstbeobachtungen); PT. — Pian Magadino : 30. April 1956; UC. — Maggiadelta : 2. Juni 1956, 2 Ex. in Obstgärten rufend; E. und B. Carrara.

Kuckuck, Cuculus canorus. Am 3. Mai 1956 ein roter K. im Verzascadelta; UC. — Siehe auch R. Sartori (1953).

Uhu, Bubo bubo. Ein Uhu-Paar nistet offenbar in der Felswand gegenüber Polmengo. Den ganzen Februar 1956 hindurch, und teilweise, wenn auch weniger oft und intensiv, im März d.J., vernahm man die Rufe von ♂ und ♀. Ein Uhu wurde am hellen Tage oberhalb Faido gesehen. Dasselbst wurde laut Mitteilung des Jagdaufsehers Dominelli ein grosser Hase von einem Uhu verfolgt. Man sah die Stelle, wo der Hase von der Ohreule gefasst worden war. Neben dem Hasen lagen einige Uhufedern; BBC.

Zwergohreule, Otus scops. ♀ vom 27. Juli 1900 von Lugano in Coll. Mus. Zofingen. — Am 9. April 1952 erhielt AW eine Z., die in der ersten Aprildekade 1952 auf der Strasse zwischen Davesco und Cadro tot aufgefunden worden war.

Waldohreule, Asio otus. Bioggio : Herbst 1953, 1 Ex.; AW.

Sumpfohreule, Asio flammeus. Ganna di Canobbio: Herbst 1955, 1 Ex.; AW. — Am 20. Mai 1956 sah AW eine S. auf dem Hochplateau von Dalpe-Cornone, ca. 1200 m ü.M. W Faido, auf einer nassen Wiese. Der Vogel erhob sich in einer Entfernung von ca. 10 m an einem kleinen, mit Stauden schütter bestandenen Gewässer und flog ruhig um den Beobachter herum an eine abschüssige Stelle.

Rauhfußkauz, Aegolius funereus. Neu für den Tessin. Im Herbst 1955 wurde 1 R. am Mte. Pettine (Leventina) erbeutet; AW.

Steinkauz, Athene noctua. Juv. Paar vom 21. Juni 1900 vom S. Salvatore in Coll. Mus. Zofingen. — Maggiadelta: 1 Ex. vom 5. Januar bis 14. Juni 1956 regelmässig beobachtet, am 23. Januar d.J. 2 Ex. Im Jahre 1954 fand hier eine Brut statt; PT.

Waldkauz, Strix aluco. Am 5. Mai 1956 ruft ein W. wenig oberhalb des Hotels Belvedere (Locarno); UC.

Schleiereule, Tyto alba. ♂ der Varietät Kirchhoffii Hart. vom 18. Mai 1904 aus Carnago bei Lugano (Präp. A. Ghidini) in Coll. Mus. Zofingen. — Eine am 19. Juni 1949 nestjung in Oberramsern (Sol.) beringte Sch. wurde am 16. Dez. 1949 in der Magadino-Ebene und 6 Tage später bei St. Antonio, 150 km SE kontrolliert; OB. 48 197.

Rotfußfalke, Falco vespertinus. Riazzino: ♀ vom Herbst 1955; AW.

Steinadler, Aquila chrysaetos. Valle Verzasca: 28. Sept. 1954, 3 St. hoch über La Motta kreisend; UC, HI. — Am 14. Okt. 1954 fliegt ein jüngerer St. von der Alpe di Fortunei zu den Hängen nördlich des Lucendro-Stausees hinüber; BBC.

Mäusebussard, Buteo buteo. Ein am 28. Juni 1943 an der Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen beringter M. wurde am 5. März 1950 in der Magadinoebene bei Locarno, 225 km SW kontrolliert; OB. 48 198. — Vom 24. September bis 1. Okt. 1951 je 1-4 M. im Pian Magadino, am 28. Sept. 1951 1 Ex. in der Vedeggioebene oberhalb Agno; UC. — Am 30. Dez. 1951 2 M. über dem Verzascadelta; UC. — Riazzino: 11. März 1953, 2 M., am folgenden Tage 1 Ex. zwischen Solduno und Ponte Brolla, am 29. Juli 1955 1 M. im Verzascadelta; UC.

Rauhfußbussard, Buteo lagopus. Neu für den Tessin. Am 31. Dez. 1950 flog ein R. bei Lavorgo (Leventina) talaufwärts. Er setzte sich u. a. auf einen Felsblock; BBC.

Rohrweihe, Circus aeruginosus. Tessindelta: 19. April 1956, 2 ♀♀; BBC. — Am 29. und 30. April 1956 ein ad. ♀ wiederholt im Gebiet der Bolla rossa jagend; UC u. B. — Tessindelta: 27. Sept. 1954, ein ad. ♀ in der Gegend der Bolla rossa (Pian Magadino); UC, HI.

Wiesenweihe, Circus pygargus. Am 28. April 1956 ein ad. ♂ im Areal des Aeroporto (Pian Magadino) längere Zeit in einer Wiese sitzend,

dann mit graziösem Flug auch einige Rundflüge im Gebiet ausführend; UC, RM.

Kornweihe, Circus cyaneus. Beleg (♀) vom 11. Dez. 1949 vom Mte. Boglia (von M. Demarchi) in Coll. Liceo Lugano.

Rotmilan, Milvus milvus. Am 9. Nov. 1951 wurde im Parco Mairani in Rovello-Massagno 1 juv. R. mit Ring No. 350541 der Vogelparte Helgoland geschossen. Er war am 14. Aug. 1951 in Dessau-Anhalt als juv. Vogel beringt worden; AW (siehe auch OB. 50 192).

Wespenbussard, Pernis apivorus. Am 23. Juli 1955 ein W. bei sehr schönem Wetter mit « plööh »-Rufen in der Gegend von Costa ob Intragna, ca. 900 m ü.M., kreisend; UC.

Schlangennadler, Circaetus gallicus. Am 25. Aug. 1872 wurde an den Abhängen des Mte. S. Salvatore bei S. Martino (Lugano) ein ♀ (Vogel des Jahres) erlegt; A. Riva, La Libertà (Lugano) 7 527 (1872). — GR beobachtete am 1. Mai 1951 ein Ex. am Monte Brè bei Lugano; NO. 21 135. — Am 30. April 1952 ein Sch. gegen den Mte. Crocette (Generosomassiv) fliegend. Vom 11.-20. Mai 1952 sind ständig 2 Ex. anwesend; R. Sartori (1953). RM beobachtete am 26. April 1956 zwei Ex. am Mte. Generoso ob Mendrisio. Ebenda ein ad. Individ. am 2. Mai 1956; UC u. B.

Hausstorch, Ciconia ciconia. Aguzzo : 1 Ex., Herbst 1955; AW. — Ein am 27. Juni 1953 nestjung in Sausedlitz (Sachsen) beringter H. wurde nach Zwischenkontrollen am 1. Sept. 1953 in Wiesen/Sachsen und am 15. Sept. 1953 in Friedrichshafen/Württemberg, am 19. Sept. 1953 bei Ascona, 650 km SSW kontrolliert; OB. 52 195. — Ein am 8. Juli 1953 nestjung in Dellmensingen (Württemberg) beringter H. wurde am 15. Sept. 1953 bei Locarno, 250 km SSW aufgefunden; OB. 52 195. — Am 15. Sept. 1956 rasteten 2 H. auf dem Kaminhut der Cornohütte im hinteren Val Bedretto, S Nufenen, 2338 m ü.M. Die Vögel übernachteten daselbst und flogen am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang südwärts gegen den San-Giacomo-Pass weg; E. Rast u. B., Die Alpen 1956/Nr. 11.

Saatgans, Anser fabalis. ♂, ♀ vom 15. Dez. 1902 aus dem Pian Magadino in Coll. Mus. Zofingen. — Maggiadelta : Am 14. Febr. 1956 ein Ex., am 23./24. Febr. d.J. 4 Individ.; PT.

Ringeltaube, Columba palumbus. Maggiadelta : 29. März 1956 2 Ex., 14. Juni 1956 1 Ex.; PT. — Am 1. Mai 1956 eine einzelne R. im Pian Magadino, Höhe Gudo; UC. — Maggiadelta : 19. Sept. 1956, 2 R.; PT, WF u. B. — Pian Magadino : 28 Okt. 1956, unterhalb des Gutes « Demanio », 2 Ex. in einem Wäldchen; BCa.

Hohltaube, Columba oenas. Am 27. April 1954 hörten R. Lehmann und ich im Val Muggio in einem Kastanienwald bei Caneggio mehrmals Hohltaubenrufe. Am 10. Mai 1954 vernahm ich die H. bei Morbio Su-

periore in einem ungepflegten Forst der Gemeinde Chiasso, ferner bei Caneggio und zwischen Muggio und Bella Vista im Kastanienwald; H. Suter, OB. 52 15.

Turteltaube, Streptopelia turtur. Eine am 4. Sept. 1950 bei Meiringen (BeO) beringte juv. T. wurde am 20. Sept. 1950 am Mte. Gambarogno, 83 km SE, erlegt; OB. 48 201. — Gordola : 20. April 1952, 1 T. auf Leitungsdraht; UC. — Am 22. Juli 1955 T. im Auenwald des Verzascadeltas gurrend, am 29. April 1956 T. im Pian Magadino; UC.

Triel, Burhinus oedicephalus. Maggiadelta bei Locarno : 22. April 1956, 1 T.; RM. — Ebenda, wohl dasselbe Ex., am 1. Mai 1956; PT.

Mornellregenpfeifer, Eudromias morinellus. Neu für den Tessin. Ich erhielt am 27. Sept. 1955 einen schon stark in Verwesung übergegangenen M., den ein Tessiner Jäger im Nebel auf dem Mte. Camoghè ob Giubiasco (2232 m) am 25. d. M. geschossen haben soll. Leider konnte der Vogel nicht mehr präpariert werden, und auch sein Geschlecht liess sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Laut E. Sutter dürfte es sich um einen diesjährigen Jungvogel und nach dem geringen Flügelmass (143 mm) um ein ♂ handeln; AW, OB. 52 162.

Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula. Am 1. Mai 1956 ein S. unter Flussregenpfeifern an einem Nebenarm der Bolla rossa; PT.

Flussregenpfeifer, Charadrius dubius. Tessindelta : 27. Juli bis 8. Aug. 1952, bis 15 Individ. (2-3 juv.); E. und BCa. — Tessinmündung : 8. Sept. 1953, 2 F. auf Schotterflächen; UC. — Ebenda am 2. Aug. 1955 (schön) 2 F. Das eine Ex. zeigte eine Fluchtdistanz von 30 Schritten; UC. — Am 19. April 1956 am sandigen Ufer rechts der Tessinmündung 6-8 F. mit Balzgehaben; BBC. — Am 29. April 1956 2 F. im Tessindelta, am nächsten Tage 1 F. am Strand des Maggiadeltas bei Ascona. Am 3. Mai 1956 1 Ex. in einem Saatfeld (Pian Magadino); UC. — Maggiadelta : 2. Juni 1956, 2 Ex. auf den Kies- und Steinbänken längs der Maggia; E. und BCa.

Goldregenpfeifer, Pluvialis apricaria. G. vom 24. Nov. 1901 aus dem Pian Magadino in Coll. Mus. Zofingen. — Am 17. Nov. 1952 wurde im Pian Stampa, unterhalb Dino, im hinteren Cassaratetal ein ♂ erlegt. Das Belegstück (von Viganello) befindet sich in Coll. Liceo Lugano; AW. Vergl. OB. 50 30.

Kiebitz, Vanellus vanellus. Maggiadelta : 11. und 18. März 1956, je 1 Ex., am 3. April 1956 ein K. in der Magadinoebene über den Viehweiden unterhalb des Cattori-Gutes; PT. — Vergl. A. Ghidini, NO. 1 47.

Steinwälzer, Arenaria interpres. HI beobachtete am 20. Sept. 1955 einen St. im Herbstkleid in der Gegend der Tessinmündung.

Alpenstrandläufer, Erolia alpina. Am 18. April 1956 2 Ex. im Maggiadelta; PT.

Flussuferläufer, Actitis hypoleucos. Tessindelta : 21. Sept. 1954, 1 F.; HI. — Tessinmündung : 19. April 1956, 2 F.; BBC. — Am 29. April 1956 1 F. an der Maggia bei Losone, gleichentags 8-10 Ex. an der Tessinmündung, am 4. Mai 1956 2 Ex. an der Bolla rossa; UC. — Maggiadelta : 2. Juni 1956, 2 Ex. im Weidendickicht brütend (« Fip »-Rufe). Gleichentags an der Tessinmündung 2 F. auf Kiesbänken; E. und BCa.

Brachvogel, Numenius arquata. Maggiadelta : 25. März 1956, 6 Ex. (auf einer Wiese), am 18. April d.J. ebenda 23 Individ.; PT.

Regenbrachvogel, Numenius phaeopus. Am 19. April 1956 ein R. an der Tessinmündung, auch rufend; BBC.

Sumpfschnepfe, Capella gallinago. E. und BCa stöberten am 26. Juli 1952 in einer Sumpfwiese bei Tenero 3-4 S. auf. — Am 13. Aug. 1956 zwei Ex. im Maggiadelta bei Ascona; PT.

Zwergschnepfe, Limnocyptes minimus. Am 7. Dez. 1952 erlegte G. Deluigi (Paradiso) in Gola di Lago ob Tesserete eine Z. Ein zweites Ex. entging ihm; AW. Vergl. OB. 50 30.

Waldschnepfe, Scolopax rusticola. Am 25. Jan. 1952 eine W. an der Beretta (Generoso); R. Sartori (1953). — Am 14. März 1956 eine W. im Maggiadelta (Erlenjungholz), ebenda am 28. März d.J. ein Ex. in einem Wacholderdickicht (Föhrenwäldchen); PT. — Am 28. Okt. 1956 ein Ex. am rechten Tessindamm (Pian Magadino) unterhalb der Eisenbahnbrücke aus dichtem Unterholz hochgehend. Am nächsten Tage am Mte. Croce oberhalb Magadino bei 870 m ü.M. eine W. von einem Steilhang abfliegend, der mit Haselnusstauden und Jungkastanien bewachsen ist; BCa.

Kranich, Grus grus. Am 2. April 1952 stellten sich auf dem Flugplatz von Locarno in der Magadino-Ebene zwei Kraniche ein. Ich rollte mit dem Flugzeug in etwa 100 m Entfernung an ihnen vorbei, wovon sie jedoch kaum Notiz nahmen und weiter ihre Nahrung suchten. Trotz sehr regem Flugbetrieb, und obschon die startenden Flugzeuge nur etwa 30 m über die Köpfe der Vögel hinwegflogen, blieben sie den ganzen Tag auf dem Platze. Bis zum 5. April hielten sie sich stets auf dem Flugplatz oder in dessen unmittelbarer Umgebung auf. Am 6. April war nur noch einer da, der nun viel grössere Scheu zeigte. Am 7. April verschwand auch dieser; K. Frey, OB. 49 188. — Pian Magadino : Am 27. und 28. April 1956 1 K. zwischen Bolla rossa und Tessindelta. Am Abend des 28. April war der Vogel nicht mehr anwesend; RM.

Tüpfelsumpfralle, Porzana porzana. Am 6. Aug. 1952 eine T. im Tessindelta; E. und BCa.

Urhuhn, Tetrao urogallus. Dr. R. Schaller traf am 16. Sept. 1955 in der V. di Muggio, oberhalb Morbio, am Wege nach Sagno, eine Urhenne an.

Haselhuhn, Tetrastes bonasia. Am 15. Mai 1953 fanden Arbeiter in einer etwa 1 ha grossen, 40-jährigen Aufforstung unterhalb Nante bei Airolo auf ca. 1320 m ü.M. eine H.-Henne auf 7 Eiern. Das Nest war bergseits durch einen Asthaufen geschützt, obschon das Reisig das Nest nicht überragte. Die runde, 14 x 14 cm grosse Nestmulde war bloss in dürren Fichtennadeln angelegt und nicht ausgekleidet. Die Nadelanhäufung schien von den darüberliegenden Aesten zu stammen. Das Nest befand sich an einem mässig steilen Hang und etwa 50 m von der den Wald auf zwei Seiten umgebenden Heuwiese entfernt. Der Waldbestand wird zu drei Vierteln von Fichten mit wenig Tannen und Lärchen gebildet, welche auf die ganze Fläche verteilt von leicht vorwüchsigen Birken (ein Viertel) durchsetzt sind. Das Stangenholz war bisher dicht und nicht durchforstet, zudem lag seit dem schneereichen Winter 1950/51 viel Schneebruchholz wild durcheinander. Eine Wasserquelle findet sich erst beim etwa 100 m entfernten und zeitweilig besetzten Stall. Nach Angaben der Holzer wurde die Henne in der Nacht vom 20./21. Mai gemordet. Die Eier schickte ich am 21. Mai mittags nach Sempach, wo der Brutversuch leider ohne Erfolg blieb. Die brütende Henne strich jeweils erst ab, wenn man sich bis auf 1 m Distanz genähert hatte; A. Schwab, OB. 51 23.

Jagdhasen, Phasianus colchicus. Verzascadelta : 29. Juli 1955, 6 Fasanen, davon mindestens 5 beinahe erwachsene Junge, in einer Wiese; UC. — Am 29. und 30. April 1956 sowie am 5. Mai 1956 Rufe je eines Fasans in den Auengehölzen an der Verzascamündung und an der Bolla rossa; UC u. B.

Rephuhn, Perdix perdix. Maggiadelta : 12. Februar, 31. März und 14. Juni 1956, je 2 Ex. in der Gegend des Flugplatzes, am 31. März 1956 4 Individ. in einem Saatfeld; PT.

Wachtel, Coturnix coturnix. Eine am 27. Mai 1954 bei Como beringte W. wurde am 28. Aug. 1954 bei Cadenazzo, 40 km NNW aufgefunden; OB. 52 202. — Eine am 22. April 1952 bei Mirandola (Emilia, Ital.) beringte W. wurde am 16. Sept. 1952 bei Ligornetto, 210 km NW tot gefunden; OB. 50 204.

Steinhuhn, Alectoris graeca. Alpe « Sauru », 1200 m ü.M. (Mesolcina): Am 27. Mai 1954 ein St. einer Steinhalde zufliiegend; F. Hofer. — Am 2. Juni 1956 ca. 3 km vor der Lukmanier-Passhöhe 1 Paar St. unterhalb der Waldgrenze (Weideland mit Fichten durchsetzt, steiler Hang). Die Hühner entziehen sich hangaufwärts zwischen Bäumen und Gestein den Blicken der Beobachter; E. und BCa. — Am 29. Okt. 1956 ein Ex. bei ca. 900 m ü.M. unterhalb Mte. Croce auf einer Waldlichtung mit verlassenen Steinhütten aufgescheucht. Der Vogel fliegt mit einem kurzen, scharfen Doppelruf hangabwärts, um nach ca. 200 m abzuschwenken; BCa. — Am 30. Okt. 1956 an der Cima di Medeglia bei 1263 m ü.M. ein St. mit typischem Doppelruf abfliegend; BCa.

C. DIE VOGELFORMATION DES PHYTOSITONS

Arvenhäher, Nucifraga caryocatactes. Am 14. Okt. 1954 bei Motto Bartola (Südflanke des S. Gottardo) einige A. Zwei Ex. suchten in Wiesen Haselsträucher nach Nüssen ab; BBC. — Am 29. Okt. 1956 ein rufender A. an der Ostseite des Mte. Croce (Magadino), ca. 750 m ü.M.; BCa.

Eichelhäher, Garrulus glandarius. E. am 30. Dez. 1951 im Auenwald des Verzascadeltas, am folgenden Tag auf Monte Verità ob Losone; UC. — E. kreischt am 19. Juli 1955 in einer bewaldeten Schlucht bei Orselina (Locarno); UC. — Am 3. Mai 1956 ein E. im Mischwald der Talsohle unterhalb der Ortschaft Maggia kreischend; UC.

Pirol, Oriolus oriolus. Am 15. Mai 1953 im Golfareal bei Ascona 2 Ex.; E. und BCa. — Tessindelta : 6. Aug. 1953, 2 ♂♂, 1 ♀ im Auenwald (Pappelpflanzung); BBC. — Maggiadelta : 29. April 1956, 1 Ex.; PT. — Am 29. April 1956 ein ♂ niedrig in Laubgehölz (Grossgebüsch) am Tessindamm (Pian Magadino); UC u. B.

Erlenzeisig, Carduelis spinus. Am 30. Dez. 1951 mehrere E. auf Erlen im Verzascadelta, am nächsten Tage einige Ex. in einem Erlenbestand des Maggiadeltas bei Ascona; UC. — Ein von AW am 21. Okt. 1952 in Lugano beringtes ♀ wurde am 24. Okt. 1952 am Mte. Poncione (Varese), 20 km SSW erbeutet; OB. 50 180. — 13. März 1953, Maggiadelta bei Locarno, 3-4 Ex., ein ♂ singend; UC. — Maggiadelta-Ascona : 30. Sept. 1954, 1 E.; UC, HI. — Am 30. Okt. 1956 ein Flug von 7 E. an der Cima di Medeglia und eine Gesellschaft von 60 Ex. bei 560 m ü.M. am Mte. Ceneri. Am 28. Okt. 1956 im Pian Magadino auf der Höhe von Gudo ein Trupp von 24 E., am nächsten Tage ein Trupp von 6 Ex. im Kastanienwald oberhalb Magadino und 5 Individ. am Mte. Croce; BCa.

Distelzeisig, Carduelis carduelis. Am 2. April 1947 D. in Ambrì in Gebüsch am Dorfbach. Am 31. Dez. 1948 in Ambrì ca. 25 D. auf Obstbäumchen in kleinem Gemüsegarten (30-35 cm Neuschnee). Sie frequentieren dann Disteln und Kletten an einem mit Weiden bestandenen Graben. In ihrer Gesellschaft 3-4 Grünfinken. Am 29. Dez. 1948 2 ad. D. unterhalb Ronco/Bedretto. Am 16. Okt. 1951 ca. 1 Dutzend D. ob dem Nordufer des Lago Ritom Sämereien suchend; BBC. — Am 31. Dez. 1951 ein D. das ebene Feldgelände E Losone überfliegend; UC. — Am 10. März 1953 D. im Maggiadelta bei Locarno singend, am 12. März 1953 mehrere D. zwischen Solduno und Ponte Brolla. Am 28. Sept. 1954 verzehrt ein D. im Garten des Hotels Belvedere ob Locarno unreife Samen einer Cosmea-Art. Am 31. Juli 1955 singende D. in der Stadt Locarno; UC. — Am 29. Okt. 1956 5 D. am Mte. Ceneri; BCa.

Birkenzeisig, Carduelis flammea cabaret. Beleg (♂) vom 14. Juli 1902 aus dem Val d'Isonne in Coll. Mus. Zofingen. — Am 29. Okt. 1956

2 B. bei 1050 m ü.M. rufend am Grat zum Mte. Croce, am 30. Oktober d.J. zirka 20 Ex. an der Cima di Medeglia über Erlen-, Birken- und Haselstauden; BCa.

Gimpel, Pyrrhula pyrrhula. Am 31. Dez. 1951 ein Paar (♂, ♀) G. auf Monte Verità (Ascona), am 20. April 1952 G.-Rufe im Park des Hotels Belvedere (Locarno), ebenda am 30. April 1956 kleine Gimpel rufend und singend, desgl. am 5. Mai 1956 (Mte. Tamaro usw. schneebedeckt); UC. — Am 29. Okt. 1956 3 G. am Mte. Croce ob Magadino bei 1050 m ü.M., am folgenden Tag ein Trupp von 6 G. auf einer Birke unterhalb der Cima di Medeglia, 950 m ü.M.; BCa.

Fichtenkreuzschnabel, Loxia curvirostra. E. Moltoni erhielt unterm 30. Dez. 1929 von Dr. C. Censi (Lugano) die Mitteilung, dass derselbe Mitte August d.J. an den Abhängen des St. Gotthard bei 1500 m ü.M. viele F. beobachtet habe, solche auch anfangs September 1929 bei 1600 m ü.M. in der Leventina zahlreich feststellen konnte usw.; Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 69 176 (1930). — Am 29. Okt. 1956 ca. 15 F. bei 1050 m ü.M. am Grat zum Mte. Croce überhinfliegend und auf Föhren; BCa.

Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla. Am 30. Dez. 1951 ein G. mit Gesangsfragmenten im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Am 17. April 1955 fand AS im Auenwald des Maggiadeltas bei Ascona ein Nest des G. Dasselbe befand sich knapp 3 m hoch zwischen dem Stamm einer Weide und den darüber hinkletternden Efeuranken. Die Jungen waren bereits voll befiedert. Die Altvögel fütterten fleissig, und die dabei von den Jungen ausgestossenen Bettelrufe waren so laut, dass sie 80 m weit gut zu hören waren. Am 21. April war die Brut am Abend noch im Nest. Am frühen Morgen des 23. April aber fand AS das Nest leer, und die Altvögel warnten in der Umgebung. Die Jungen mussten also am 22. April ausgeflogen sein. Das Datum des Vollgeleges lässt sich auf den 15.-20. März zurückberechnen; OB. 52 99. — In Corti, Die Vögel des Kantons Tessin (1945), ist auf Tafel 2 das untere Bild irrtümlicherweise mit « Gartenbaumläufer » statt mit « Waldbaumläufer » bezeichnet. 30. Okt. 1956, 1 G. am Mte. Ceneri an Kastanienbaum rufend; BCa.

Kleiber, Sitta europaea. Am 31. Dez. 1951 auf Monte Verità ob Losone rufend; UC.

Blaumeise, Parus caeruleus. Am 10. und 11. März 1953 je eine B. in Altschilfkomples im Maggiadelta/Locarno; UC. — Maggiadelta : 2. Juni 1956, 2 Ex.; E. und BCa.

Haubenmeise, Parus cristatus. Pian Magadino : 28. September 1954 (schön, warm, windstill), 1 H. Am 30. Sept. 1954 in einem Pinetum im Maggiadelta-Ascona H., ein weiteres Individ. im Garten des Albergo Belvedere (Locarno) auf Araukarie, Fächerpalme, Rosenspalier und auf einem mit Moos bewachsenen Brunnen. Sodann am 1. Okt. 1954 eine H.

im Tessindelta; UC, HI. — Am 30. Juli 1955 H. in einem alten Fichtenbestand auf der Alpe Cardada ob Locarno bei zirka 1700 m ü.M. gürrend. *P. cristatus* ist hier vielleicht Brutvogel, was das \pm reguläre Auftreten der H. in den Gärten von Locarno einfach erklären würde; UC. — Am 29. Okt. 1956 zwei H. am Grat zum Mte. Croce ob Magadino in Fichten- und Kastanienbeständen rufend; BCa.

Nonnenmeise, Parus palustris. Am 31. Dez. 1951 mehrere N. im Laubwald auf Monte Verità (Ascona, Losone), am 12. März 1953 eine N. bei Avegno (Valle Maggia), am 3. Aug. 1955 N. bei Ponte Brolla, am 3. Mai 1956 ein Ex. im Mischwald (Talsohle) unterhalb der Ortschaft Maggia; UC.

Mönchsmeise, Parus atricapillus. Am 29. Okt. 1956 eine M. bei 1050 m ü.M. am Grat zum Mte. Croce ob Magadino auf einer Föhre rufend; BCa.

Schwanzmeise, Aegithalos caudatus. Am 3. Aug. 1953 im Garten des Hotels Belvedere 21 Ex. auf einer alten Robinie; UC. — Pian Magadino : 28. Okt. 1956, 30 Sch. am Tessindamm, am 30. Okt. 1956 20 Ex. am Mte. Ceneri und 10 Ex. bei ca. 1100 m ü.M. in kleinen Birkenbeständen am Osthang der Cima di Medeglia; BCa.

Beutelmeise, Remiz pendulinus. Neu für den Tessin. AS beobachtete am 16. April 1955 drei B. im Maggiadelta; OB. 52 100.

Wintergoldhähnchen, Regulus regulus. Am 20. und 21. April 1952 singt ein W. lebhaft in einer Parkanlage von Locarno. Am 30. Juli 1955 ein singendes W. bei zirka 1450 m ü. M. zwischen Locarno und Alpe Cardada; UC. — Am 29. Okt. 1956 6 W. oberhalb Magadino; BCa.

Seidenschwanz, Bombycilla garrulus. ♂ und ♀ von Montide (Malcantone) vom Dez. 1903 (Präp. A. Ghidini) in Coll. Mus. Zofingen.

Weidenlaubvogel, Phylloscopus collybita. Am 10. März 1953 singt je ein W. in den Saleggi des Maggiadeltas bei Locarno und im Verzascadelta, ebenso je 1 W. am 1. Okt. 1954 im Tessindelta und am 24. Juli 1955 bei Fusio; UC. — Am 28. Okt. 1956 ein W. an der Tessinmündung singend; BCa.

Waldlaubvogel, Phylloscopus sibilatrix. Der W. erschien in der dritten Aprilwoche 1951, die ersten Ex. am 13. April im Maggiadelta, am 14. d.M. hier mehrere; MS, OB. 49 94.

Berglaubvogel, Phylloscopus bonellii. Locarno : 21. April 1952, Gesang je eines B. in Park- und Gartenanlage mit Koniferen auf Monti della Trinità. Am 23. Juli 1955 ein B. im Laubwald bei Costa ob Intragna, ca. 750 m ü.M., zweimal fragmentarisch singend; UC.

Drosselrohrsänger, Acrocephalus arundinaceus. Am 20. April 1952 D. bereits in guter Anzahl in den Schilfwäldern an der Bolla rossa (Verzascadelta) singend; UC. — Am 22. und 29. Juli 1955 D. in Anzahl an der Bolla rossa (Pian Magadino), am 29. April 1956 2 singende Ex. im Pian Magadino, am 4. Mai 1956 4-5 singende D. an der Bolla rossa; UC. — Am 2. Juni 1956 2 Ex. im Maggiadelta; E. und BCa.

Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus. Am 4. Mai 1956 ein T. an der Bolla rossa (Pian Magadino); UC. — Maggiadelta : 2. Juni 1956, 2 T.; E. und BCa. — Maggiadelta bei Ascona : 21. Juli 1956, mehrere Ex., 1-2 T. auch singend; PT.

Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris. Am 2. Juni 1956 2 Ex. an der Tessinmündung singend; E. und BCa.

Schilfrohrsänger, Acrocephalus schoenobaenus. Tessindelta : 5. und 6. Aug. 1953, einige Sch. in Phragmitetum; BBC. — Am 3. und 4. Mai 1956 an der Bolla rossa (Pian Magadino) sehr viele Sch. (Zug-Schübe). Vereinzelt auch Gesang vernommen; RM, UC.

Seggenrohrsänger, Acrocephalus paludicola. Tessindelta : 17. Sept. 1956, 2 Ex.; PT, WF u. B.

Gartenspötter, Hippolais icterina. Maggiadelta : 13. Mai und 3. Juni 1956, je 1 Ex.; PT.

Orpheusspötter, Hippolais polyglotta. Schon V. v. Tschusi zu Schmidhoffen hielt das Vorkommen des O. im Tessin für nicht ausgeschlossen; Orn. Jahrb. 19 156 (1908). — Am 10. Juni 1954 stellten L. Hoffmann, H. E. Riggerbach u. B. an der Gandriastrasse zwischen Gandria und Castagnola mindestens 3 O. fest. Diese Vögel hielten sich in dichten Laubgebüsch an den steilen, trockenen Felswänden und Geröllhalden längs der Strasse auf und blieben zuweilen auch recht lange singend auf ziemlich exponierten Zweigen sitzen. E. Stresemann konnte am 26. Juni 1954 an der gleichen Stelle wiederum 2 ♂ ♂ wahrnehmen; OB. 52 13.

Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla. Am 31. Dez. 1951 mehrere M. bei sonnigem windstillen Wetter auf Monte Verità (Ascona); UC. -- Maggiadelta : 2. Juni 1956, 2 Ex. singend; E. und BCa. — Siehe auch MS, OB. 50 3-9 (1953) und OB. 50 211.

Dorngrasmücke, Sylvia communis. Maggiadelta : 2. Juni 1956, 1 D. singend; E. und B. Carrara.

Zaungrasmücke, Sylvia curruca. Verzascadelta : 16. April 1951; MS, OB. 49 94. — Ambri : 4. Okt. 1953, 2 Z.; UC.

Bartgrasmücke, Sylvia cantillans. Neu für den Tessin. Am 9. und 10. April 1956 beobachteten AS u. B. im lockeren Buschstreifen des linken Maggia-Ufers in der Nähe des Hofes Saleggi (Ascona) während längerer Zeit eine B. (♂). Den ganzen Nachmittag des 9. April und am folgenden Vormittag war der Vogel stets in den Gebüsch des Maggiadammes oder knapp abseits, auf einer Fläche von etwa einer halben Hektare, anzutreffen. Er hielt sich fast ausschliesslich in der oberen Zweigregion auf, wobei blühende Weidensträucher bevorzugt wurden, in welchen er zwischen und an den Kätzchen Nahrung suchte. Selten einmal flog die Grasmücke kurz in die Luft, um ein fliegendes Insekt zu erhaschen. Ein Ruf wurde nicht vernommen; OB. 53 93.

Grossbuntspecht, Dendrocopos major. Im Dezember 1953 erhielt die « Pro Avifauna » aus der Valle di Blenio ein G.-♀, das zur Form D. major alpestris Reichenb. gehört. Gewicht : 88 g, Schnabel 25, Flügel 140, Schwanz 104 mm; A. Witzig, Il nostro Paese 5 433 (1955).

Mittlbuntspecht, Dendrocopos medius. ♀ vom 19. Aug. 1900 aus Stabio in Coll. Mus. Zofingen.

Schwarzspecht, Dryocopus martius. Am 8. Dez. 1956 wurde ein 280 gr schweres ♀ im Val Bedretto gegen den Passo Naret hin erlegt; AW.

D. DIE VOGELFORMATION DES AEROSITONS

Grauschnäpper, Muscicapa striata. Am 2. Okt. 1951 noch 2 G. im Maggiadelta bei Ascona, Insekten jagend; UC, HI, FS. — Am 1. Aug. 1955 (regnerisch) in Locarno 1 G. auf Edelkastanie, am 30. April 1956 G. im Maggiadelta-Ascona und im Pian Magadino, Höhe Gudo; UC. — Am 9. Juni 1956 ein G.-Nest mit 5 Eiern im Maggiadelta, ca. 55 cm über dem Boden auf einer Astkreuzung eines Brombeerstrauches, am Rande des Uferwaldes (3 Eier : 20 x 14 mm, eines 19,5 x 13,7 mm, eines 20,5 x 14,5 mm); PT. — Maggiadelta : 21. Sept. 1956, 1 G.; PT, WF u. B.

Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca. 1951 die ersten T. bei Ascona am 14. April; MS, OB. 49 93. — Maggiadelta : 15. April 1956, 1 ♂; PT. — 30. April 1956, je ein schwarz-weisses ♂ im Maggiadelta bei Ascona und im Pian Magadino; UC.

Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis. Am 1. Mai 1954 je ein ♂ und ♀ des H. am Philosophenweg (Alpe Agra bassa) zwischen Arosio und Cademario; AW. — Am 3. Mai 1956 ein ♂ im Gezweige einer alten Weide an der Bolla rossa (Pian Magadino); UC, RM. — Siehe auch G. Pochelon, NO. 21 284 ff.

Rauchschwalbe, Hirundo rustica. Zwischen Biasca und Acquarossa fand am 4. Sept. 1953 um 14.30 Uhr bei schönem Wetter und talaufwärts streichendem Wind schwacher Zug von Rn. talabwärts statt. Es folgten sich bis zirka 50 m über dem Boden abwechslungsweise bald 1-2 oder 3-4 Ex. (Gegenwindzug); UC. — Locarno : 20. Juli 1955. Nest der R. auf einer Mauerleiste unter dem Vordach der Confiserie Künzi; 3 bald flügge Junge werden von den Eltern gefüttert. Eine zugetragene Libelle entwischt kurz vor der Verfütterung und wird dann vom Altvogel mühsam wieder eingefangen. Am 30. Juli 1955 (sehr schön) viele Rn. bei zirka 1700 m ü. M. über der Alpe Cardada ob Locarno jagend; UC. — Am 28. Okt. 1956 fielen bei Magadino 4 R. bei bereits starker Dämmerung in einen Schilfsaum zur Nächtigung ein; BCa. — Siehe auch : A. von Vietinghoff-Riesch, Verbreitung und Zug der Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*); Bonner Zool. Beitr., Sonderband 1955. (Der Verf. behält sich eine kritische Stellungnahme zum Abschnitt « Schweiz » dieser Publikation vor).

Mehlschwalbe, Delichon urbica. Am 29. Sept. 1950 zieht ein Verband von ca. 50 M. bei etwa 2000 m ü.M. Richtung N-S das Val Lavizzara hinab; GR, NO. 21 46. — Riveo (Valle Maggia): 24. Juli 1955, 3 besetzte M.-Nester in den grossen Steinbrüchen an der Hauptstrasse; UC.

Uferschwalbe, Riparia riparia. Tessindelta : 6. Aug. 1953, 2-3 U. über dem Ticino bei der Quartino-Brücke; BBC. — Am 19. Juli 1955 einige U. an der Maggia bei Locarno; UC.

Felsenschwalbe, Ptyonoprogne rupestris. Am 25. April 1951 2 F. bei Cavallino. Eine Kolonie von 30-40 Indiv. am 27. April 1951 am S. Salvatore, 2 Ex. am folgenden Tag bei Bissone, wo sie über den Gärten der Ortschaft jagten; GR, NO. 21 171. — Am 8. Dez. 1951 (schöner, warmer Tag) um etwa 10.30 Uhr eine F. vor einer Felswand oberhalb der Gandriastrasse (Lugano) hin- und herfliegend; AW. — Am 31. Dez. 1951, zirka 15.00 Uhr, zuerst 2 und etwa 5 Minuten später 3 F. 15-20 m hoch über der Maggia zwischen Ponte Brolla und Solduno flussabwärts fliegend; UC. — Am 11. März 1953 vier F. zwischen Ponte Brolla und Avegno; UC. — Maggiadelta : Vom 6.-15. Jan. 1956 wiederholt 35-40 Ex. über der Maggia fliegend, am 29. Januar d.J. zirka 25 Indiv., am 3. Februar 13. F., dann wenige, am 26. Februar wieder 16-18 Ex., am 11. März 35-40 über den Wiesen in der Gegend des Testagutes usw.; PT.

Alpensegler, Apus melba. Ueber eine Brutkolonie des A. im Val Pontirone, einem Seitental des Val Blenio, 1380 m ü.M., berichtet H. Kunz, OB. 53 45.

Mauersegler, Apus apus. Am 20. und 21. April 1952 je 1 M. über Locarno; UC. (AW hat bis und mit 19. April 1952 in Lugano noch keine M. beobachten können). — Am 31. Juli 1955 (regnerisch, gewit-

terig) um 19.00 Uhr sehr viele M. über der Stadt Locarno, am 3. Aug. 1955 noch 4 M. über der Stadt; UC. — Am 1. und 8. April 1956 je ein M. über dem Maggiadelta; PT. — Pian Magadino : 19. April 1956, einige M. mit tausenden von Rauch-, einzelnen Mehl- und 2-3 Uferschwalben; BBC. — Maggiadelta : 18. Sept. 1956, 2 M., am folgenden Tag ebenda 1 M.; PT, WF u. B.

Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus. Juv. ♂ vom 23. Sept. 1902 vom Mte. S. Salvatore in Coll. Mus. Zofingen.

Wanderfalke, Falco peregrinus. Am 27. April 1951 ein Ex. am Mte. S. Salvatore, wo der Vogel vielleicht zur Fortpflanzung schreitet, am 25. April 1951 ein W. oberhalb Cavallino, ein Ex. am 1. Mai 1951 am Mte. Brè (Lugano); GR, NO. 21 170. — Maggiadelta : 20. Sept. 1956, 1 W. mit geschlagener Haustaube; PT, WF.

Baumfalke, Falco subbuteo. Maggiadelta : 16. April und 27. Mai 1956, je 1 B., am 1. Mai d.J. an der unteren Bolla rossa; PT. — Pian Magadino : Am 23. April 1956 ein B.; RM.

Habicht, Accipiter gentilis. Maggiadelta : 3. und 5. Februar, 19. und 25. März 1956, je 1 H.; PT.

Sperber, Accipiter nisus. 10. März 1953, ein von Nebelkrähen verfolgter Sp. im Maggiadelta bei Locarno; UC. — Am 29. Okt. 1956 ein Ex. am Mte. Croce ob Magadino; BCa. — Im Dezember 1956 wurde ein Sp. in Crana (Val Onsernone) erlegt; AW.

Literatur · Nachträge

- Anonymus* : Grosse Meisenflüge im Tessin; VdH 22 64 (1951).
Baur - Celio, B. : Raubseeschwalben am Verbano (Tessin); OB. 50 148 (1953).
Bianconi, L. : La pavoncella; Il nostro Paese 6 542-544 (1956).
Burckhardt, D. : Bericht über die Wasservogelzählung im Winter 1951/52; OB. 4 137-170 (1952).
 — : Bericht über die Wasservogelzählung im Winter 1952/53 und 1953-54; OB. 51 205-220 (1954).
Calloni, S. : Fauna nivale Lepontica; Verh. SNG (Lugano) 1889 (1890), p. 64-67, C.-R. 1889, p. 71 f.
 — : Espèces nouvelles pour le Tessin et Corégones du Lac Majeur; Vernh. SNG (Locarno) 1903 (1904), C.-R. 1903, p. 54.
Corti, U. A. : Grundzüge der insubrischen Vogelwelt; Boll. Soc. Ticin. Sci. Nat. 49 77-81 (1954).
Epprecht, W. : Herbstbeobachtungen im Gotthardgebiet 1954; OB. 52 110-118 (1955).
Gattiker, E. : Grünfüßiges Teichhuhn Gallinula ch. chloropus (L.); VdH 19 193 (1949).

- Géroudet, P.* : La distribution du Bruant ortolan en Suisse; NO. 22 217-225 (1954).
- : Le Pipit farlouse nicheur en Suisse; NO. 23 225-233 (1956).
- Ghidini, A.* : « *Emberiza rustica* » Pall. a Lugano; Riv. Ital. Orn. 2 36 (1912).
- Hauri, R.* : Beobachtung von Silbermöwen am Luganersee; OB. 51 28 (1954).
- Hess, A.* : Ornithologisches vom Tessin; Schweiz. Bl. f. Orn. 38 78 f., 94 f. (1914).
- Hofer, F.* : Vogelbeobachtungen im Tessin (Misox); Tierwelt 64 629 f. (1954), 65 591 (1955).
- Hoffmann, L.* : Beiträge zur Kenntnis der Tessiner Vogelwelt; OB. 52 11-15 (1955).
- Kunz, H.* : Eine Alpenseglerkolonie im Tessin; OB. 53 45 (1956).
- : siehe auch Suter, H.
- Mariani, G.* : Die Schwäne in der Locarneser Bucht; Schweiz. Bl. Naturschutz 3 8f. (1928).
- Moltoni, E.* : L'invazione del Crociere in Italia nel 1929-30; Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 69 174-192 (1930).
- Mühlemann, H.* : Rotrückengewürger, *Lanius c. collurio* L.; VdH 20 115 (1950).
- Pioda, A.* : Naturalisti ticinesi scomparsi; Verh. SNG (Locarno), 1903 (1904), p. 3-21.
- Pochelon, G.* : Un nid de Pouillot siffleur parasité par le Coucou; NO. 21 254 (1952).
- : A propos du Gobemouche à collier au Tessin; NO. 21 284-286 (1952).
- Portmann, A., E. Sutter* : Acta XI Congressus Internationalis Ornithologici. Basel, 1954 (1955).
- Püntener, J.* : Beobachtungen im oberen Tessin; VdH 22 225 (1952).
- Riva, A.* : [Briefliche Notiz betr. *Circaëtus gallicus*]; La Libertà (Foglio popolare ticinese, Lugano) 7 527 (1872), No. 132 vom 2. Sept. 1872.
- Roux, G.* : Quelques observations au Tessin en 1951; NO. 21 170 f. (1952).
- : Quelques observations du Tessin et des Grisons (1955); NO. 23 292f. (1956).
- Sartori, R.* : La scomparsa del Codirossone (*Monticola saxatilis* Linn.); Il nostro Paese 4 281 (1952).
- : Il Gracchio Pyrrhocorax graculus (Linn.); Il nostro Paese 5 302f. (1953).
- : L'avesla minore nel 1952; Il nostro Paese 5 303 (1953).
- : Osservazioni sul cuculo nel 1952; Il nostro Paese 5 304 (1953).
- : Osservazioni sul merlo; Il nostro Paese 5 304 (1953).
- : Varie 1952; Il nostro Paese 5 326 (1953).
- : Il picchio muraiolo (*Tichodroma muraria* Linn.); Il nostro Paese 5 410-412 (1954).
- Schifferli, A.* : 54. Schweizerische Ringfundmeldung; OB. 48 189-208 (1951).

- Schifferli, A.* : Der Bergfinken-Masseneinfall (*Fringilla montifringilla*) 1950/51 in der Schweiz; OB. 50 65-89 (1953).
- : 55. Schweizerische Ringfundmeldung; OB. 50 177-206 (1953).
- : Frühe Brut des Hausbaumläufers im Maggia-Delta; OB. 52 99 (1955).
- : Beutelmeisen im Maggia-Delta; OB. 52 100 (1955).
- : 56. Schweizerische Ringfundmeldung; OB. 52 184-202 (1955).
- : Bartgrasmücke im Tessin; OB. 53 93 (1956).
- Schmidt, G.A.J., E. Sutter:* Zum Leiern der Mönchsgrasmücke; OB. 50 211 (1953).
- Schwab, A.* : Nestfunde des Haselhuhns am Rigi und bei Airolo; OB. 51 22f. (1954).
- Scopoli, I. A.* : *Deliciae Florae et Faunae Insubricae seu novae et minus cognitae species plantarum et animalium, quasi in Insubria Austriaca tam spontaneas quam exoticas vidit, descripsit et aeri indici curavit. Pars I-III. Ticini 1786-1788, fol. maj., c. 75 tab.*
- Soffel, E.* : Ornithologisches aus der Südschweiz; Gefied. Welt 43 258-260 (1914).
- Stresemann, E.* : Vogelkundliche Streifzüge im Süd-Tessin, Juni 1954; OB. 52 5-11 (1955).
- Suter, H., H. Kunz* : Mehlschwalbenkolonie an Felsen; OB. 53 44f. (1956).
- Sutter, E.* : Sammelbericht über die Monate März bis August 1951. II. Teil: Singvögel; OB. 49 88-97 (1952).
- : Weitere Beobachtungen von Purpurreihern; OB. 53 21f. (1956).
- : siehe auch Porftmann, A. und Schmidt, G.A.J.
- Thalman, E.* : Aus dem Tessin; VdH 26 240-242 (1956).
- Walther, E.* : Die Vogelwelt in Ronco-Altanca; Tierwelt 63 570 (1953).
- Witzig, A.* : Die festen Vogelfanganlagen (Roccoli) im Tessin vor 1875; OB. 49 84-88 (1952).
- : Winterbeobachtung der Blaumerle an der Gandriastrasse; OB. 49. 97f. (1952).
- : Specie ibernanti; Il nostro Paese 4 280f. (1952).
- : Herbstnotizen aus dem Tessin; OB. 50 30f. (1953).
- : Non albatros ma gabbiano reale; Il nostro Paese 5 297-300 (1953).
- : Non fringuello ma zigolo muciatto; Il nostro Paese 5 302 (1953).
- : Il mignattino (*Chlidonias nigra nigra* [L.]); Il nostro Paese 4 401f. (1954).
- : Picchio rosso maggiore alpestre nell'alta Valle di Blenio; Il nostro Paese No. 21, p. 433-435 (1955).
- : Erlegung einer weitem Spornammer bei Stabio; OB. 52 45 (1955).
- : Mornellregenpfeifer im Tessin; OB. 52 162 (1955).
- : La passera (o passera italiana). La passera oltremontana; Il nostro Paese No. 21, p. 436f. (1955).

- : Verhalten von Rauchschwalben bei Kälte; OB. 53 204 (1956).
- : Lo svasso maggiore (*Podiceps cristatus cristatus* [L.]); Il nostro Paese 6 521f. (1956).
- : Gufo di palude nel Ticino; Il nostro Paese 6 522f. (1956).
- : Picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*); Il nostro Paese 6 523f. (1956).
- : Tre uccelli nel Ticino; Il nostro Paese 6 535-538 (1956).
- : Ospiti invernali del Ceresio; Il nostro Paese 6 547-549 (1956).