

Ritrovamento di topolino delle risaie (*micromys minutus*) e di toporagno pigmeo (*sorex minutus*) nel Ticino meridionale

Autor(en): **Lardelli, Roberto**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **69 (1981)**

PDF erstellt am: **16.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1003458>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ROBERTO LARDELLI

RITROVAMENTO DI TOPOLINO DELLE RISAIE (*MICROMYS MINUTUS*) E DI
 TOPORAGNO PIGMEO (*SOREX MINUTUS*) NEL TICINO MERIDIONALE

Abstract: *In the Southern Ticino they signalize the discovery of Micromys minutus and Sorex minutus.*

L'analisi del contenuto dei boli di rigurgito permette di determinare con precisione le necessità e le preferenze alimentari, nonché di identificare la microfauna nei territori dei rapaci notturni.

Dal 1980 sto compiendo una ricerca sulla distribuzione e sulla alimentazione degli strigiformi nel Mendrisiotto.

Ho raccolto ed esaminato fino ad oggi circa trecento borre di civetta ed allocco, trovate in località fisse della regione, punti di rifugio diurno.

L'identificazione dei micromammiferi è stata effettuata in base all'esame dei crani, delle dentature e delle ossa lunghe.

Sono state rinvenute dodici specie, tra le quali:

- *Sorex minutus* LINNAEUS, 1766 : (12.IX.1980, Stabio- Punto Franco) civetta - territorio compreso fra la strada cantonale e il fiume Laveggio;
- *Micromys minutus* PALLAS, 1771 : (IX.1981, Stabio-S.ta Margherita) civetta - regione pianeggiante alle sorgenti del Laveggio.


Il 12.IX.1980 veniva inoltre rinvenuto da C.Solari nei dintorni di Sobrio un esemplare morto di *Sorex minutus* (Zbinden N., com. pers.).

La presenza della specie era prevista nei precedenti elenchi dei mammiferi ticinesi, pur senza ritrovamenti certi. (v.Lehmann 1979)


Il *Micromys minutus*, la cui presenza è avvalorata dal ritrovamento di un nido il 7.IX.1981 nei dintorni di Sorencino-Rivera (v.Lehmann, com.pers.), è specie nuova per il Canton Ticino.

Bibliografia


- E.V. LEHMANN : *Elenco dei mammiferi (Mammalia) nel Ticino. Boll.soc.tic.sc.nat. LXVII - 1979*
- R. MAERZ : *Gewöll- und Rupfungskunde. Akademie-Verlag Berlin 1972*
- TOSCHI & LANZA : *Fauna d'Italia-Mammalia. Calderini Bologna 1959.*



mandibole e parti del cranio di *Sorex minutus*



mandibole e parti del cranio di *Micromys minutus*



nido di *Micromys minutus*