

Publicazione del manoscritto inedito "Prima nota di funghi che crescono nel cantone Ticino". Parte II

Autor(en): **Riva, Alfredo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società ticinese di scienze naturali**

Band (Jahr): **93 (2005)**

PDF erstellt am: **09.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1003181>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Publicazione del manoscritto inedito

«Prima nota di funghi che crescono nel Cantone Ticino».

Parte II

Nota redatta nel 1859 da Alberto Franzoni (1816-1886) e da Agostino Daldini (1817-1895)

Alfredo Riva

Società micologica Carlo Benzoni di Chiasso, Via Pusterla 12, 6828 Balerna

Nel Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali volume 92 (1-2) 2004, l'Autore ha pubblicato l'elenco dei generi riportati nel manoscritto di A. Franzoni e A. Daldini, manoscritto che risale al 1859, il più antico documento riguardante lo studio della micologia ticinese sino a oggi noto.

Qui di seguito è riprodotta una prima parte dell'elenco delle specie. Si ricorda che il testo è stato riportato come nell'originale, tralasciando unicamente le referenze bibliografiche. È stato aggiunto talvolta il nome d'Autore specie tra [] quando ciò era possibile e inserito degli interrogativi (?) là dove esistevano incertezze. Gli spazi con «...» sono esistenti anche nel manoscritto.

I reperti elencati in questo catalogo sono depositati al Museo cantonale di storia naturale di Lugano.

I HYMENOMYCETES

1 AGARICUS

<i>Amanita</i>	<i>Agaricus caesareus</i> Scop. Locarno a S. Biagio, Orselina; Agos.-Sett. <i>Agaricus phalloides</i> Fr. Orselina nei boschi. <i>Agaricus muscarius</i> L. Locarno nei prati, campi. Orselina nei boschi. Bignasco nei boschi. Bellinzona. Boschi sopra Arcegno. 1 ott. 1861. <i>Agaricus vaginatus</i> Bull. Locarno nei campi concimati qua e là. A Vogorno nelle selve castanili (Sett. 28).
<i>Lepiota</i>	<i>Agaricus procerus</i> Scop. Locarno nelle selve. Tenero ivi. Monti di Losone al Corti... Ott. 1861. Oss.: lamelle del fungo sviluppato eroso-dentate, odore particolare erba ma tiglioso (?). <i>Agaricus clypeolaris</i> Bull. Locarno nei campi al Sasso. Ott. <i>Agaricus cepaestipes</i> [Fr.] Locarno alla Fregiera, nei muschi sotto ai castagni. <i>Agaricus granatulus</i> [Schaeff.] Locarno nelle località cane al no. 7.
<i>Tricholama</i>	<i>Agaricus velutipes</i> Curt. Locarno ai ceppi delli noci. 1958. Ott.-Nov.
<i>Clytocybe</i>	<i>Agaricus laccatus</i> Scop. e var. <i>violaceus</i> . Locarno nelle selve di S. Biagio, al Sasso.
<i>Collybia</i>	<i>Agaricus fusipes</i> Bull. Locarno a S. Biagio, selve castanili. <i>Agaricus longipes</i> [Bull.] Locarno al Sasso, raro.
<i>Hebeloma</i>	<i>Agaricus rimosus</i> Bull. Locarno nei prati. <i>Agaricus oreades</i> [Fr.]. Locarno ai ceppi dei castagni e dei gelsi.
<i>Psathyrella</i>	<i>Agaricus disseminatus</i> Pers. Locarno.
<i>Dermocybe</i>	<i>Agaricus cinnamomeus</i> [Fr.]. Locarno
<i>Armillaria</i>	<i>Agaricus melleus</i> Pers. Locarno al piede dei frassini, noci, meli, peri, a Tenero, Bellinzona, gregario.
<i>Hyporrhodinus</i>	<i>Agaricus speciosus</i> [Fr.]. Locarno nei prati pingui.
<i>Lactarius</i>	<i>Agaricus camphoratus</i> [Bull.]. Locarno nei boschi. var. <i>subdulcis</i> Bull. Locarno nei boschi. <i>Agaricus pyrogalus</i> [Bull.]. Locarno nei boschi. <i>Agaricus vellereus</i> [Fr.]. Selva faginea verso il M.te di Surio [?] fini Intragna. Ott. 1861. Oss.: ha la forma infundibuliforme col margine arrotolato e il cappello tomentoso flocculoso e il piede corto grosso-tomentoso obconico. [piccolo schizzo]
<i>Dermisus</i>	<i>Agaricus crustuliniformis</i> Bull. [Hebeloma] Locarno ?
<i>Coprinarius</i> [?]	<i>Agaricus umbellatus</i> Locarno

- 2 RUSSULA
Agaricus umbelliferus [Fr.]. Locarno nei prati.
Agaricus dryophylus [Bull.] [Collybia]. Locarno nei prati.
Agaricus melinoides [Schum.] [Entoloma]. Locarno nei campi concimati.
Russula virescens Pers. Locarno alla Fregiera.
Russula foetens Pers. Locarno nei prati al disopra del Sasso. Brione Valletta, tra Orselina e Brione.
Russula rubra Fr. Locarno.
Russula ochroleuca Fr. Locarno alla Fregiera.
Russula emetica Pers. Locarno alla Fregiera e nei boschi.
Russula adusta Pers. Locarno alla Fregiera e nei boschi.
- 3 COPRINUS
Coprinus lagopus [Fr.]. Locarno al Sasso, frutti maturi fermentati.
- 4 HYGROPHORUS *Camarophyllus*
Hygrophorus virgineus [Fr.]. Locarno al Sasso, nei prati.
Hygrophorus coccineus [Fr.]. Locarno al Sasso, nei prati.
Hygrocybe
Hygrophorus coccineus var. nigrescens. Locarno al Sasso.
Hygrophorus conicus [Scop.]. Locarno.
- 5 CANTHARELLUS
Cantharellus tubaeformis Fr. Nelle selve castanili, Bellinzona, raro.
Cantharellus cibarius [Fr.]. Locarno, negli scoperti e nei prati.
Cantharellus muscigenus Fr. Locarno, luoghi muscosi, sulle rupi.
Cantharellus cinereus [Mer.] Pers. Locarno nella selva.
Cantharellus lutescens [Mer.] Pers. Locarno nei prati sopra il Sasso; raro.
Cantharellus umbonatus [Pers.] Nelle piazze di carbonaia, nei monti di Losone; 1861 ott.
Cantharellus aurantiacus [Wulf.]. Locarno selve, sett.-ott.
Cantharellus crispus Fr. Bignasco ai tronchi essiccati della Betulla, marzo 1858.
- 6 MARASMIUS
Marasmius peronatus Bolt. Selva, tra la foglia decidua e fra muschi. Locarno, Camorino d'autunno.
Marasmius oreades Bolt. Nei campi e prati, tutto l'anno, Locarno a San Biagio e verso Orselina.
Marasmius planicus Scop. Nelle selve tra i muschi e la foglia caduta Camorino, sett.-ott.
Marasmius ramealis Bull. Ai rami di nocciuoli, Valletta di S.Biagio sopra Locarno.
Marasmius androsaceus Linn. Sulla foglia degli abeti nei boschi Campo di Valle Maggia, fragile, lugl.-ott.
Marasmius Hudsoni Pers. Orselina, valletta da ... alla foglia sternale dello *Ilex aquifolium*. Sett. 1862 P.A. (Daldini).
- 7 ASTEROPHORA
Asterophora lycoperdoides Dittm. sin. *Nyctalis parasitica*. Brione sulla *Russula foetens*. P.A. 1862 agos.-sett. Nella valletta del Rebisale tra Brione e Orselina sulla *Russula foetens!* Ott. 1863 A. Fr.
- 8 LENTINUS
Lentinus cochleatus Pers. Locarno nei campi, gregario.
Lentinus dryadeus. Locarno alla legna quercina (ligno).
- 9 PANUS
Panus stipticus Bull. Locarno, Bignasco, ai tronchi in putrefazione degli alni, dei nocciuoli, frequentissimo.
- 10 SCHYZOPHYLLUM
Schyzophyllum comune Fr. Comunissimo al tronco disseccato di noci, delle betulle a Locarno, Bellinzona, Bignasco.
- 11 LENZITES
Lenzites betulina Linn. Locarno, Bignasco, Bellinzona, ai ceppi delle betulle, frequente.
Lenzites tricolor Fr. Orselina, alla legna dei peschi.
Lenzites trabea Pers. Locarno, Tenero, alla legna di abete.
Lenzites sepiaria Fr. Locarno alla legna di larice.
- 12 DEDALEA
Dedalea quercina. Locarno, Caverigno, Bignasco, alla legna e ceppi delle roveri.
- 13 BOLETUS
Boletus aureus. Locarno al Sasso nei prati e boschi. P. Agostino (manca all'erbario).
Boletus castaneus. Locarno al Sasso, Contra. (manca all'erbario).
Boletus piperatus Bull. Bellinzona, selve.
Boletus subtanentousus Linn. Locarno, al Sasso.
Boletus luridus Schaeff. Locarno al Sasso, Bellinzona nelle selve. (Manca nell'erbario)
Boletus edulis Bull. Locarno, Tenero, Losone, Bellinzona, frequentissimo nelle selve. Fung farré (Fung legorat). Giugno poi da lugl. a ott.
Boletus porphyrosporus Fr. Locarno selva d'Orselina, abeti.
Boletus scaber Fr. Selva, Bellinzona.
Boletus brachisporus Pers. Bellinzona, selva, sett.
Boletus granulatus Linn. Bellinzona selva.
Boletus luteus Linn. Locarno, selva, Valle Rovana, d'autunno.

14 POLYPORUS

- Polyporus frondosus* [Schr.]. Locarno e Vezia, Bignasco, Bellinzona, ai tronchi dei castagni, betulle, querce.
- Polyporus varius* [Fr.] Quartino.
- Polyporus fumosus* Fr. Orselina, ai ceppi di noci a Ronco.
- Polyporus fulvus* Fr. Locarno ai ceppi dell'*Evonymus* e del *Rhamnus frangula*.
- Polyporus cinnabarinus* Jacq. Locarno.
- Polyporus picipes* Fr. Locarno alla legna di tiglio.
- Polyporus hispidus* [Bull.]. Locarno ai gelsi.
- Polyporus hirsutus* [Wulf.]. Locarno ai rami tutti disseccati.
- Polyporus applanatus* Pers. Locarno ai tronchi delle noci.
- Polyporus obliquus* [Pers.]. Locarno al tronco dei salici e dei gelsi, al Sasso, Orselina.
- Polyporus versicolor* [L.]. Ai ceppi delle betulle, alla legna disseccata, frequente a Locarno, Valle Maggia e Bellinzona.
- Polyporus adustus* Wind. Locarno ai tronchi di noci e di tiglio, al Sasso
- Polyporus abietinus* [Pers.]. Ai tronchi putrescenti dell'*Abies*, presente all'Alpe di Cardada (1670 m), 29 lugl. 1863.
- Polyporus imbricatus* [Bull.]. Locarno ai tronchi degli alberi (autunno).
- Polyporus arcularius* Fr. Trovato da Cesati ai tronchi della Robinia pseudoacacia verso Quartino e Sonvico.
- Polyporus radula* Fr. Bellinzona, selva di Vigana, ai rami in putrefazione (sett. ott.).
- Polyporus alveolarius* Fr. Locarno, tronco degli alberi (fu determinato da Trog per *P. brumalis* ma certo non lo è).
- Polyporus betulinus* [Bull.]. Monti di Caramponasio in Val Caveragno al tronco del *Sorbus aucuparia*. 1856 ott. (margini tondeggianti involuti).
- Polyporus lacteus* Fr. Locarno, ai tronchi delle betulle al piano d'Albigo lugl. ed agos.
- Polyporus populinus* Fr. Locarno ai pioppi. (esisteva nell'erbario fu rovinato dalle tignole).
- Polyporus velutinus* Fr. Locarno ai rami secchi delle noci. Genn.
- Polyporus ignarius* Fr. Locarno ai tronchi dei ciliegi, Bellinzona a quello dei meli.
- Polyporus abietinus* Fr. [già al no. 13]. Campo, tronchi dell'*Abies*, Larix.
- Polyporus zonatus* Fr. Ai ceppi di castagni in decomposizione, Locarno valletta di S. Biagio.
- Polyporus ignarius* Fr. *B. pomaceus*, ai tronchi di meli, Bellinzona, zona Vigana di S. Antonino.
- Polyporus capearius* Fr. Ai tronchi degli abeti, Valle Calanca bosco della Motta [o Mutta?] Cimalmotto.
- Polyporus tamariensis*, nostri -Pileo carnosus und [?] tenui acuto reflexo, nigrescente lucido, subiumbonato, pori minutis pentagonis ? fusco ferruginei acuti. Monte Tamaro - Alpe di Cortenovo al tronco dei faggi vetusti, 1845 Aug. Set.
- Favolus europaeus* [Fr.]. Locarno al tronco di gelsi, al Sasso, Orselina.
- Trametes cinnabarinus* (manca negli erbari). Al tronco del ciliegio, al Sasso, sopra Locarno.
- Trametes suaveolens* (manca nell'erbario). Locarno al tronco di salici vecchi.
- Fistulina hepatica* [Bull.]. Locarno, Bignasco, Bellinzona ai piedi dei tronchi de castagni e talvolta delle roveri. Di agosto - ottobre.
- Hexagona Mori*. Ai tronchi vecchi delle siepi di robinia tra Luvino Germignaga. (1860 ott. 30).
- Hydnum ferrugineum* Fr. (manca nell'erbario). Vezia.
- Hydnum graveolens* Pers. Locarno al Sasso, nei boschi. Bellinzona falde di Vigana. Bignasco selva. Sett. - ott.
- Hydnum pudorinum* Fr., *H. dichroun* Pers. Orselina al tronco delle noci.
- Hydnum cinereum* Bull. Locarno al Sasso nelle selve. Bellinzona selva di Vigana, sett. - ott.
- Hydnum argutum* [Fr.]. Locarno.
- Hydnum repandum* [L.] vulgo persighin. Locarno nei boschi al Sasso. Bellinzona nelle selve castanili presso Pianezzo. Edule. Sett. - ott.
- Hydnum niveum* [Pers.]. Ai pali e tronchi d'alberi disseccati; nella fessura della corteccia di castagni. Bellinzona e Ravecchia.
- Hydnum tanetosum* [L.]. Locarno, valletta di Fregiera o del Sasso. Selve castanili. Sett.
- Hydnum Erinaceus* Bull. Cevio, Vogorno, ai tronchi di castagni nella selva. Lugl. - sett.

15 FAVOLUS

16 TRAMETES

17 FISTULINA

18 HEXAGONA

19 HYDNUM

- Hydnum coralloides* Scop. Locarno, Leventina, ai tronchi di faggi, sugli abeti rasi e scortecciati.
- Hydnum cyatiforme* Bull. Bellinzona, nella selva castanile sotto la roccia di Unterwalden. Sett.
- Hydnum farreum* Pers. Ai ceppi di castagni nei luoghi soffocati. A San Antonio di Valle Morobbia. Sett.
- Hydnum laevigatum* Swartz. Locarno selva castanile sopra S. Biagio. A Campo di Valle Maggia.
- Hydnum compactum* Pers. Bellinzona, selve castanili sopra la rocca di Unterwalden. Sett.
- Hydnum ochraceum* Pers. Locarno valletta di S. Biagio ai tronchi degli alberi.
- Hydnum velutinum* Fr. Locarno valletta di Fregiera, selva castanile, fra muschi. Sett.
- Hydnum adustum* (non Fries). Locarno alla corteccia di castagni e salici.
(Padre Agostino mandato sotto questo nome probabilmente determinato dal Cesati ma certo non è l'*adustum* di Fries).
- Hydnum zonatum*. Locarno selva di Orselina.
- Hydnum subsquanosum* [Batsch]. Ai piedi di castagni, selva sotto Orselina.
- 20 ODONTIA
Odontia vitalbae Cesati. Locarno al Sasso, ai rami della *Clematis vitalba* nei luoghi ombrosi.
- 21 IRPEX
22 CRATERELLUS
Odontia bugellensis Cesati. Bignasco ai pali vecchi di castagno della spalliera.
- Irpex fuscoviolaceus* [Fr.]. Locarno al Sasso alle schegge della legna di tiglio.
- Craterellus sinuosus* Fr. Ai ceppi di castagni a Locarno, Vezia.
- Craterellus cornucopioides* Pers. Locarno, Bellinzona, nella selva ai piedi di nocciuoli.
- Craterellus crispus* [Pers.]. Orselina, selva, sulla terra. Ott.
- 23 THELEPHORA
Thelephora tabacina [Fr.] (manca nell'erbario) Ai ceppi di nocciuoli, Locarno.
- Thelephora rubiginosa* [Schr.]. Locarno, Gudo, ai ceppi di castagni.
- Thelephora terrestris* Ehrh. Nella selva frondosa, Locarno selva del Sasso d'Orselina, non rara.
- Thelephora sebacea* Fr. Nella selva infesta la gramigna ed i muschi. Locarno al Sasso, Vezia (P.A.).
- Thelephora fusca* Fr. Alla corteccia di varie piante. Locarno, sopra Orselina.
- 24 STEREUM
Stereum disciforme Fr. Locarno, Bignasco, alla corteccia di nocciuoli, della betulla.
- Stereum hirsutum* Fr. Locarno, Bellinzona, ai tronchi degli alberi, ai pali
- Stereum purpureum* Pers. Tenero ai fittoni di pioppo disseccato. Ott. 11, 1859.
- Stereum rugosum* Fr. Locarno.
- Stereum sanguinolentum* [Pers.]. Locarno. *var. lilacina* ivi.
- Stereum alneum* sugli ontani, Locarno.
- Stereum disciforme* Fr. Ai tronchi della betulla, alberi recisi. Bignasco.
- 25 AURIGULARIA
26 CORTICIUM
Auricularia mesenterica [Pers.]. Losone, Tenero, ai tronchi delle noci e dei susini.
- Corticium ochroleucum* Fr. Ai tronchi sugli alberi, Bignasco.
- Corticium coeruleum* Fr. Locarno, Ascona, Bellinzona, alla corteccia e sul legno nudo di pali, castagno, salice.
- Corticium cinereum* [Pers.]. Locarno, Cavigno, Bignasco.
- Corticium incarnatum* (Pers.). Locarno, sulla corteccia dell'*Hedera helix*.
- Corticium laeve* [Pers.] (manca nell'erbario). Locarno.
- Corticium lacteum* [Fr.]. Locarno, sulla corteccia del tiglio.
- Corticium alneum* [Fr.]. Locarno sulla corteccia della *Clematis vitalba*.
- Corticium roseum* Pers. Bignasco sui rami degli arbusti, sett. ott.
- Corticium sebaceum* Pers. Locarno, nei boschi di Fregiera, incrostante i muschi.
Vedi *Th. sebacea* Pers.
- Corticium comedens* [Nees]. Bignasco ai rami di noci e di castagno.
- Corticium alutaceum* Pers. Ai tronchi della *Betula alba* recisi. Bignasco di primavera e d'autunno inoltrato (mar. - nov.).
- 27 CLAVARIA
Clavaria candida Wein. (manca nell'erbario). Locarno nei boschi e nei prati.
- Clavaria flava* Pers. Nella selva sulla terra. Locarno sopra S. Biagio, Bignasco, Bellinzona.
- Clavaria fastigiata* Del. Nella selva tra i muschi, Locarno Fregiera.
- Clavaria muscoides* Linn. Nella selva.
- Clavaria coralloides* L. Nella Selva.
- Clavaria cristata* Holm. Locarno al Sasso, nella Selva.

- 28 PISTILLARIA
29 GEOGLOSSUM
30 EXIDIA
31 DACRYMYCES
32 TREMELLA
33 GUEPINIA
34 CALOCERA
35 HYPOCHNUS
- Clavaria aurea* Schaeff. Selva sopra Locarno (per la cima dei rami tubulati si avvicina alla *muscoides*).
Clavaria mucida Pers. Selva di S. Biagio sopra Locarno. Ott. fra i muschi.
Clavaria vernalis Schwein. Sulla riva aggrottata lungo i torrenti dell'Alpi. Sulla terra Alpe di Stabiorello, Valle Calanca, 29 luglio 1859 alta 4-5 centimetri - larga una.
Pistillaria micans Pers. Locarno ai rami vecchi dell'*Antirrhinum majus*.
Geoglossum hirsutum [Pers.]. Locarno e Vezia nei prati arenosi.
Exidia auricola [Fr.]. Locarno ai tronchi del sambuco e dell'oppio.
Exidia glandulosa [Fr.]. Minusio sulla corteccia del noce.
Dacrymyces stillatus - urticae Rabenh. Sui ceppi putrescenti della *Urtica dioica*.
Dacrymyces stillatus [Nees]. Frequente alla tavola esposta all'umidità, alla legna. Locarno, anche nel mio giardino.
Dacrymyces deliquescens Duby. Alla legna di abete scorticato o fabbricato. Locarno. Boschi di Cimalmotto, sui tronchi degli alberi scorticati, dopo pioggia; sett. 1860
Tremella aurantia Schwein. Locarno. Vai Sambuco, sugli tronchi in putrefazione, sulla tavola e sulla corteccia.
Tremella sarcoides [With.]. Ai tronchi di faggi, a Gudo e a Locarno.
Guepinia helvelloides Fr. Monte Tamara, Alpe di Cortenovo al piede di un faggio. Giugno.
Calocera tricolor Franzoni. Gelatinoso, cartilaginea, secca cornea, sun. (duplica)? e talvolta forcuta, solitaria, allungata, quasi lineare, schiacciata, poco contorta, base cinta da un tomentoso fuliginoso, clava cenerognola o biancastra, anche rugosa, apice linguiforme, giallo carnicino. Stirpe elegante, lungo 3-4 cent. Cresce nelle selve sui legni? fra muschi. Locarno al Sasso scoperto dal Rvdo Padre Agostino e comunicatomi nel 1859. [Cancellata e scritto in seguito: è la *Sphaeria Hypoxylon* in stato giovanile.]
Hypochmus violaceo cinctus [?]. Ai tronchi decorticati dei castagni. Mendrisio, selva lungo la strada vecchia di Castello.

II DISCOMYCETES

- 1 MORCHELLA
2 HELVELLA
3 PEZIZA
- Morchella esculenta* Pers. Locarno nè Saleggi. Tenero. Bellinzona
Morchella conica. Locarno. Biasca.
Morchella inflata. Locarno, prati di Losone.
Helvella lacunosa Afzed. Locarno al Sasso sulla terra del margine delle selve. Sett.
Helvella crispa Fr. (manca nell'erbario). Locarno al Sasso presso le Cappelle al di sopra del Convento lungo la strada che conduce ai Monti. Tenero presso la Cartiera.
Helvella infula Schaeff. Tenero alla Cartiera, luoghi ombrosi, arenosi umidi. (23 sett. 1862).
Helvella elastica [Bull.]. Locarno al Sasso.
Peziza leporina [Batsch]. Locarno al Sasso. Nel concio di campi di pomi di terra, frequente.
Peziza macropus [Pers.] (manca nell'erbario). Locarno nelli fossati sopra il Sasso; rara.
Peziza echinophila [Bull.]. Locarno fra i ricci [poi cancellato e sostituito con gli involucri] della castagna in putrefazione; frequente. Ott.- Marzo.
Peziza cupularis L. Selva ai Sasso, San Biagio, Locarno.
Peziza umbrorum Fr. Sulla terra nella selva, Locarno a S. Biagio, ott.
Peziza hirta Schum. Sulla terra arenosa dopo la pioggia, Locarno.
Peziza vulgaris Fr. Ai rami secchi di salice, Locarno, ott.
Peziza bufonia Pers. Locarno, selva sopra S. Biagio, di primavera.
Peziza papillaris Bull. Al tronco dell'*Abies excelsa* DC nel bosco della Mutta. Valle Calanca (29 luglio 1869).
Peziza carnea Pers. Ai legni ed alla corteccia. Bignasco alla corteccia di un castagno (luglio 1859).
Peziza atrata Pers. an specie nova. Ai cauli e rami delle erbe. Bignasco ott.
Peziza patellarium ? Ai tronchi decorticati degli abeti. Bosco della Mutta Valle Calanca. Sarebbe mai una *Ostropa* ?
Peziza resiniae - mitri ? [Fr.]. Ai tronchi delli *Abies excelsa* nel Bosco della Mutta nella Valle Calanca. Da esaminarsi.

- Peziza scutellata* L. var. *macrochata* Erb. Alla legna putrefacentesi nei luoghi umidi.
Sulla terra alla salita dell'Alpe di Sfilte sopra Cimalmotto, agosto.
- Peziza Persoonii* [Moug.]. Ai cauli dell'*Equisetum* fluviale al ponte di Ascona;
1860 Ott.
- Peziza nummularia* [?]. Brontallo, ai rami, tronchi d'una pomacea, (1861 P.A.)
- Peziza pallescens* Pers. Locarno ai fusti vecchi della *Phytolacca decandra* nella valletta della Madonna del Sasso.
- Peziza amorpha (corticium)* [?]. Ai rami secchi dell'*Abies pectinata* nell'Alpe di Cardada
1670 (29 luglio 1863).
- Peziza cochleata* [Huds.]. Locarno, sui legni sternati, marci di ...
- Peziza lycoperdiodes* [?]. Ad un letamaio nella campagna di Locarno
(11 ottobre 1863).
- Peziza vitellina* [Pers.]. Ad un letamaio come sopra (11 ott. 1869).
- Peziza compressa* Pers. [vedi no. 17]. Locarno, sulla legna secca di ottobre,
Valletta di S.Biagio.
- Peziza virginea* Pers. Valle Calanca, Bosco della Mutta, sui tronchi degli abeti, luglio.
- Peziza radiata* [?]. Al Sasso sopra Locarno, ai cauli essiccati delle erbe. P.A.
- Peziza synopica* [?]. Locarno ai rami d'edera secchi.
- 4 *TRICHOLECONIUM* *Tricholecomium* Locarno ai cauli della *Convallaria Polygonatum* al Sasso.
Tricholecomium roseum (Sphaeria Gallii) [?]. Locarno ai cauli del *Gallium* (quale ?)
sulla terra, al Sasso.
- 5 *LEOTIA* *Leotia lubrica* Pers. Locarno nei boschi e nella selva di Fregiera a Sasso. Bellinzona
nella selva sotto il castello d'Unterwalden e in quella di Vigana. Sett. Ott.
- 6 *BULGARIA* *Bulgaria sarcoides* Fr. Locarno ai ceppi delle noci e del gelso. Loco.
Bulgaria inquinans Pers. Locarno alla corteccia de tronchi della quercia abbattuta.
Gordevio ott. 1863.
- 7 *PATELLARIA* *Patellaria atrata* Fr. Nees Syst. f.265. Locarno alla legna disseccata dei castagni.
Patellaria dicolor ? Locarno.
- 8 *CENANGIUM* *Cenangium cerasi* Fr. Locarno sui rami e tronchi dei ciliegi, perenne
- 9 *EXCIPULA* *Excipula strigosa* Corda. Locarno, qua e là ai cauli delle erbe.
Excipula eryngii Corda Locarno.
- 10 *HYSTERIUM* *Hysterium quercinum* [Pers.]. Locarno, al Sasso ai rami della quercia.
Hysterium herbarum Fr. (manca dall'erbario). Locarno al Sasso, frequente ai cauli
dello *Asclepias vincetoxicum*.
Hysterium speciosum Rud. (manca dall'erbario). Locarno ai rami dell'oleandro, al Sasso.
Hysterium lauri [Fr.] (manca all'erbario). Locarno al Sasso, sulle foglie del Lauroceraso.
Hysterium fraxini Pers. (manca all'erbario). Locarno al Sasso, ai rami dei frassino.
Hysterium rubi Pers. (manca all'erbario). Locarno ai sarmenti dei rovi.
Hysterium hederæ Corda. Locarno.
Hysterium pulicare [Pers.]. Alla corteccia di pioppi annosi; Tenero al Salciolo.
Hysterium pinastri Schrad. Sulla foglia dell'*Abies excelsa*, Campo.
Hysterium foliicolum Fr. Sulla foglia del castagno, nelle selve, di primavera.
Hysterium elongatum Wahl. Sul legno scorticato della *Betula alba* ancor vivente.
Vicini d'Albigo (7 ottobre 1861).
Hysterium fraxini Pers. Arcegno ai rami di frassino caduti in luoghi umidi, ombrosi.
(1861 ottobre 1).
Hysterium lauricerasi [? Lauri-Fr.]. Locarno alla foglia essiccata dell'alloro. P.A.
Hysterium lineare Fr. Arcegno ai pali vecchi di castagni.
Hysterium fagineum-rugosum [Schrad] *sin. Dichaenum rugosa* Fr. sulla corteccia di faggi,
frequente; Selva di Caveragno.
- 11 *PHACIDIUM* *Phacidium nervisequum* ?. Locarno al Sasso, alla foglia del raperonzolo.
Phacidium Medicaginis Desm. (manca). Locarno al Sasso, alla foglia della Lupinella.
Phacidium multivalve [?] (manca). Monte Generi, alla foglia dell'agrifoglio.
Phacidium laurocerasi [Desmz.]. Locarno al Sasso, alla foglia del lauro.
- 12 *RHYTISMA* *Rhytisma acerinum* Fr. Agli oppi (?) Locarno, Bignasco.
Rhytisma punctatum Fr. Locarno, alla foglia dell'*Acer campestre*.
Rhytisma violaceum (mitis) ?. Giubiasco alla foglia della viola, campo S. Bartolameo
(giugno 1860).
- 13 *STICTIS* *Stictis radiata* Pers. Locarno ai rami secchi del frassino e del sambuco.

III GASTEROMYCETES

- 1 *PHALLUS* *Phallus impudicus* [Mich.]. Nei prati e nelle selve d'estate e d'autunno. Alla Chiesa Von Mentlen presso S. Antonino! Nei prati Arbedo. Al Sasso; fetidissimo.
Phallus caninus Huds. Nella selva, Rovio, per quanto mi fu riferito dal Sig. Avv. C.M. Massa.
- 2 *CLATHRUS* *Clathrus cancellatus* L. Nei giardini, immondezzai, cimiteri, luoghi uggiosi. Locarno, Avegno, Contra; fetidissimo.
- 3 *GAUTIERA* *Gautiera morchelliformis* Vitt. Locarno al Sasso, sulla terra a maggio.
- 4 *TUBER* *Tuber* ... Nella selva ... Riva San Vitale. N.B. vuolosi anche averlo trovato alla Fraccia presso Locarno e ad Intragna.
- 5 *RHIZOCTONIA* *Rhizoctonia vitis* Kunze. Nei vigneti sulle radici morte della vite.
- 6 *CARPOBOLUS* *Carpobolus stellatus* Desmaz. Sulla mela vaccina, Vezia, d'autunno.
- 7 *NIDULARIA* *Nidularia striata* Bull. Nei boschi sulla nuda terra e ai margini dei campi di collina. Locarno selva di S.Biagio al Sasso. Cadenazzo, Minusio margini di campo, lungo la strada di Brione
Nidularia laevis Hoffman. Ai legni marci, al Sasso.
Nidularia crucibulum Fr. Ai legni marci, al Sasso di primavera.
- 8 *GEASTER* *Geaster hygranetricus* Pers. Sulla terra nei boschi, al Sasso e ad Orselina sopra Locarno.
Geaster Cesati Rabenhorst. Sulla terra erbosa tra Brione ed Orselina a solatio. Sett. 2, 1864 Pad. Agostino.
- 9 *SCLERODERMA* *Scleroderma verrucosum* [Pers.]. Selva e luoghi montuosi, Locarno, Losone.
Scleroderma bovista Fr. Locarno, selva.
Scleroderma vulgare Fr. Nei pascoli, Locarno, Losone, Bellinzona.
- 10 *LYCOPERDON* *Lycoperdon coelatum* Bull. Nei pascoli e prati, Locarno, Losone.
Lycoperdon pusillum Batsch. Nei pascoli e prati, Locarno al Sasso.
Lycoperdon gemmatum Pers. Nei pascoli sterili, Locarno, Losone.
Lycoperdon dermoxanthum Vitt. Locarno, al Sasso.
Lycoperdon muscicola Cesati. Fra i muschi sulle pietre nella selva. Locarno al Sasso, Bellinzona sotto il castello di Unterwalden.
Lycoperdon hirtum [Batsch]. Fra muschi sulla terra, Locarno al Tassinio.
Lycoperdon xanthocarpum Cesati. Bellinzona pascoli umidi dietro la roccia di S. Michele. (luglio 9, 1859).
- 11 *TULOSTOMA* *Tulostana fimbriata* Fr. Nei luoghi sterili, lungo la strada al Sasso sopra Locarno.
Tulostana mammosum [Pers.] Locarno, al Sasso.
- 12 *ELAPHOMYCES* *Elaphomyces granulatus* [Fr.]. Nei boschi castanili, né querceti. Vezia, Locarno alla Fregiera, Rovio, non frequente.
Elaphomyces cervinum [Fr.]. Locarno al Sasso, Padre Agostino ott. 1861.
- 13 *LYCOGALA* *Lycogala miniata* Pers. Sui legni fracidi, al Sasso sopra Locarno, a Bignasco, d'estate. Nei faggeti dei monti di Losone. Prima rossa punteggiata di bianco, carne color minio, poi bruna.
Lycogala epidendron L. Sui legni fracidi, al Sasso. (N.B. parmi specie identica alla precedente).
- 14 *AETHALIUM* *Aethalium flavum* [?] (manca). Alle erbe e ai tronchi putridi. Al Sasso sopra Locarno, non frequente.
- 15 *DIDERMA* *Diderma* ... ? Al Sasso.
- 16 *DIDYMIUM* *Didymium farinaceum* Schr. Sui rami putridi, Locarno al Sasso.
- 17 *PHYSARUM* *Physarum sinuosum* Dittm. Alle foglie ed ai rami, Locarno al Sasso.
Physarum leucopus Rab. var. *major*. Alla foglia, rami! Locarno al Sasso.
Physarum farinaceum Pers. Locarno ai cauli secchi della *Phytolacca decandra*, ott.
- 18 *STEMONITIS* *Stemonitis fusca* Roth. Ai rami marcescenti, Locarno tutto l'anno.
Stemonitis ferruginea Chrent. Ai legni marcescenti Locarno.
Stemonitis typhina Pers. Locarno ai tronchi marci.
Stemonitis mammosa. Legno vecchio, Locarno, rara.
- 19 *CRIBRARIA* *Cribraria argillacea*. Sul legno decortificato di salici. Locarno, al Sasso.
- 20 *ARCYRIA* *Arcyria punicea* Pers. Alla legna marcia ed umida. Locarno al Sasso.
Arcyria incarnata. Ai pali della vigna, Orselina.
Arcyria cinerea. Ai tronchi marci, al Sasso, Giugno.
- 21 *TRICHIA* *Trichia rubiformis* Pers. Sui rami vecchi della legna. Locarno al Sasso.
Trichia serotina Schr. Ai rami putridi, al Sasso, d'autunno.

- Trichia fallax* Pers. Ai rami putridi, al Sasso d'estate e d'autunno.
Trichia chrysoasperma Dec. Ai rami marciti, al Sasso.
Trichia turbinata Witt. Sulla legna in putrefazione, al Sasso.
Trichia serpula Pers. Sulla legna in putrefazione, al Sasso.
Trichia nutans Bull. Locarno.
- 22 *PERICHAENA* *Perichaena strobilina* Fr. Alle squame di conifere, abeti.
 23 *CRATERIUM* *Craterium pedunculatum* [?]. Alla foglia morta di varie piante, Al Sasso.
 24 *MYROTHECIUM* *Myrothecium verrucaria* Tod. Alle erbe, al Sasso.
 25 *RETICULARIA* *Reticularia umbrina*. Alla legna putrida, al Sasso.
 26 *ERYSIPHE* *Erysiphe humuli* Dec. Alla foglia dell'*Humulus lupulus* Avegno, agos.,sett.
Erysiphe oxyacanthae Dec. Alla foglia del *Crataegus oxyacantha*. Bignasco - ott.
Erysiphe Mali Dub. Alla foglia del melo, del ciliegio. Bignasco, ott.
Erysiphe cammuüs Link. Sulla foglia di varie piante.
Erysiphe umbelliferarum [?]. Sulla foglia dell'*Heracleum sphondylium* a Bignasco, ott.
Erysiphe cichoriacearum Dec. Sulla foglia del *Tragopogon porrifolius* coltivato, Bellinzona, sett.
Erysiphe tortilis Link. Alla foglia del *Cornus sanguinea*, al Sasso.
Erysiphe lamprocarpa Link. Alla foglia del *Lamium*, Locarno di giugno.
Erysiphe adunca [Schl.]. Alla foglia del pioppo, Locarno.
Erysiphe aceris Dec. Alla foglia dell'oppio, Bignasco ott.
Erysiphe penicillata [Schl.] a)alni. Alla foglia dell'ontano, Caveragno ott.
Erysiphe fagi Duby. Alla foglia del faggio nelli boschi della favola (?) di Caveragno.
Erysiphe guttata Link.
 a) *Coryli*. Alla pagina inferiore della foglia del nocciuolo, Caveragno, Bellinzona, Rancate, ott.-nov.
 b) *Fraxini*. Alla pagina inferiore delle foglie del frassino, Caveragno, Bellinzona, S Antonino alla Viganà. Sett.-ott.
Erysiphe viburni Duby. Alla pagina inferiore delle foglie del *Viburnum opulus*. Bignasco, ott.
Erysiphe fuliginea var. *lamprocarpa* [Link]. Alle foglie. Locarno.
Erysiphe leucocarpa [?]. Ivi.
Erysiphe sopedi (?). Ivi.
- 27 *OIDIUM* *Oidium fusisporioides* [Fr.]. Alle foglie del *Lamium* ? Locarno al Sasso.
Oidium erysiphoides [Fr.]. Ivi.
Oidium leucoconium [Desc.]. Ivi.
Oidium fructigenum [Kze.]. Ivi.
Oidium fritici (?). Sulla foglia del frumento. Ivi.
Oidium fückeri [?]. Sugli acini dell'uva, lugl.-ott. (Tosc. Melata - malattia dell'uva critogama).
Oidium oblongum (?). Sulle foglie delle zucche. Ott. 1861 (nel mio giardino).
- 28 *SCLEROTIUM* *Sclerotium clavus* [Dec.]. Ai rami del *Secale urcala* frequente.
Sclerotium complanatum [rode]. Alle foglie delle graminacee, al Sasso di primavera.
Sclerotium varium Pers. Alle foglie putrefascenti di varie piante erbacee, Locarno, di inverno-primavera.
Sclerotium durum Pers. Alle foglie di varie piante disseccate. Locarno d'inverno, di primavera.
Sclerotium nervale Fr. Alle foglie di susini, al Sasso.
Sclerotium populinum Pers. Alle foglie dei pioppi, Belvedere sopra Locarno.
Sclerotium fulvum Fr. Ai pali della vite, al Sasso sopra Locarno.
- 29 *CHAETOMIUM* *Chaetanium globosum* Kze. Alla foglia della *Valeriana tripteris* Locarno, al Sasso.
 30 *ASCOPHORA* *Ascophora* ... ? Alla foglia del *Cornus* ... al Sasso sopra Locarno.
 31 *MELANOSPORA* *Melanospora euphorbiae* [?]. Alla foglia dell'*Euphorbia helioscopia*. Locarno, Brione sopra Minusio, d'estate.

IV PYRENOMYCETES

Sect. 1

Periphericae

1 *SPHAERIA*

Sphaeria militaris L. Ehrb. Vezia nella selva; Bellinzona nelle selve castanili a Viganà. Ott.

- Sphaeria ophioglossoides* Ehrh. Locarno al Sasso sotto il Ronco già Bonanzi fra i muschi; 1860 sett.
Sphaeria concentrica Bolt. Al tronco degli ontani nell'alveo della Bavona a Bignasco, autunno e primavera.
Sphaeria fragiformis Pers. Alla corteccia dei faggi. Caveragno.
Sphaeria rufa Pers. Alla corteccia di nocciuoli, Locarno, Bellinzona.
Sphaeria granulata Sow. Alla corteccia degli alberi. Valle Bavona tra S. Carlo e Campo agli ontani. Ott. Ai frassini al Sasso.
Sphaeria citrina Pers. Ai rami disseccati dei castagni, a Bignasco.
Sphaeria typhina Pers. Alla foglia del loglio (quale?) Locarno.
Sphaeria rubiginosa Pers. Ai tronchi dei frassini, falso ebano, e dei salici, presso Locarno.
Sphaeria incrustans Pers.
Sphaeria Hypoxylon L. Ehrh. Ai rami essiccati, cariosi, della betulla bianca, Bignasco.
Sphaeria (Diatrype) Borengariana De Notaris. Alpe di Cardada sopra Locarno ad un faggio scorticato e cadente. 1863 lugl. 29 A.Franz. (mio erbario).

Sect. 2

Hypophyricae

- Sphaeria deusta* Hoffm. Ai tronchi degli alni. Valle Bavona.
Sphaeria stigma Hoffm. Ai rami di peschi, castagno, Locarno.
Sphaeria discifonnis Hoffm. Ai rami di faggio, Tenero, a Brione sopra Minusio.
Sphaeria verrucaeformis Ehrh. Alla corteccia della quercia, Locarno.
Sphaeria flave-virens Hoffm. Alla legna nell'acqua. Locarno al Sasso.
Sphaeria ceratospora Tode. Alla corteccia dei castagni. Locarno.
Sphaeria strumella Fr. Ai rami del Ribes, Locarno, Bignasco.
Sphaeria spiculosa Pers. Alla corteccia dei tigli a Locarno.

Sect. 3

Amphiphericae

- Sphaeria nivea* Hoffm. Alla corteccia dell'albarella, al Sasso sopra Locarno.
Sphaeria tapella Pers. Alla corteccia e ai rami dei salici a Locarno.
Sphaeria cinnabarina Tod. Alla corteccia dei tigli, Locarno.
Sphaeria coccinea Pers. Sulla corteccia del gelso a Locarno.
Sphaeria laburni Pers. Ai rami morti del *Cytisus laburnum* a Melano, Mendrisio.
Sphaeria elongata Fr. Ai rami del *Sarothamnus scoparius* a Locarno.
Sphaeria Anethi Pers. Ai cauli del finocchio né colli sopra Locarno.
Sphaeria graminis Pers. Ai cauli delle graminacee, Locarno.
Sphaeria trifolii Pers. Alla foglia di varie specie di trifoglio.
Sphaeria fimbriata Pers. Alle foglie del carpino alle Cantine presso Rancate (vista).
Sphaeria coryli Batsch. Alle foglie del nocciuolo, al Sasso sopra Locarno.
Sphaeria comica (?) *coniformis* Fr. ? Ai tuffi secchi della *Phytolacca decandra*, Locarno, 5 ott. 1861.
Sphaeria sanguinea Sibth. Sulla legna scorticata sotto l'acqua, al Sasso sopra Locarno.
Sphaeria spermoides Hoffm. Sul tronco di un albero reciso nella valletta di S. Biagio sopra Locarno, di primavera.
Sphaeria pulvis-pyrus Pers. Sui tronchi secchi e scorticati di castagni, degli ontani, a Locarno.
Sphaeria rostrata [rostellata Fr. ?] Tode. Sui rami dei salici alla sponda della Bavona a Bignasco. (7 apr. 1859).
Sphaeria rhodostema A.S. Sui rami del noce, al Sasso sopra Locarno.
Sphaeria ilicis Sch. Alle foglie aride dell'agrifoglio ad Orselina, sul Monte Ceneri, in Centovalli.
Sphaeria complanata Tode. Ai cauli delle erbe, Bellinzona.
Sphaeria doliolum Pers. Ai cauli delle erbe maggiori.
Sphaeria culmifraga Fries. Sul caule dell'erba, al Sasso sopra Locarno.
Sphaeria herbarum Fr. Sui cauli delle erbe, comune.
Sphaeria tubaeformis Tod. Sulle foglie dell'ontano in ott. e nov.
Sphaeria gnomon Tode. Sulle foglie caduche del nocciuolo, di primavera
Sphaeria hederæ Sow. Sulle foglie dell'edera di autunno, Mendrisio, Rancate, lugl.-ott.
Sphaeria vincae Fr. Sulle foglie morte della Vinca minor. Mendrisio, ott.-nov.
Sphaeria myriadea Dec. Sulle foglie della quercia e dei castagni. Locarno, Bellinzona, Bignasco.

Incertae sedis

- Sphaeria maculaeformis* Pers. Sulle foglie di castagni, Locarno al Sasso.
Sphaeria punctiformis Pers. (*Dipholia faginea* var. *alnea*) ? Alle foglie della quercia, di faggi, frequente. Locarno, Caveragno.
Sphaeria aegopodii Pers. Alle foglie dell'*Aegopodium podagraria*. Bellinzona, ago.
Sphaeria hederaceola Fr. Alle foglie dell'edera, Locarno, Mendrisio.
Sphaeria vagans Fr. Alle foglie di varie erbe.
Sphaeria mori (?) misi pro interim. Alla corteccia di gelsi, Bellinzona.
Sphaeria corticis Fr. Alla corteccia dei pioppi, Tenero.
Sphaeria decedens Fr. S. Carlo Val Bavona fra la corteccia dell'*Alnus glutinosa*.
Sphaeria patella Fr. Ai cauli delle ombrellifere disseccati, M.te San Giorgio.
 La Casina [?] ad un ombrellifera nel letto del torrente di Maggia. 1859.
Sphaeria rubi Rab. Sulle foglie aride del pungitopo, a Mendrisio, Rancate.
Sphaeria populi misi pro interim. Ai fittoni di pioppo secchi, Tenero.
Sphaeria ceratostoma ?. Locarno alla corteccia dell'*Alnus glutinosa*.
Sphaeria convallariandea D.C. Alle foglie della *Convallaria multiflora* L. Bignasco giu. 1859 ai piedi del M.te del Cantone verso la Cascata.
Sphaeria aurantia Pers. Ai polipori sul ceppo d'un vecchio noce poco discosto dalla cappella della natività lungo la, strada vecchia che sale alla Madonna del Sasso. Locarno.
Sphaeria ovina Pers. Al Sasso, Orselina sui legni secchi all'umido. Ott. 1861 P.A.
Sphaeria abietina (?) [*abietis* Fr. ?]. Alla corteccia dei rami dell'*Abies pectinata* sternati o secchi. Alpe di Cardada 1670 [s.l.m.] sopra Locarno.
Sphaeria dematium Pers. (da esaminarsi).
Sphaeria aquila Fr. Ai rami dei salici, al Sasso. P.A.
Sphaeria (Venturia) dianthii A.S. Ai cauli essiccati, particolarmente alla vagina delle foglie del *Dianthus acrobulus* verso Pontebrolla. (23 ott. 1866).
Sphaeria numularia Dec. Brontallo alla corteccia d'una panacea; 1861, giu. P.A.
Sphaeria cytisicola mitri. Alle foglie del *Cytisium laburnum*, Mendrisio nov. 1859.
Sphaeria mori Cesati (manca all'erbario). All'i rami del gelso; Locarno.
Sphaeria lignicola (an *lineola*?) Fr. All'i rami dell'albarella; Locarno al Sasso.
Sphaeria brunnea (brunneola?) Fr. manca, Locarno.
Sphaeria radicalis Schm. (manca). Alla corteccia dei castagni, Locarno.
Sphaeria trichostana Fr. (manca). Ai colmi della segale, Bellinzona.
Sphaeria complicata Waltr. Al caule della *Phytolacca decanda*, Locarno al Sasso.
Sphaeria inquilina ? (manca). Ai rami secchi dell'oppio.
Sphaeria caulium Fr. Ai fusti del *Chrysanthemum lineus*, al Sasso sopra Locarno.
Sphaeria pulchella Pers. Alla corteccia del ciliegio, Orselina.
Sphaeria epidermidis Fr. var. *microscopica*. Alle samare del frassino; Locarno.
Sphaeria urticae ?. Alle ortiche, Locarno.
- 2 *DOTHIDEA*
Dothidea ribesia Pers. Ai rami morti del *Ribes rubrum*, Bellinzona, d'inverno.
Dothidea puccinoides Dec. Ai rami ed alle foglie dell'*Evonymus*, del *Morus*, Locarno al Sasso. a) forma *Mori*, al gelso, b) forma *Evonymi*, al *Evonymus*.
Dothidea Sambuci Pers. Ai rami secchi del *Sambucus nigra*.
Dothidea latitans Fr. Alle foglie secche annerite del *Vaccinium vitis Idaea*, Orselina.
Dothidea cytisicola mitri. Alla foglia del *Cytisium laburnum*. Mendrisio ott. 1859.
Dothidea rubra Pers. Alle foglie del *Prunus spinosa*, Locarno, Bellinzona.
Dothidea lonicerae Fr. Alle foglie della *Lonicera coerulea* L. sopra Campo di Valle Maggia. Agos.
Dothidea anenones Dec. Alle foglie dell'*Anemone nemorosa*. Losone, apr.
Dothidea insulpta Walbr. Ai rami d'un olmo, al Sasso sopra Locarno.
Dothidea tetraspora ? Ai rami secchi della vitalba.
Dothidea fulva Dec. Alle foglie di prugne, di ciliegi, al Sasso sopra Locarno.
- 3 *ASTEROMA*
Asteroma radiosum [?]. Alle foglie della rosa, al Sasso.
Asteroma atratum [Chev.]. Alle foglie della *Saponaria officinalis*, Locarno al Sasso.
- 4 *MYRIOCEPHALUM*
Myriocephalum botryosporum Mont. Alla corteccia del nocciuolo, al Sasso.
Myriocephalum hederacedum De Not. Ai rami secchi dell'edera, al Sasso sopra Locarno.
- 5 *LASIOBOTRYS*
Lasiobotrys lonicerae Kunze. Alle foglie della *Lonicera coerulea* a Campo di Valle Maggia (3200) di lugl.-agos.
- 6 *ACTINOTHYRIUM*
Actinothyrium graminis Kunze. Alle foglie e colmi delle graminacee, Orselina.

- | | |
|----------------|---|
| 7 LABRELLA | <i>Labrella</i> ... ? Alla foglia della <i>Genziana purpurea</i> e della <i>Hemerocallis fulva</i> . Al Sasso sopra Locarno. |
| 8 CYTISPORA | <i>Cytispora leucosperma</i> Pers. Ai sarmenti del rovo, al Sasso.
<i>Cytispora fugax</i> Bull. Alla corteccia dei salici, al Sasso. |
| 9 PILIDIUM | <i>Pilidium acerinum</i> Kunze. Alle foglie dell'oppio, al Sasso. |
| 10 LEPTOSTROMA | <i>Leptostrana filicinum</i> Fr. Agli stipiti della <i>Pteris aquilina</i> . |
| 11 PHOMA | <i>Phoma</i> ... ? Ai cauli e capsule del tulipano, al Sasso. |

V HYPHOMYCETES

Cephalotrichei

- | | |
|--------------------|--|
| 1 ISARIA | <i>Isaria felina</i> Fr. Sullo sterco di gatti, Locarno al Sasso. |
| 2 CERATIUM | <i>Ceratium hydnoydes</i> Fr. Sulla legna in putrefazione, Locarno al Sasso |
| 3 MUCOR | <i>Mucor mucedo</i> L. Sul formaggio vecchio. |
| 4 BOTRYTIS | <i>Botrytis bassiana</i> Bals. Sui tralci da vite (calcino). |
| 5 ASPERGILLUS | <i>Aspergillus glaucus</i> Link. Sul pane ed altre materie marcescenti.
<i>Aspergillus roseus</i> Link. Sulla frutta, sugli acini dell'uva. |
| 6 SPOROTRICHUM | <i>Sporotrichum</i> ?. Sulla frutta putrefacentesi. |
| 7 SPORENDONEMA | <i>Sporendonema casei</i> Desmaz. Alla crosta del formaggio. |
| 8 HELMINTHOSPORIUM | <i>Helminthosporium arundinaceum</i> [?]. Ai cauli della <i>Phragmites vulgaris</i> ? |
| 9 CLADOSPORIUM | <i>Cladosporium herbarum</i> Link. Ai cauli delle piante erbacee. |

Sul volume 94, 2006 del Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali sarà riportata la parte conclusiva del manoscritto di A. Franzoni e A. Daldini.




Fig. 1 - Copertina del manoscritto redatto da Alberto Franzoni e Agostino Daldini nel 1859.




Fig. 2 - Esempio di pagina del manoscritto redatto da Alberto Franzoni e Agostino Daldini nel 1859.