

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **SuchtMagazin**

Band (Jahr): **31 (2005)**

Heft 5

PDF erstellt am: **16.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Highlights

- DROGENDIAGNOSTIK
- OPIATENTWÖHNUNG

DER LEADER DER SCHNELLEN DROGENDIAGNOSTIK



SYVA® RapidTest

Drogenschnelltest

- Einfach-schnell-zuverlässig-kostengünstig
- Angebot 1er Test: Einzelplättchen mit THC/OPI/COC/mAMP/BAR/MTD/BZO
4er Test: THC/OPI/COC/mAMP
10er Test: THC/OPI/COC/mAMP/BAR/MTD/BZO/TCA/PCP/AMP

Senden Sie Ihre Wünsche per Fax
044 828 63 64

Syva® RapidTest

- Dokumentation
- Offerte
- Fragen

NEU

Naltrexon-Cleantest

Erster umfassender Opiat-Schnelltest vor einer Naltrexon-Anwendung.



Zum Nachweis folgender Opiate im Urin.

- Buprenorphin
- Methadon
- Opiate (Heroin, Codein, Morphin)

Naltrexon Clean Test


- Information
- Muster
- Fragen

Zum Nachweis von Buprenorphin im Urin

- Schnell
- Einfach
- Kostengünstig


NEU

Buprenorphin Einzeltest



Buprenorphin Test

- Information
- Muster
- Fragen



UMFASSENDE NACHWEIS VON HARNVERFÄLSCHUNGEN

Intect® 7

Erfasst jede interne und externe Harn-Verfälschungs-Möglichkeit

- Angebot 25 Teststreifen mit je 7 Parametern

Intect®7

- Information
- Fragen

Naltrexin® (Naltrexon HCl)

Opiatfreie, medikamentöse Opiatentwöhnung und effiziente Rückfallprophylaxe parallel zu psychosozialer Betreuung.

- Kassenzulässig



Naltrexin® (Naltrexon HCl)

- Dokumentation
- Literatur
- Patientenpässe
- Patienteninformation
- Fragen

Wirkstoff: Naltrexon HCl 50 mg. I: Unterstützung bei Entwöhnung Opiatabhängiger nach erfolgtem Entzug. D: Wenn 7-10 Tage opiatfrei: Am 1. Tag 1/2 Tablette einnehmen, wenn keine Entzugssymptome, nach 1 h nochmals 1/2 Tabl. einnehmen. Danach am Montag und Mittwoch je 2 Tabl., am Freitag 3 Tabl. einnehmen. KI: Opioidgabe bzw. opioidpositive Urinprobe, schwere Leberinsuffizienz, Hepatitis, Überempfindlichkeit gegenüber Naltrexon, Schwangerschaft. NW: Selten Schlafstörungen, Durchfall, Verstopfung und ähnliche unerwünschte Wirkungen wie sie beim Entzug vorkommen. IA: Es sollten keine opioidhaltigen Medikamente gegeben werden. P: 28 Filmtabletten, Abgabekategorie: A. Zulassungsinhaber: Opopharma AG, Zürich. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittelkompendium der Schweiz.

Meine Adresse

OPOPHARMA AG, c/o Polymed Medical Center,
Industriestrasse 59, 8152 Glattbrugg
Telefon 044 828 63 63, Telefax, 044 828 63 64