

Zeitschrift: SuchtMagazin
Band: 32 (2006)
Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)


Download PDF: 19.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Highlights

• DROGENDIAGNOSTIK
• OPIATENTWÖHNUNG

DER LEADER DER SCHNELLEN DROGENDIAGNOSTIK



SYVA® RapidTest

Drogenschnelltest

- Einfach-schnell-zuverlässig-kostengünstig
- Angebot 1er Test: Einzelplättchen mit THC/OPI/COC/mAMP/BAR/MTD/BZO
4er Test: THC/OPI/COC/mAMP
10er Test: THC/OPI/COC/mAMP/BAR/MTD/BZO/TCA/PCP/AMP

Senden Sie Ihre
Wünsche per Fax
044 828 63 64

Syva® RapidTest

- Dokumentation
- Offerte
- Fragen

NEU

Naltrexon-Cleantest

Erster umfassender
Opiat-Schnelltest
vor einer Naltrexon-Anwendung.



Zum Nachweis folgender
Opiate im Urin.

- Buprenorphin
- Methadon
- Opiate (Heroin, Codein, Morphin)

Naltrexon Clean Test


- Information
- Muster
- Fragen

Zum Nachweis von
Buprenorphin im Urin

- Schnell
- Einfach
- Kostengünstig

NEU

Buprenorphin Einzeltest



Buprenorphin Test

- Information
- Muster
- Fragen



UMFASSENDE NACHWEIS VON HARNVERFÄLSCHUNGEN

Intect® 7

Erfasst jede interne und externe Harn-Verfälschungs-Möglichkeit

- Angebot 25 Teststreifen mit je 7 Parametern

Intect®7

- Information
- Fragen

Naltrexin® (Naltrexon HCl)

Opiatfreie, medikamentöse Opiatentwöhnung und
effiziente Rückfallprophylaxe parallel zu
psychosozialer Betreuung.

- Kassenzulässig



Naltrexin® (Naltrexon HCl)

- Dokumentation
- Literatur
- Patientenpässe
- Patienteninformation
- Fragen

Wirkstoff: Naltrexon HCl 50 mg. l: Unterstützung bei Entwöhnung Opiatabhängiger nach erfolgtem Entzug. D: Wenn 7-10 Tage opiatfrei: Am 1. Tag 1/2 Tablette einnehmen, wenn keine Entzugssymptome, nach 1 h nochmals 1/2 Tabl. einnehmen. Danach am Montag und Mittwoch je 2 Tabl., am Freitag 3 Tabl. einnehmen. KI: Opioidgabe bzw. opioidpositive Urinprobe, schwere Leberinsuffizienz, Hepatitis, Überempfindlichkeit gegenüber Naltrexon, Schwangerschaft. NW: Selten Schlafstörungen, Durchfall, Verstopfung und ähnliche unerwünschte Wirkungen wie sie beim Entzug vorkommen. IA: Es sollten keine opioidhaltigen Medikamente gegeben werden. P: 28 Filmtabletten, Abgabekategorie: A. Zulassungsinhaber: Opopharma AG, Zürich. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittelkompendium der Schweiz.

Meine Adresse

OPOPHARMA AG, c/o Polymed Medical Center,
Industriestrasse 59, 8152 Glattbrugg
Telefon 044 828 63 63, Telefax, 044 828 63 64