

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **SuchtMagazin**

Band (Jahr): **42 (2016)**

Heft 4

PDF erstellt am: **14.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Alkoholkonsum erfolgreich reduzieren¹

Ich habe
wieder die
Kontrolle!¹



Selincro® - 1 Tablette an jedem Tag mit Risiko für Alkoholkonsum in Verbindung mit psychosozialer Unterstützung.²

Selincro® (Nalmefen). I: Zur Reduktion des Alkoholkonsums auf hohem Risiko-Niveau bei erwachsenen Patienten mit Alkoholabhängigkeit ohne körperliche Entzugerscheinungen und für die keine sofortige Entgiftung erforderlich ist. Durch geeignet qualifizierten Arzt mit Erfahrung in der Therapie von Alkoholabhängigen und nur in Verbindung mit kontinuierlicher psychosozialer Unterstützung mit Ziel der Therapieadhärenz und Reduktion des Alkoholkonsums. D: 18mg nach Bedarf möglichst 1-2 Stunden vor einem bevorstehendem Alkoholkonsum oder so schnell als möglich nach dem Konsum. Maximale Tagesdosis 1 Tablette/Tag. KI: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen Hilfsstoff, Opioid-Entzugssyndrom, -Abhängigkeit oder -Missbrauch. Schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung. Alkoholentzugerscheinungen. Kinder und Jugendliche <18 Jahren. VM: In Notfallsituationen, falls Opiode erforderlich, möglicherweise Dosiserhöhung mit enger Überwachung bezüglich Atemdepression oder anderer Symptome erforderlich. Selincro ist nicht empfohlen bei Galaktose-Intoleranz, Lapp-Laktase-Mangel oder Glukose-Galaktose-Malabsorption. Vorsicht bei psychiatrischen Begleiterkrankungen, vormaligen Krampfanfällen, Nieren- oder Leberfunktionsstörungen, erhöhten Leberwerten. IA: Eventuell herabgesetzte Wirkung von Opiat-Agonisten (Hustenmittel, Antidiarrhoika und Opiat-Analgetika). Keine Interaktion mit Alkohol. SS/S: nicht empfohlen. UAW: *sehr häufig*: Schlaflosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Nausea; *häufig*: verminderter Appetit, Schlafstörungen, Verwirrtheit, Ruhelosigkeit, Libidoverminderung (inklusive Libidoverlust), Schläfrigkeit, Zittern, Aufmerksamkeitsstörung, Parästhesien, Hypoästhesie, Tachykardie, Palpitationen, Erbrechen, Mundtrockenheit, Hyperhidrosis, Muskelspasmen, Müdigkeit, Asthenie, Unwohlsein, ungewöhnliches Empfinden, Gewichtsabnahme. UD: Beobachtung und symptomatische Behandlung. P: Filmtabletten zu 18mg: 14, 28 und 42 [B]. Kassenzulässig. Die vollständige Fachinformation ist unter www.swissmedinfo.ch publiziert. Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg, www.lundbeck.ch. 03042014FI 1. Van den Brink et al. J Psychopharmacol 2014. 28;8:733-744. 2. Fachinformation Arzneimittel-Kompodium der Schweiz, www.swissmedinfo.ch



Für weiterführende Informationen
zum Thema Alkoholreduktion
besuchen Sie: www.redalc.ch

