

# Bücheranzeigen

Objekttyp: **BookReview**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss forestry journal  
= Journal forestier suisse**

Band (Jahr): **69 (1918)**

Heft 4-5

PDF erstellt am: **12.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Bücheranzeigen.

Bei der Redaktion eingegangene Literatur. — Besprechung vorbehalten.

**Forst- und Jagdkalender 1918.** Bearbeitet von Dr. M. Neumeister, Geheimer Oberforstrat und Oberforstmeister in Dresden, 1. Teil, Berlin Verlag von Julius Springer. Ausgabe A in Leinwand Mk. 2. 80, in Kunstleder Mk. 3. 40, Ausgabe B in Leinwand Mk. 3, in Kunstleder Mk. 3. 60.

\* \* \*

**Formklasstudier i fullslatur tallbestand.** Av. S. Mathson. Eine Studie über die Formklassen der dichtgeschlossenen Kiefernbestände. Aus den Mitteilungen der k. schwed. forstlichen Versuchsanstalt, Heft 13—14, 1917.

Die vorliegende Arbeit von Mathson befaßt sich mit der in den letzten Jahren oft angeschnittenen Frage der genauen Massenaufnahme von Beständen ohne Probe- stammfällungen. Einen bedeutenden Beitrag in dieser Sache hat uns besonders Schiffler geliefert in seinen zahlreichen Publikationen über verschiedene Holzarten in den Mitteilungen der österreichischen Versuchsanstalt, Heft 24, 27, 29, 31 und 34. Er hat die Stämme der Bestände in Formklassen eingeteilt. Die dazu notwendigen Formquotienten erhält er als Verhältnis des Durchmessers in Brusthöhe zum Durchmesser in halber Höhe des Stammes. Der Schwede Jonson hat dann den absoluten Formquotienten eingeführt als Verhältnis des Brusthöhendurchmessers zum Durchmesser in halber Höhe über Brusthöhe (1,3 m). Jonson hat an Hand exakter Stammanalysen die Formquotienten für alle Durchmesser über Brusthöhe von 10 zu 10 % der Höhe des Stammes berechnet. Er ist bei seinen Untersuchungen ausgegangen von der Mezgerschen Theorie: „Der Stamm hat die Form eines Trägers gleichen Biege- widerstandes.“ (Professor Jaccard in Zürich hat bekanntlich neuestens versucht, die Stammform als Träger gleicher Wasserleitungsfähigkeit zu erklären.) Die nach Jonson berechneten „Stammverschmälerungsreihen“ stimmen ziemlich gut überein mit den Formen, die der schwedische Telegrapheningenieur Höjer mit seiner Stammform- gleichung ermittelt hat. Ähnliche Untersuchungen hat früher schon Flury publiziert unter dem Titel: „Die Durchmesserabnahme mit der Höhe der Bäume.“

Die vorliegende Studie von Mathson ist eine vorbereitende Untersuchung über die Genauigkeit der verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Formklassen an ste- henden Kiefernprobestämmen und damit an Kiefernbeständen überhaupt. Es haben sich ganz beachtenswerte Resultate ergeben. Die Formquotienten werden mit dem Alter höher. Die Formklassen sind innerhalb eines Bestandes recht verschieden. Die verschie- denen Methoden zur Bestimmung der Formklassen zeigen ganz gute Resultate, wenn eine genügende Anzahl Probestämme mit Hilfe von entsprechenden Instrumenten stehend vermessen werden.

Für die Frage der Vermessung stehender Probestämme ohne Leiter bietet diese Arbeit recht viel Interessantes und kann sicher zum Studium empfohlen werden. Ich vermisse bloß in dem 1917 erschienenen Aufsatz die Angabe der neuesten Literatur auf diesem Gebiete. So haben sich G. Bayers Sortimentstafeln für Tanne und Fichte (1912), Dr. G. Wimmers Ertrags- und Sortimentstafeln für Buche (1914) und Flurys Sortimentstafeln von 1916 für Tanne, Fichte und Buche mit diesem Gegen- stande befassen müssen. Bayer hat das Prinzip der Formklassen direkt als Grund- lage seiner Tafel benutzt, und Flury hat durch Einführung des Durchmessers in 5 m neben dem Brusthöhendurchmesser bei seiner Einzelstammformstafel eine Form- klassenbildung ermöglicht.

Was nun aber die Formklassenbildung in Verbindung mit der Vermessung stehender Probestämme ohne Leiter überhaupt anbetrifft, so glaube ich, folgendes bemerken zu dürfen. Für genaue Untersuchungen über Vorrat und Zuwachs in Probeständen von Versuchsanstalten ist eine Vermessung stehender Probestämme mit der Leiter, wie sie z. B. die schweizerische Versuchsanstalt vornimmt, jeder Künstelei vorzuziehen und für die Praxis sind diese Formklassenmethoden meist zu kompliziert und zeitraubend, als daß sie Beachtung finden würden. Es kann nur eine Methode für die Praxis Bedeutung haben, die eine genauere Massenaufnahme als die nach Formzahlen oder Massentafeln garantiert und zugleich nicht wesentliche Mehrarbeit verursacht. Dies scheint mir möglich durch Herstellung einer Beziehung zwischen dem Brusthöhendurchmesser und dem Durchmesser in 5 oder 6 m über dem Boden. (Siehe die Arbeit von Mathson, Tabelle 4, Seite 274.) Mit Hilfe einer Stangenkluppe lassen sich leicht eine genügende Anzahl Durchmesser verschiedener Stärkeklassen in 5 oder 6 m messen, um daraus einen Reduktionsfaktor der Durchmesser in 1.3 m oder eine Formklassenbildung zu ermöglichen. Wir kommen damit überhaupt zu der Frage, ob wir nicht bei Käufen oder Verkäufen von Parzellen mit besonders wertvollem stärkeren Altholze die Stämme in 5 m Höhe kluppieren sollten, statt in Brusthöhe. Die Möglichkeit, dies zu tun, ist uns seit Flury's Sortimentstafeln gegeben, weil hier die Beziehungen zwischen dem Brusthöhendurchmesser und dem Durchmesser in 5 m hergestellt worden sind. Flury hat auch bewiesen, daß Messungen in 5 m viel genauere Resultate ergeben müßten als in 1.3 m, und wenn die nordischen Staaten ihre Hölzer in 6 m Höhe kluppieren können, so würde das uns wohl auch möglich sein.

Darin kann man Mathson unbedingt beistimmen, daß unsere gewöhnlichen Methoden der Massenaufnahme einzelner Stämme und ganzer Bestände für gewisse Zwecke viel zu ungenau sind.

Hans Burger.



## Holzhandelsbericht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Bewilligung der Redaktion gestattet.

### Im März 1918 erzielte Preise.

#### A. Stehendes Holz.

(Preise per m<sup>3</sup> Nutzholz; Aufriistung zu Lasten des Verkäufers: Einmessung ohne Rinde.)

**Freiburg, Gemeindewaldungen im II. Forstkreis, Glâne und Bevense. (Chatel-St. Denis.)**

Gemeinde Attalens. Mont Buarat und Mont Buarz. (Fuhrlohn Fr. 6) 826 m<sup>3</sup>,  $\frac{7}{10}$  Fi.  $\frac{3}{10}$  La., Mittelstamm 1,75 m<sup>3</sup>, Fr. 82,35.

Gemeinde Crêt. Wald Montborget. (Fuhr Fr. 4) 77 m<sup>3</sup>,  $\frac{6}{10}$  La.  $\frac{4}{10}$  Fi., Mittelstamm 1,6 m<sup>3</sup>, Fr. 83,50. — Gemeinde Mézières s. Romont. Les Colettes. (Fuhr Fr. 5,50) 110 m<sup>3</sup> Fi., Mittelstamm 1,11 m<sup>3</sup> Fr. 86,10.

**Tessin, Korporations- und Privatwaldungen im IV. Forstkreis, Locarno-Vallemaggia.**

(Preise und Löhne pro 100 kg Gewicht!)

**Stehend verkaufte Niederwaldungen:** Privatwaldungen im Val Dusernone. (Fuhrlohn auf Station Fr. 2) Brennholzknüppel, 2—3 m lang, Kastanie, E., Linde, Esche, Fr. 1,25 (wenn in Nähe der Straßen); Fr. 0,50 (in Lagen mit Drahtseiltransport). — Patriziato Maggia. (Aufriistung und Transport ca. Fr. 2) 30-jähr. Bu., Fr. 2.