**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

**Band:** 10 (1932)

Heft: 9

**Artikel:** Notes critiques sur quelques champignons [Fortsetzung]

Autor: Konrad, P.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-934848

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 13.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

(vulgare) braunwarziger (verrucosum). Stäublinge (Lycoperdon), Flaschen-St. (gemmatum), Birnen-St. (piriforme). Kern-keule, vielgestaltige (Xylaria polymorpha).

Es ergibt dies total 130 Arten, die sicher bestimmt wurden. Wegen Mangel an Zeit wurden nicht bestimmt: Ein zweifelhafter Schirmling, zwei Risspilzarten und fünf Schichtporlinge.

Der Besuch der Ausstellung erfüllte unsere Erwartungen. Er war am Vormittag lebhafter als am Nachmittag, was den vielen Anlässen und der guten Witterung zuzuschreiben war. Erfreut waren wir, die Herren der wissenschaftlichen Kommission auch an unserer Darbietung begrüssen zu dürfen, und wir glauben mit unserer Arbeit deren Befriedigung erreicht zu haben. Allen denen, die durch ihre Mitarbeit zum guten Gelingen beigetragen haben, spreche ich an dieser Stelle den besten Dank des Vorstandes aus. Über den Erfolg der Ausstellung kann mitgeteilt werden, dass in Langenthal viele Pilzfreunde und Interessenten vorhanden sind und dass gute Aussicht besteht, in nächster Zeit von dieser Ortschaft eine tüchtige Sektion dem Verbande anzuschliessen.

## Notes critiques sur quelques Champignons.

Par M. P. Konrad, Neuchâtel1).

Tricholoma aggregatum (Fries ex Schæffer) Costantin et ses Subsp. cartilagineum (Bull.) et cinerascens (Bull.)

Quélet.

Nous avons déjà vu (Voir Bull. Soc. myc. Fr., T. XLI, p. 40, 1925) que le groupe de *Tricholoma aggregatum* fournit le plus bel exemple de la multiplication des espèces.

Eliminons d'emblée les espèces à lamelles et à chair noircissant au toucher, dont nous nous occuperons plus loin (voir Note suivante).

Il nous reste alors un groupe de champignons, ayant tantôt les lamelles émarginées des *Tricholoma*, tantôt les lamelles décurrentes des *Clitocybe*, la chair élastique et croissant généralement en touffes cespiteuses.

Après de longues observations sur le terrain et examen de la littérature mycologique, nous sommes de plus en plus convaincu que ce groupe ne comprend qu'une seule espèce et deux sous-espèces, caractérisées toutes trois par des spores blanches globuleuses, lisses, à contenu guttulé-granuleux, mesurant 5-7  $\times$  5-6  $\mu$ .

1. — Tricholoma aggregatum (Fries ex Schæffer) Costantin.

Cette espèce-type est malheureusement très polymorphe et a ainsi donné naissance à une multitude de formes qu'il ne nous est plus possible de différencier et que nous devons considérer comme de simples synonymes.

Parmi ces synonymes de Tricholoma aggregatum, bornons-nous à citer: amplum (Fries ex Pers.), bonne planche d'aggregatum in Cooke, Illustr. Brit. Fung., 1129 [644] et in Bres. Icon. Myc.; molybdinum (Fries ex Bull.) [non Ricken = Tricholoma trigonosporum Note suivante)]; centurio (Kalch.); decastes (Fries); hortense (Fries ex Pers.); humosum (Fries); tumulosum (Fries ex Kalch.), bonnes planches d'aggregatum-type, in Cooke et in Barla, Alpes Mar., 43, fig. 1-3; cartilagineum, bonnes planches d'aggregatum-type in Bres., Fung. Trident. [non Bres., Icon. Myc., non Bull., non Quélet, etc. = Subsp. d'aggregatum]; tenuiceps (Cooke et Mass.), voir Pl. Cooke 1121 [1166], etc.

Jakob E. Lange décrit sous le nom de Clitocybe aggregata des formes sphaerospora,

<sup>1)</sup> Voir Bulletin Soc. myc. de France, Tome XLVII (1931), p. 139.

ovispora et reducta que nous ne pouvons séparer de notre Tricholoma aggregatum, espèce type.

A côté de ces nombreuses formes, qui ne sont pour nous que des synonymes de *Tricholoma aggregatum*, nous conservons deux sousespèces se distinguant du type, et cela, d'accord avec M. René Maire, le maître de la mycologie contemporaine, avec lequel nous avons eu l'occasion de parler de ce groupe.

Ces deux sous-espèces sont l'une *Tricholoma aggregatum*, Subsp. cartilagineum (Bull.), l'autre *Tricholoma cinerascens* (Bull.) Quélet.

Nous figurerons *Tricholoma aggregatum*, forme-type, dans les *Icones Selectæ Fungorum*, Pl. 247.

# 2. — Tricholoma aggregatum. Subsp. cartilagineum (Bull.).

Cette sous-espèce, très bien décrite par Quélet, est caractérisée par un chapeau brunbistre, lubrifié, brillant par le sec et chagriné au milieu. Elle est moins cespiteuse que ses voisines et croît parfois solitaire.

Ce n'est pas l'*Agaricus cartilagineus* Fries, qui paraît être une forme de *Tricholoma saponaceum*, ni le *Clitocybe cartilaginea* Bres. Fung. Trident. [non Icon. Myc.], qui est un synonyme de *Tricholoma aggregatum* type.

Tricholoma aggregatum Subsp. cartilagineum (Bull.) a pour synonymes: Gyrophila cartilaginea Quélet; Clitocybe cartilaginea Bres. « Icon. Myc.»; Agaricus loricatus Fries; Agaricus coffeatus Fries; Clitocybe coffeata Lange et Agaricus effocatellus Fries ex Viviani.

M. Pouchet signale un caractère microscopique intéressant (Voir Bull. bi-mens. « Soc. linn. Lyon », nº 19, p. 159, déc. 1928), qui, s'il se révèle constant, permettra de différencier sûrement la Subsp. cartilagineum de la forme type de *Tricholoma aggregatum*. Il s'agit de la présence à cartilagineum de filaments stériles, irrégulièrement répartis sur l'arête des lamelles, droits ou flexueux, de

formes diverses, émergeant de l'hyménium de  $10-45~\mu$  et large de  $1-1,75~\mu$ . Nous n'avons pas eu l'occasion de contrôler ce caractère.

Nous connaissons les figures suivantes de *Tricholoma aggregatum* Subsp. cartilagineum: Bresadola, « Icon. Myc.», Tab. 152, sub nom. Clitocybe cartilaginea; Tab. 150, sub nom. Clitocybe cinerascens var. coffeata; Gillet, sub nom. Tricholoma cartilagineum; Rolland, Atlas, Pl. 24, fig. 46, sub nom. Clitocybe cartilaginea (médiocre); Barla (Alpes-Mar.), Pl. 39, fig. 6-10, sub nom. Tricholoma cartilagineum et Pl. 38, fig. 1-3, sub nom. Tricholoma loricatum.

Par contre, la Pl. 90 (166) de Cooke, « Ill. Brit. Fung.», d'Agaricus cartilagineus, ne représente ni l'espèce de Bull., ni celle de Fries, mais bien une espèce du groupe de Tricholoma terreum.

## 3. — Tricholoma aggregatum, Subsp. cinerascens (Bull.) Quélet.

Cette sous-espèce, qu'il faut comprendre au sens de Bulliard et de Quélet, est un *Tricholoma aggregatum* à chapeau pâle et lamelles grises; les pieds, élastiques, sont non seulement cespiteux, mais connés ou même ramifiés, issus d'une souche commune.

Ce n'est pas l'Agaricus cinerascens Fries, qui ne correspond qu'imparfaitement à notre plante et qui, d'après Bresadola, « Fung. mang.», en est probablement une forme mineure. Ce n'est pas non plus Tricholoma cinerascens Ricken, à lamelles noircissantes, qui n'est pas autre chose que Tricholoma infumatum (voir Note suivante). Quant au Tricholoma cinerascens Gillet, il nous paraît douteux.

Notre plante est décrite par Fries sous le nom d'Agaricus fumosus, nom qu'il faut abandonner par suite de confusion possible avec *Tricholoma immundum*, (voir Note suivante), qui est l'Agaricus fumosus Persoon, sensu lato. Cooke, par exemple, figure *Tricho*-

loma aggregatum Subsp. cinerascens sous le nom d'Agaricus (Clitocybe) fumosus, Pl. 1130 [645].

Bresadola figure et décrit notre champignon sous le nom de Clitocybe conglobata dans Fung. Trident., puis de Clitocybe cinerascens dans Icon. Myc., tandis qu'il figure et décrit, dans ce dernier ouvrage, un autre Clitocybe conglobata, soit-disant différent du premier, mais qui n'en est qu'un synonyme. Tricholoma conglobatum n'existe pas comme plante distincte, mais seulement comme syno-Tricholoma aggregatum, nyme de Ricken suit comme toujours cinerascens. Bresadola, Fung. Trident., de sorte que son Tricholoma conglobatum représente notre plante — Il en est de même de Barla qui figure d'une façon très reconnaissable notre Tricholoma aggregatum Subsp. cinerascens, dans Alpes-Mar. Pl. 42, fig. 8-15, sous le nom de Tricholoma conglobatum Vitt. Jacob E. Lange décrit aussi notre plante sous le nom de Clitocybe conglobata.

Enfin Gillet, de même que Cooke, Pl. 1124 (946), figurent très bien notre champignon sous le nom de *Tricholoma pes capræ*; Rea le décrit aussi sous ce nom qu'il met en synonymie avec *Clitocybe conglobata* Bresadola, Fung. Trident. — Les descriptions de Fries, de Gillet, etc., de *Tricholoma pes capræ* ne sont pas bonnes; Quélet dit cependant, in 17° Suppl. Jura et Vosges, p. 508, qu'Ag. pes capræ Fries paraît n'être qu'une forme isolée ou cespiteuse de *Tricholoma aggregatum* var. cinerascens, apparaissant au printemps.

Enfin Cooke figure encore sous le nom d'Agaricus (Clitocybe) subdecastes Cooke et Mass., Pl. 1131 [958] et sous celui d'Agaricus (Tricholoma) duracinus Cooke, Pl. 1126 [640], des champignons qui représentent certainement notre Tricholoma aggregatum Subsp. cinerascens.

Nous figurerons *Tricholoma aggregatum*, Subsp. *cinerascens* dans les *Icones Selectæ* Fungorum, Pl. 248.

## Bericht über die Pilzkontrolle des Jahres 1931

erstattet vom Botanischen Museum der Universität Zürich.

Das Botanische Museum hatte sich für das städtische Gesundheitswesen während des Jahres 1931 an total 157 (1930: 156) Markttagen mit der Kontrolle des Pilzmarktes in den Stadthausanlagen (105) und auf dem Helvetiaplatz (52) zu befassen. Es wurden insgesamt 4944 (1930: 6092) Scheine ausgestellt für die nachstehend genannten, zum Verkauf gelangten Pilzarten:

Ader-, Eselsohr-, Kronen- und Orange-Becherling; schwärzlicher Bovist; Brätling; Butterpilz; dünnfleischiger, Feld-, gelbfleckiger, hohlstieliger, Schaf-Wald- und Zucht-Champignon; Eichhase; aschgrauer, bläulicher, gelber, rosaroter und roter Eierschwamm; Essigpilz; Halimasch; Hartpilz; Kapuzinerpilz; Keulenpilz; kahler und Samtfuss-Krämpling; gelbliche Kraterelle; Pfeffer-Milchling; Mönchsk o p f; Speise-, Spitz- und Stink-Morchel; Parasolpilz; Perlpilz; Trompeten-Pfifferling; Kamm-, Riesen-, Schaf-, Schwefel-, Semmel- und Ziegenfuss-Porling; Pflaumen-Rässling; Rehpilz; echter Reizker; echter, gepanzerter, grauer, lilastieliger, Mai-, rötlicher, Veilchenund violetter Ritterling; Anhängsel-, Elfenbein-, Gold-, Körnchen-, Kuh-, Maronen-, Rotfuss-, Rothaut-, Sand- und Schuppen-Röhrling; breitblättriger Rübling; Safran-Schirmling; grosser Schmierling; braunblättriger, Elfenbein-, fleischfarbener, Goldzahn-, Purpur- und wohlrie-