

Ultrastructure de la paroi sporale de *Heterobasidion annosum*

Autor(en): **Keller, Jean**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **51 (1973)**

Heft 7

PDF erstellt am: **17.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936999>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR PILZKUNDE BULLETIN SUISSE DE MYCOLOGIE

Offizielles Organ des Verbandes Schweizerischer Vereine für Pilzkunde und
der Vapko, Vereinigung der amtlichen Pilzkontrollorgane in der Schweiz
Organe officiel de l'Union des sociétés suisses de mycologie et de la Vapko,
association des organes officiels de contrôle des champignons de la Suisse

Redaktion: Adolf Nyffenegger, Muristrasse 5, 3123 Belp, Tel. 031 81 11 51. Druck und Verlag: Druckerei Benteli AG, 3018 Bern,
Telephon 031 55 44 33, Postcheck 30-321. Abonnementspreise: Schweiz Fr. 19.-, Ausland Fr. 21.-, Einzelnummer Fr. 1.90.
Für Vereinsmitglieder im Beitrag inbegriffen. Insertionspreise: 1 Seite Fr. 200.-, 1/2 Seite Fr. 110.-, 1/4 Seite Fr. 60.-.
Adressänderungen: melden Vereinsvorstände bis zum 2. des Monats an Ernst Mosimann, Schlossstalden 16, 3076 Worb.
Nachdruck, auch auszugsweise, ohne ausdrückliche Bewilligung der Redaktion verboten.

51. Jahrgang – 3018 Bern, 15. Juli 1973 – Heft 7

SONDERNUMMER 86

Ultrastructure de la paroi sporale de *Heterobasidion annosum*

Par Jean Keller, Neuchâtel

En regardant attentivement les spores de *H.annosum* dans le réactif de Melzer, nous avons eu l'impression que ces dernières étaient pourvues d'une surface bosselée, bien qu'elles soient toujours qualifiées de lisses dans la littérature. Comme l'observation normale ne permet pas un examen sûr, nous avons utilisé le microscope électronique pour vérifier notre hypothèse.

Nous avons observé les spores de nombreux échantillons de *H.annosum* récoltés dans la région de Neuchâtel surtout; certains, cependant, proviennent de divers endroits de la Suisse romande. (Collection n° 1334, 1369 et 1557, Fungarium de l'Université de Neuchâtel; seules les collections, dont les spores ont été examinées au microscope électronique, sont mentionnées.)

Les spores ont été fixées au KMnO_4 à 1 % dans une solution tampon, à la température ambiante. Nous les avons incluses dans l'épon, puis coupées et contrastées à l'acétate d'uranyle et au citrate de plomb.

La paroi sporique de *H.annosum* comprend cinq couches, qui, de l'intérieur à l'extérieur, sont (nous adoptons ici la nouvelle terminologie créée par Cléménçon, 1970): un corium mince (0,025 μm), clair car peu opaque aux électrons, forme l'enveloppe interne. Il est entouré par une coriotunica (0,15 μm), dont l'aspect granuleux, parfois lamelleux, est dû aux dépôts de tunica, substance apparaissant noire sur les photographies. Nous voyons ensuite une couche blanche, très mince, dont la signification nous échappe encore. Nous ne savons pas si elle fait partie de





Fig. 1 et 2. Coupes transversales de la paroi sporale de *H. annosum*, x 166 000 et x 50 000. – La fig. 1 met bien en évidence les 5 couches: a) corium, b) coriotunica, c) «ligne c», d) tunica, e) sporothecium. La fig. 2 montre surtout la mince «ligne c», blanche et régulière.

la coriotunica, ou s'il s'agit d'une couche à part; dans ce cas, nous serions tenté de l'assimiler à une «ligne c», terme utilisé pour désigner une couche analogue chez *Bondarzewia montana* par Burge (1966). Puis une tunica foncée (0,025 μm), englobe la spore; ses nombreux épaisissements forment des papilles coniques hautes de 0,15 μm qui donnent à la spore son ornementation caractéristique (Fig. 1, 2 et 3). Les débris floconneux du sporothecium garnissent par places le pourtour de la basidiospore.




Fig. 3. Coupe transversale de la paroi sporale de *H. annosum*, x 32 000.

Relevons encore que la spore de *H. annosum* est cyanophile; la couche sensible au bleu coton n'est autre que la tunica puisqu'elle comprend les papilles.

Remerciements. Nous remercions très sincèrement M. le professeur H. Cléménçon de l'intérêt, des conseils et des critiques qu'il manifeste à l'égard de notre travail ainsi que M. le professeur Ch. Terrier de ses nombreux encouragements et de son soutien financier.

Zusammenfassung

Die Sporen von *H. annosum*, die bisher als glattwandig bezeichnet wurden, sind mit konischen Warzen versehen. Sie wurden mit Hilfe des Lichtmikroskops entdeckt (Melzers Reagens) und mit dem Elektronenmikroskop nachgeprüft.

Bibliographie

Cléménçon, H. (1970): Bau der Wände der Basidiosporen und ein Vorschlag zur Benennung ihrer Schichten. *Zeitschr. Pilzkunde* 36, 113–133.

Burge, H. (1966): Inédit, thèse University, Michigan Ph. D., Botany.