

Leccinum quercinum (Pil.) Pil., Eichen-Rauhfuß = Bolet rude des chênes = Porcinello delle quercie

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **61 (1983)**

Heft 8

PDF erstellt am: **18.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936756>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Leccinum quercinum (Pil.) Pil., Eichen-Rauhfuß

- Hut:** 6–15 cm, ziegelrotbraun bis dattelbraun, fein faserig schuppig, alt glatt und mehr rostfarben, Rand überlappend, bei Druck weinbraun färbend.
- Röhren:** Schmutzig weiss, dann lederbraun bis dunkelbraun, um den Stiel stark ausgebuchtet.
- Poren:** Klein, jung weiss, dann lederbraun.
- Stiel:** Wollig-schuppig-flockig, Schuppen jung weiss, dann leder- bis rostbraun färbend.
- Fleisch:** Weiss bis crème, im Hut bald weinrosa, im Stiel mehr weinrötlich färbend. Geruch und Geschmack angenehm.
- Sporenpulver:** Gelbbraun, schnupftabakbraun. Sporen 12–16/4–5 µm, ellipsoid-spindelrig.
- Standort:** Unter Eichen, Mykorrhizapilz. Selten unter Buche oder Linde.
- Bemerkung:** Im Wert wie die Rotkappen, jedoch durch die kastanienbraune Hutfarbe und den Standort unter Eichen von den übrigen Rotkappen gut zu unterscheiden.
Die nebenstehende Farbtafel ist zu blass gedruckt! B. Kobler

Leccinum quercinum (Pil.) Pil., Bolet rude des chênes

- Chapeau:** 6–15 cm brun rouge brique à brun de datte, finement méchuleux fibrilleux, devenant lisse et davantage brun rouille avec l'âge, marge excédante, se colorant de brun vineux à la pression.
- Tubes:** Blanc sale puis brun cuir à brun foncé, largement échanrés autour du stipe.
- Pores:** Petits, d'abord blancs puis brun cuir.
- Stipe:** Laineux à méchuleux à floconneux; les mèches sont d'abord blanches puis se colorent de brun cuir à brun rouille.
- Chair:** Blanche à crème, se colorant vite de rose vineux dans le chapeau et de rougeâtre vineux plus intense dans le stipe. Odeur et saveur agréables.
- Sporée:** Brun jaune à brun tabac.
- Spores:** 12–16×4–5 µm, ellipsoïdes à fusiformes.
- Habitat:** Sous les chênes, rarement aussi sous hêtre ou tilleul. Espèce mycorrhizique.
- Remarque:** De qualité équivalente au Bolet orangé. Bien reconnaissable à sa cuticule brun châtaigne et à son habitat, qui le différencient des autres Bolets rudes voisins.
La planche ci-contre est sortie trop pâle au tirage! (Trad.: F. Brunelli)

Leccinum quercinum (Pil.) Pil., Porcinello delle quercie

- Cappello:** Da 6 a 15 cm, da bruno rosso mattone a bruno dattero, finemente fibrilloso squamoso, vecchio liscio e più sul ruggine, cuticola eccedente all'orlo, se premuto si colora di bruno vino.
- Tubuli:** Dapprima bianco sporco, poi da bruno cuoio a bruno scuro, fortemente smarginati al gambo.
- Pori:** Piccoli, da giovani bianchi, in seguito bruno cuoio.
- Gambo:** Lanoso-squamoso-fiocoso, squame bianche nei giovani, in seguito da bruno cuoio a bruno ruggine.
- Carne:** Da bianca a crema, nel cappello diventa rapidamente rosa vino, nel gambo si colora più sul rossiccio vino. Odore e sapore gradevoli.
- Polvere sporica:** Giallo bruno, bruno tabacco da fiuto. Spore 12–16/4–5 µm, ellissoidi-fusiforimi.
- Habitat:** Sotto quercie. Fungo micorrizico. Raramente sotto faggi o tigli.
- Osservazione:** Valore come il porcinello rosso, facile da distinguere per il colore bruno castano del cappello e l'habitat sotto quercie.
La presente tavola a colori lo riproduce a colori troppo pallidi. (Trad.: E. Zenone)



Leccinum quercinum (Pil.) Pil., Eichen-Rauhfuß
Foto: F. Patanè, Urdorf