

**Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühn.,  
Gelbstieliger Zwergknäueling : Syn. Pleurotus  
seotinus Schrader = Hohenbuehelia serotina  
(Schrad. ex Fr.) Sing. 1945 = Panellus serotinus  
(Pers. ex Fr.) Kühner [= Pleurotus serotinus  
Schrader = Hohenbuehelia sero...**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de  
mycologie**

Band (Jahr): **63 (1985)**

Heft 1

PDF erstellt am: **29.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936854>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

#### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühn., Gelbstieliger Zwergknäueling**  
Syn. *Pleurotus serotinus* Schrader = *Hohenbuehelia serotina* (Schrader ex Fr.)  
Sing. 1945

- Hut:* Olivgrün bis gelbgrün, alt olivbräunlich auf ockerlichem Untergrund, gegen den Stiel samtig-filzig, muschelförmig. Jung etwas klebrig.
- Lamellen:* Gelblich bis blassocker, alt bräunlich, gedrängt, angewachsen bis leicht herablaufend.
- Stiel:* Lateral, kurz, dick, goldgelb bis orangeocker, durch bräunliche Schüppchen fein punktiert.
- Fleisch:* Weisslich, mit gelatinöser Schicht im Hut, geruch- und geschmacklos.
- Sporen:* 4,5—5,5×1,5—2 µm, hyalin, zylindrisch und leicht gekrümmt.
- Standort:* An Laubholzstrünken und an am Boden liegenden dicken Ästen. Seltener auch an Nadelholz, einzeln oder reihig wachsend. September bis in den Winter hinein.
- Bemerkung:* Der schön gelbe Stiel und der an Algenbewuchs erinnernde olivgrüne Hut machen diese Art unverwechselbar. B. Kobler

**Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühner [=Pleurotus serotinus Schrader = Hohenbuehelia serotina (Schrader ex Fr.) Sing. 1945], Pleurote tardif**

- Chapeau:* vert olive à vert jaune, brun olivâtre sur fond ochracé dans la vieillesse, soyeux-feutré au voisinage du pied, en forme de conque. Un peu visqueux dans la jeunesse.
- Lames:* jaunâtres à ochracé pâle, brunâtres avec l'âge, serrées, adnées à un peu décurrentes.
- Pied:* latéral, court, épais, jaune doré à orange ochracé, finement ponctué de méchules brunâtres.
- Chair:* blanchâtre, insipide, inodore, comportant dans le chapeau une couche gélatineuse.
- Spores:* 4,5—5,5×1,5—2 µm, hyalines, cylindriques et un peu arquées.
- Habitat:* sur souches de feuillus et sur grosses branches tombées. Plus rarement sur bois de conifères. Solitaire ou par rangées. De septembre jusqu'en plein hiver.
- Remarque:* cette espèce est facile à reconnaître à son pied d'un beau jaune et à son chapeau dont la couleur vert olive peut faire penser qu'il est envahi par des algues. C'est de plus une espèce hivernale. (Trad.: F. Brunelli)

**Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühn. Syn. Pleurotus serotinus Schrader = Hohenbuehelia serotina (Schrader ex Fr.) Sing. 1945**

- Cappello:* da oliva verde a giallo verde, vecchio oliva brunastro su sfondo ocraceo, verso il gambo vellutato-feltrato, conchiforme. Giovane un poco glutinoso.
- Lamelle:* da giallognole a ocraceo pallido, vecchie brunastre, fitte, da adnate a leggermente decorrenti.
- Gambo:* laterale, corto, grosso, da giallo oro a ocraceo arancio, finemente punteggiato da squamette brunastre.
- Carne:* biancastra, nel cappello con uno strato gelatinoso, senza odore e senza sapore.
- Spore:* 4,5—5,5×1,5—2 µm, ialine, cilindriche e leggermente ricurve.
- Habitat:* su ceppaie di latifoglie e su grossi rami giacenti al suolo. Raramente anche su legno di conifera, cresce sia isolato sia in file. Da settembre fino a inverno inoltrato.
- Osservazione:* inconfondibile a causa del suo bel gambo giallo e dal cappello oliva verde che ricorda una vegetazione di alghe. (Trad.: E. Zenone)



*Pleurotus serotinus* Schrader = *Panellus serotinus* (Pers. ex Fr.) Kühn.  
(Aquarelle de Charles Poluzzi)