

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Band: 64 (1986)
Heft: 1

Artikel: Cystoderma fallax Smith & Sing. : Häutigberingter Körnchenschirmling :
Fam. Agaricaceae = Cystoderma fallax Smith & Sing., Cystoderme
trompeur : Fam.: Agaricaceae

Autor: Kobler, B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936911>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Cystoderma fallax Smith & Sing. **Häutigberingter Körnenschirmling**

Fam. Agaricaceae

- Hut:** 3–5 cm, rostocker bis ockerbraun, deutlich körnig-kleiig, Rand vom Velum behangen, stumpf gebuckelt.
- Lamellen:** Kurz angewachsen, weiss mit fleischrosa Farbton, gedrängt.
- Stiel:** Mehr oder weniger zylindrisch, dem Hut gleichfarben, körnig-kleiig; über dem dauerhaften, kräftigen, aufsteigenden Ring weisslich.
- Fleisch:** Weisslich, im Stiel gelbbraun bis rötlichocker.
- Sporenstaub:** Weiss; Sporen 3,7–5×3–4 µm, oval bis fast kugelig, deutlich amyloid.
- Standort:** In Nadelwäldern, vorzugsweise im Gebirge.
- Bemerkung:** Diese Art ist dem Amiant-Körnenschirmling (*Cystoderma amiantinum* [Scop. ex Fr.] Fay.) sehr ähnlich, welcher aber nur eine flockige Ringzone und weissliche Lamellen ohne rosa Reflex besitzt.

B. Kobler

Cystoderma fallax Smith & Sing., **Cystoderme trompeur** Fam.: Agaricaceae


- Chapeau:** 3 à 5 cm de diamètre, ocre rouille à brun ocre, nettement grenu-furfuré, obtusément mamelonné; marge appendiculée.
- Lames:** Brièvement adnées, blanches, lavées de rose carné, serrées.
- Pied:** Plus ou moins cylindrique, grenu-furfuré; concolore au chapeau; blanchâtre au-dessus d'un anneau important, persistant et ascendant.
- Chair:** Blanchâtre, sauf dans le pied où elle est brun jaune à ocre rougeâtre.
- Sporée:** Blanche.
- Spores:** 3,7–5×3–4 µm, ovales à presque sphériques, nettement amyloïdes.
- Habitat:** Dans les bois de conifères, surtout en montagne.
- Remarque:** Cette espèce ressemble beaucoup au Cystoderme amiantacé (*Cystoderma amiantinum* [Scop.: Fr.] Fayod); celle-ci ne présente cependant qu'une zone annulaire floconneuse et ses lames sont blanchâtres et dépourvues de reflet rosé.

(Trad.: F. Brunelli)

Cystoderma fallax Smith & Sing. Fam. Agaricaceae

- Cappello:** 3–5 cm, da oca ruggine a oca bruno, forforaceo-granuloso, margine decorato da resti del velo, umbone ottuso.
- Lamelle:** Brevemente adnate, bianche con riflessi rosa carne e fitte.
- Gambo:** Più o meno cilindrico, concolore al cappello, forforaceo-granuloso, biancastro sopra l'anello ascendente, che è robusto e persistente.
- Carne:** Biancastra, nel gambo da giallo bruna a rossiccio oca.
- Sporata:** Bianca, spore 3,7–5×3–4 µm, da ovali a quasi globose, chiaramente amiloidi.
- Habitat:** In boschi di conifere, in prevalenza in zone montane.
- Osservazione:** Questa specie è molto simile al *Cystoderma amiantinum* [Scop. ex Fr.] Fay., il quale però ha soltanto una zona anulare fioccosa e lamelle bianche senza riflessi rosa.

(Trad. E. Zenone)



Cystoderma fallax (Smith & Sing).

Aquarelle de Charles Poluzzi