

**Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quéél.) : Weissausgezackter Träuschling, Fam. Strophariaceae = Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quéél.) : Pholiote frangée de blanc, Fam.: Strophariaceae**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **64 (1986)**

Heft 4

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936932>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

#### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quél.)**  
**Weissausgezackter Träuschling, Fam. Strophariaceae**

- Hut:** Rotbraun, kastanienbraun bis schwarzbraun, oft vom Scheitel her dunkler geflammt, ø 5–10 (15) cm, jung halbkugelig, dann glockig ausflachend mit stumpfem Buckel, von dreieckigen, flockigen, braungelben und flüchtigen Schuppen bekleidet. Feucht schleimig, trocken glänzend. Rand lange eingerollt und stark ausgefranst behangen.
- Lamellen:** Grauviolett, bauchig, fast gedrängt, Schneide weisslich gezähnt, jung mit milchweissen, öligen Tröpfchen versehen, angeheftet und mit Zahn herablaufend.
- Stiel:** Flockig, sparrig-schuppig, mit fast ringartiger Abgrenzung an der Spitze. Alt mehr oder weniger auskahlend. Basis leicht verdickt.
- Fleisch:** Weiss, weich, Geschmack sehr bitter.
- Sporenstaub:** Umbrabraun. Sporen: mandelförmig, mit beidseitig zugespitzten Enden. 11–13×5,8 µm.
- Standort:** August bis November besonders an Schwarzpappeln (*Populus nigra*), seltener an Fichten (*Picea excelsa*) oder Tannen (*Abies alba*). Wahrscheinlich ist diese Art ein Schwächeparasit.
- Bemerkung:** Dieser seltene Pilz ist unbedingt zu schonen. Da sehr bitter, ist diese Art ungeniessbar.

B. Kobler

**Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quél.)**  
**Pholiote frangée de blanc, Fam.: Strophariaceae**

- Chapeau:** Brun rouge, brun châtain à brun noir souvent flammé de plus sombre à partir du disque, diamètre 5–10 (15) cm, hémisphérique dans la jeunesse, devenant plus étalé campanuliforme avec un mamelon obtus, décoré d'écailles triangulaires, floconneuses, jaune brun et fugaces. Visqueux par temps humide, brillant par le sec. Marge longtemps enroulée, fortement appendiculée frangée.
- Lames:** Gris violet, ventruées, assez serrées, arête blanchâtre denticulée laissant suinter dans le jeune âge des gouttelettes huileuses d'un blanc laiteux, adnées uncinées.
- Pied:** Floconneux, hérissé d'écailles redressées dont la limite en haut est presque annuliforme. Avec l'âge, ces écailles disparaissent plus ou moins. Base légèrement épaissie.
- Chair:** Blanche, tendre, très amère.
- Sporée:** Bistre foncé.
- Spores:** Amygdaliformes, apointies aux deux extrémités. 11–13×5,8 µm.
- Habitat:** D'août à novembre, surtout sur *Populus nigra* (Peuplier noir), plus rarement sur *Picea excelsa* (Épicéa) ou *Abies alba* (Sapin blanc). Cette espèce est probablement un parasite de faiblesse.
- Remarque:** Cette espèce, rare, est à protéger absolument. Elle est inconsommable en raison de son amertume.  
(trad.: F. Brunelli)

**Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quél.)**  
**Fam. Strophariaceae**

- Cappello:** Da bruno castano a bruno nero, rosso bruno, sovente mazzato di scuro a cominciare dal disco, ø 5–10 (15) cm, giovane semisferico poi a campana appianata con umbone ottuso e ricoperto da verruche triangolari, fiocose, fugaci e di colore giallo bruno. Mucoso se umido e brillante se asciutto. Orlo a lungo involuto e molto fimbriato.
- Lamelle:** Grigio viola, ventricose, quasi fitte con taglio denticolato di bianco, giovani provviste die goccioline oleose lattee, attingenti e decorrenti con dentino.
- Gambo:** Fiocoso, squaroso, verso l'alto con una zona pseudoanulare. In vecchiaia calcifica un poco. Base leggermente ingrossata.
- Carne:** Bianca, molle e molto amara.
- Sporata:** Bruno scuro. Spore a mandorla con ambedue le estremità acute. 11–13×5,8 µm.
- Habitat:** Da agosto a novembre su pioppo nero (*Populus nigra*), raramente su peccio (*Picea excelsa*) o su abete bianco (*Abies alba*). Probabilmente questa specie è un debole parassita.
- Osservazioni:** Questa rara specie è assolutamente da proteggere. Essendo molto amara, non è nemmeno commestibile.  
(Trad.: E. Zenone)



*Stropharia albocrenulata* (Peck) Kreisel.

Aquarelle de Charles Poluzzi