

**Russula cessans Pearson, Kiefern-
Weichtäubling, Sektion: Tenellae, Untersektion:
Laricinae = Russula cessans Pearson, Russule
tardive, sct Tenellae, sous-sct. Laricinae =
Russula cessans Pearson, sezione Tenellae,
sottosezione Laricinae**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **64 (1986)**

Heft 5/6

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936940>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Russula cessans Pearson, Kiefern-Weichtäubling, Sektion: Tenellae, Untersektion: Laricinae

- Hut:** Ausgebreitet, breit niedergedrückt, 2,5–6 (7) cm; mit unbestimmten Farbtönen: über weinbraun, kupferrotbraun bis schmutzig lila, selten Anklang zu olivlichen Tönen, Mitte meist dunkler. Rand abgerundet, grob höckerig gerieft. Huthaut gut ablösbar, matt.
- Lamellen:** Mässig entfernt, wenig gegabelt, leicht bauchig und ausgebuchtet angewachsen.
- Stiel:** Gebrechlich, Basis meist leicht verdickt, oft gegen die Spitze erweitert, alt markig-hohl werdend, weiss, Oberfläche unregelmässig rinnig, mit deutlicher Tendenz zu grauen.
- Fleisch:** Ziemlich brüchig, bei übermässiger Feuchtigkeit Tendenz zu grauen, seltener stellenweise gilbend. Geruchlos und mild. Starke Guaiak-Reaktion.
- Sporenstaub:** Gelb. Sporen 7,5–10/6,5–8 µm. Stumpfwarzig mit deutlichen netzartigen Vergratungen.
- Standort:** Im Nadelwald, besonders bei *Pinus silvestris* auf Silikatböden oder kalkfreien Sandböden, seltener auch auf Moorböden. In Berg- sowie in Tallagen. September–November.
- Bemerkungen:** Diese Art steht *Russula nauseosa* (Pers. ex Secr.) Fr. sehr nahe und kann mit ihr verwechselt werden. *R. nauseosa* besitzt aber isoliertstachelige Sporen, tendiert im Fleisch mehr zum Gilben, weist öfter grünliche Farbtöne auf und ist vor allem im Gebirgsfichtenwald zu finden. B. Kobler

Russula cessans Pearson, Russule tardive, sct Tenellae, sous-sct. Laricinae

- Chapeau:** Etalé, largement déprimé, 2,5–6 (7) cm; colorations indistinctes: de brun vineux à brun rouge cuiré à lilas sale, rarement tendance à des tonalités olivâtres, disque habituellement plus sombre. Marge arrondie grossièrement striée-cannelée. Cuticule facilement séparable, mate.
- Lames:** Assez espacées, peu fourchues, un peu ventruées, adnées échancrées.
- Pied:** Fragile, la plupart du temps un peu épaissi à la base, souvent évasé en haut, devenant médulleux à creux avec l'âge, blanc; en surface, il est irrégulièrement sillonné, avec une nette tendance au grisonnement.
- Chair:** Assez fragile, elle tend à grisonner par excès d'humidité et plus rarement elle jaunit par places. Inodore et insipide. Réaction fortement positive au gaïac.
- Sporée:** Jaune moyen.
- Spores:** 7,5–10×6,5–8 µm; verrues obtuses avec d'évidentes crêtes ébauchant un réseau.
- Habitat:** Sous conifères, en particulier sous *Pinus silvestris* sur sol siliceux ou sur sol sablonneux mais non calcaire, plus rarement aussi sur sol marécageux. De septembre à novembre, en montagne comme en plaine.
- Remarques:** Cette espèce est très voisine de *Russula nauseosa* (Pers.:Secr.) Fr. et une confusion est possible. Cependant, *R. nauseosa* possède des spores à verrues isolées et pointues, sa chair tend plus nettement à jaunir; de plus, elle montre plus fréquemment des tonalités verdâtres et est avant tout une espèce des pinèdes de montagne. Elle fructifie aussi plus tôt dans l'année. (trad.: F. Brunelli)

Russula cessans Pearson, Sezione: Tenellae, Sottosezione: Laricinae

- Cappello:** Espanso, largamente depresso, 2,5–6 (7) cm, a colori indefinibili: da bruno vinoso a bruno rosso rame fino a lilla sporco, raramente con tendenza a toni olivastri, al centro in prevalenza più scuro. Margine arrotondato, con striature grossolanamente gibbose. La cuticola è opaca e si separa bene.
- Lamelle:** Moderatamente distanti, poco forcate, leggermente ventricose e adnate smarginate.
- Gambo:** Fragile, per lo più ingrossato alla base e sovente allargato verso l'apice, vecchio diventa midolloso-vuoto, bianco, superficie irregolarmente rugulosa, con chiara tendenza a diventare grigio.
- Carne:** Abbastanza fragile, con eccesso di umidità tendenza a diventare grigia, raramente ingiallisce a zone. Senza odore e mite. Intensa reazione al guaiaco.
- Sporata:** Gialla. Spore 7,5–10/6,5–8 µm. Con verruche ottuse e chiaramente disposte a reticolo.
- Habitat:** In boschi di conifere, specialmente con *Pinus silvestris* su terreno siliceo o su terreno sabbioso privo di calcare, raramente anche in terreni paludosi. Cresce sia in montagna sia nei fondovalle. Da settembre a novembre.
- Osservazioni:** Questa specie è molto vicina a *Russula nauseosa* (Pers. ex Secr.) Fr., e può essere confusa con essa. *R. nauseosa* ha però spore con aculei isolati, la carne ha maggior tendenza a ingiallire, spesso mostra toni verdastri, e cresce soprattutto in boschi montani di peccio. (Trad.: E. Zenone)

Foto: Otto Hotz, Zürich

