

Entoloma sericatum (Britz) Sacc. : Seidiger Moor-Rötling

Autor(en): **Monthoux, Olivier**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **64 (1986)**

Heft 11

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936968>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Entoloma sericatum (Britz.) Sacc.

- Chapeau:** atteignant 6 cm, campanulé-convexe puis plan convexe, parfois submamelonné, peu charnu, fragile, glabre, non visqueux, hygrophane, strié-pellucide jusqu'au $\frac{1}{3}$ ou à la $\frac{1}{2}$ du rayon, mais pas très distinctement, de couleur variable, soit bistre, surtout chez les jeunes, soit gris-beige, pâlisant par le sec, beige pâle, un peu satiné, à marge très mince et un peu débordante, d'abord enroulée.
- Lamelles:** assez serrées (30 à 45, 7 ou plus rarement 3 lamellules), peu épaisses, atteignant 6 mm de large, à arête un peu sinuée, adnées ou légèrement décurrentes par une dent, à faces non ou à peine ridulées, d'abord blanches ou blanchâtres, puis rose-incarnat brunâtre.
- Pied:** atteignant 9 cm de long, ordinairement 5–8 mm de large, exceptionnellement 10, un peu épaissi vers le bas, creux, fragile, fibreux, fissile, glabre, un peu satiné mais non recouvert d'un fibrillum propre, légèrement pruineux-squamuleux en haut, aranéeux à la base, de couleur variable, bistre plus pâle que le chapeau jusqu'à blanc, parfois en partie coloré et en partie blanc.
- Chair:** blanche, mais souvent brune sous la cuticule du chapeau et parfois gris-bistre dans le pied, à odeur et saveur nettes de farine ce qui le distingue de l'*Entoloma nidorosum* qui se trouve aussi dans les tourbières.
- Spores:** roses, 7,5–10/6–8 μm , en moyenne 8,6/7,2 μm . *Basides* tétrasporiques.
- Ecologie:** dans les haut-marais, mais pas uniquement.
- Matériel:** dessins au trait: h, b, s, ca, pi: Chenalotte, 15 sept. 1935; i: Voiron, 23 sept. 1934; planche en couleurs: Chenalotte, 27 août 1934.

(Texte et dessins préparés sur la base de la publication (Bull. Soc. Mycol. France 53: 275–277.1937) et des notes manuscrites de Jules Favre par Olivier Monthoux.)

Entoloma sericatum (Britz.) Sacc. *Seidiger Moor-Rötling*

- Hut:** 6 cm erreichend, glockig-gewölbt, dann flachgewölbt, manchmal schwach gebückt, wenig fleischig, gebrechlich, kahl, nicht schmierig, hygrophan, durchscheinend gerieft bis $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{2}$ des Hutradius, aber nicht sehr markant, von veränderlicher Farbe, entweder dunkelbraun, vor allem bei jungen Exemplaren, oder graubeige ausbleichend wenn trocken, fahl beige, ein wenig seidig, mit sehr dünnem Rand, leicht überlappend, zuerst eingerollt.
- Lamellen:** Ziemlich gedrängt (30–45, 7 oder seltener 3 Lamelletten), wenig dicklich, 6 mm in der Breite erreichend mit etwas buchtiger Schneide, angewachsen oder leicht mit Zahn herablaufend. Lamellenfläche nicht oder kaum runzelig, zuerst weiss oder weisslich, dann rosa-fleischfarben bräunlich.
- Stiel:** 9 cm Länge erreichend, gewöhnlich 5–8 mm breit, ausnahmsweise 10 mm, gegen die Basis ein wenig verdickt, hohl, gebrechlich, faserig, zerspaltend, kahl, ein wenig seidig, aber nicht mit einer eigentlichen Faserung bekleidet, an der Stielspitze leicht feinschuppig bereift, spinnwebig an der Basis, von veränderlicher Farbe, dunkelbraun bis weiss, heller als der Hut, manchmal stellenweise gefärbt, stellenweise weiss.
- Fleisch:** Weiss, doch oft braun unter der Huthaut und manchmal grau-dunkelbraun im Stiel, mit reinem Geruch und Geschmack nach Mehl, was diese Art von *Entoloma nidorosum* unterscheidet, welche auch in Mooren vorkommt.
- Sporen:** rosa, 7,5–10×6–8 μm , im Mittel 8,6–7,2 μm .
- Basidien:** viersporig.
- Ökologie:** in Hochmooren, aber nicht nur in diesem Biotop.



Entoloma sericatum (Britz.) Sacc.

(Aquarelle de Jeanne Favre)

Material: Strichzeichnungen: h,b,s, ca, pi: Chenalotte, 15. Sept. 1935, i: Voirons, 23. Sept. 1934.
Farbtafel: Chenalotte, 27. August 1934.

(Text und Zeichnungen angefertigt auf Basis der Veröffentlichung (Bull. Soc. Mycol. France 53: 275—277, 1937) und nach den Manuskript-Notizen von Jules Favre durch Olivier Monthoux.) (Übers.: B. Kobler)

Entoloma sericatum (Britz.) Sacc.

- Cappello:* fino a 6 cm, campanulato convesso poi piano convesso, talvolta subumbonato, poco carnoso, fragile, glabro, non viscoso, igrofano, striato-translucido fino a $\frac{1}{3}$ o a $\frac{1}{2}$ del raggio, ma non in modo molto distinto, colore variabile, sia bruno scuro, specialmente nei giovani esemplari, sia grigio-bruno chiaro, che sbiadisce a tempo secco, bruno chiaro pallido, un poco satinato, margine molto sottile e un poco sporgente, all'inizio involuto.
- Lamelle:* abbastanza fitte (30 a 45, con 7 o più raramente 3 lamellule), poco spesse, larghe fino a 6 mm, filo un poco sinuato, adnate o leggermente decorrenti con dentino, la faccia delle lamelle non o appena rugulosa, dapprima bianche o biancastre, poi rosa incarnate brunastre.
- Gambo:* lungo fino a 9 cm, in generale diametro 5—8 eccezionalmente 10 mm, un poco ispessito verso la base, cavo, fragile, fibroso, fissile, glabro, un poco satinato ma non ricoperto da vere fibrille, leggermente pruinoso squamuloso in alto, araneoso alla base, colore variabile, da bruno chiaro più pallido del cappello fino a bianco, talvolta in parte colorato e in parte bianco.
- Carne:* bianca, ma sovente bruna sotto la cuticola del cappello, talvolta grigio-bruno chiaro nel gambo, odore e sapore tipici di farina, e ciò lo distingue dall'*Entoloma nidorosum*, che cresce pure nelle torbiere.
- Spore:* rosa, 7,5—10/6—8 μm , in media 8,6/7,2 μm . Basidi tetrasporici.
- Ecologia:* nelle torbiere, ma non in modo esclusivo.
- Raccolte:* disegno al tratto: h, b, s, ca, pi: henalotte, 15 sett. 1935; i: Voirons, 23 sett. 1934; tavola a colori: Chenalotte, 27.8.1934.

(Testi e disegni preparati da Olivier Monthoux in base alla pubblicazione (Bull. Soc. Mycol. France 53: 275—277, 1937) e le note manoscritte di Jules Favre) (Trad.: E. Zenone)




Der Botanische Garten der Universität Zürich sucht einen

Pilzkontrolleur

(wenn möglich mit amtlichem Ausweis), welcher zusätzlich Arbeit im Institut für systematische Botanik und im Botanischen Garten zu übernehmen hätte.

Die Besoldung richtet sich nach kantonalem Reglement. Schriftliche Bewerbung mit Zeugnisabschriften senden Sie bitte an die Direktion des Botanischen Gartens der Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich.



Entoloma sericatum: Carpophores (grandeur nature): i: Voiron, 23 sept. 1934; h: Chenalotte, 15 sept. 1935; b: baside; s: spores; ca: caulocystides; pi: éléments du revêtement du chapeau; (b, s, ca, pi: Chenalotte, $\times 1000$). (Dessins de Jules Favre reproduits par Suzanne van Hove.)

Entoloma sericatum: Fruchtkörper in natürlicher Grösse: i: Voiron, 23. Sept. 1934; h: Chenalotte, 15. Sept. 1935; b: Basidie; s: Sporen; ca: Caulocystiden; pi: Hyphen der Hutbekleidung. (b, s, ca, pi: Chenalotte, $\times 1000$). (Zeichnungen nach Jules Favres Vorlagen und angefertigt von Suzanne van Hove.)

Entoloma sericatum: carpoforo (grandezza naturale): i: Voiron, 23.9.1934; h: Chenalotte, 15.9.1935; b: basidi; s: spore; ca: caulocistidi; pi: elementi del rivestimento del cappello; (b, s, ca, pi: Chenalotte, $\times 1000$). (Disegni di Jules Favre riprodotti da Suzanne van Hove.)