

# **Heboloma magnimamma (Fr.) Quélet et Hebeloma alpinum (J. Favre) Bruchet (= H. crustuliniforme var. alpinum J. Favre)**

Autor(en): **Monthoux, Olivier**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **65 (1987)**

Heft 5-6

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936528>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

En lui j'ai toujours salué la grande disponibilité, la courtoisie qu'il pratique à l'égard du petit comme du grand. Quand il vous parle il ne vous donne jamais la désagréable impression qu'il se moque de vous. Je remercie Jean, au nom de la CS, comme en mon propre nom, pour le culte qu'il voue aux valeurs humanistes. Je le remercie pour tout ce qu'il nous a donné et nous donnera encore. Cher ami Jean, à toi un chaleureux merci."

X. Moirandat

## **Hebeloma magnimamma (Fr.) Quélet**

<i>Chapeau:</i>	mesurant jusqu'à 24 mm de diamètre, à très gros mamelon saillant, à chair très épaisse sous celui-ci et très mince au bord, non hygrophane, non visqueux, glabre à part de rares restes de voile aranéous très fin à la marge, beige café au lait.
<i>Lamelles:</i>	minces, larges, jusqu'à 5,5 mm, arrondies au pied, subaiguës ou obtuses à leur extrémité distale, à peine ridulées sur leurs faces, à arête floconneuse, un peu serrées (26—32; 1 = 1 ou 3), argilacées ocracées, puis ocracé ferrugineux.
<i>Pied:</i>	subflexueux ou courbé, s'élargissant légèrement vers le bas, fistuleux, fibrilleux, mais floconneux au sommet, blanchâtre en haut, beige brunâtre inférieurement.
<i>Chair:</i>	blanchâtre ou beige très pâle dans le chapeau et le haut du pied, brun un peu foncé plus bas, mais non brun ferrugineux cependant, inodore, amarescente.
<i>Microscopie:</i>	<i>Spores</i> ocre assez pâle, amygdaloïdes, finement verruqueuses, 9 à 12×5—7 µm. Basides tétrasporiques, 27—39×7,5 µm. <i>Poils d'arête des lamelles</i> claviformes à pédoncule assez long, ou vermiformes-allongés à extrémité distale le plus souvent renflée, 50—60×6—9 µm en haut et 2,5—4 µm en bas. <i>Trame</i> des lamelles régulière à hyphes cylindriques atteignant 13 µm de diamètre. <i>Revêtement</i> du chapeau à hyphes très grèles, de 2—5 µm de large. Flocons du haut du pied constitués par de longs poils grèles vermiformes mesurant jusqu'à 85 µm de long sur 7 de diamètre.
<i>Habitat:</i>	Les Rousses: pinède, parmi les Calluna, Empetrum, polytrics. Lossy: dans les sphagnes, sous Salix et Rhamnus.
<i>Observations:</i>	Ce champignon répond d'une façon satisfaisante à la description qu'en a donnée Fries, 21, II, p. 299. La figure des Icones du même auteur montre un champignon à chapeau un peu plus foncé et squamuleux, mais le texte du même ouvrage, p. 13, le décrit «nudo, testaceo expallente».
<i>Matériel:</i>	J. Favre lg., Tourbière des Rousses, départ. du Jura, 27 sept. 1937, (Herb. G—K n° 8165).

## **Hebeloma alpinum (J. Favre) Bruchet (= H. crustuliniforme var. alpinum J. Favre)**

<i>Chapeau:</i>	conico-convexe à large mamelon obtus ou hémisphérique-convexe sans mamelon, très charnu au centre, mais mince à la marge, atteignant 25 mm de diamètre, visqueux, ocre-fauve ou café au lait pâle au centre, chamois-blanchâtre à l'ambitus, à marge longtemps enroulée-incurvée, blanchâtre, finement pubescente, mais non fibrilleuse.
<i>Lamelles:</i>	assez larges ou larges, jusqu'à 4,5 mm, plus ou moins émarginées au pied, minces, tendant à se coucher, à arête finement fimbriée blanchâtre, peu ou moyennement serrées (26 à 54; 1 = 3 ou 1), d'abord ocracé-grisâtre puis ocre-brun, larmoyantes.
<i>Pied:</i>	fistuleux ou creux, de forme variable, parfois assez grêle à peine renflé à la base (atteignant par exemple 25 mm de long, 4 mm de diamètre en haut et 5 en bas) parfois court et trapu, assez élargi à la base (jusqu'à 22 mm de long, 6 mm de diamètre en haut et 7,5 en bas), blanc, à peine brunissant à sa base, à surface finement fibreuse, à flocons blanchâtres au sommet.



*Hebeloma magnimamma* (Fr.) Quel.

(Aquarelle de Jeanne Favre)

Conservatoire botanique de Genève:  
Collection Jules Favre



*Hebeloma alpinum* Bruchet (= *H. crustuliniforme* var. *alpinum* J. Favre)

(Aquarelle de Jeanne Favre)


Conservatoire botanique de Genève:  
Collection Jules Favre

<i>Chair:</i>	blanche un peu brunâtre à la base du pied, à odeur nulle ou faiblement raphanoïde, saveur amarescente, ou à peu près douce.
<i>Microscopie:</i>	Spores amygdaliformes, ocres, légèrement verruqueuses, $10,5-13 \times 6-7 \mu\text{m}$ . Basides tétrasporiques, $41-47 \times 10,5-11 \mu\text{m}$ . Poils de l'arête des lamelles très allongés, de $52-72 \mu\text{m}$ , à extrémité distale renflée ( $8,5-12 \mu\text{m}$ ) à long pédoncule grêle rarement à peine élargi vers sa base. Trame des lamelles régulière à hyphes cylindriques mesurant jusqu'à $13 \mu\text{m}$ de diamètre. Revêtement du chapeau, avant sa gélification, constitué par de longues hyphes bouclées très grêles, $2-5 \mu\text{m}$ . Les poils des flocons du haut du pied sont semblables à ceux de l'arête des lamelles.
<i>Habitat:</i>	Répandu dans toute la zone alpine où je l'ai noté 35 fois, de 2180 m à Valbella val S-charl, à 2750 m au haut du val dal Botsch, autant sur les tapis de dryades que sur ceux de saules nains, presque toujours sur les sols de calcaire triasique et deux fois seulement sur les terrains cristallins, comme à Foppinas, 2700 m, val Laschadura.
<i>Observations:</i>	Ce champignon ne diffère de <i>H. crustuliniforme</i> de la plaine que par sa taille beaucoup plus petite, ses lamelles proportionnellement plus larges, moins nombreuses (mes observations dans les régions basses m'ont donné 47-74; l = 7 ou 3) et par son pied toujours creux.
<i>Matériel:</i>	J. Favre lg.: Valbella, 2180 m, Val S-charl, Grisons, 27 août 1951 (n° G-K 13672); Val del Botsch, 2600 m, 27 août 1949, (n° G-K 13674).

(Texte transcrit à partir de la description originale de Jules Favre par Olivier Monthoux.)  
(Voir l'introduction dans ce bulletin SZP/BSM 64 [8] : 148, 1986.)

## ***Hebeloma magnimamma* (Fr.) Quélet**

<i>Hut:</i>	Bis zu 24 mm im Durchmesser, mit einem grossen, hervorspringenden Buckel, unter diesem sehr dickfleischig und am Rand sehr dünnfleischig, nicht hygrophan, nicht schmierig, kahl mit Ausnahme rarer, sehr feiner, spinnwebiger Velumreste am Rand, beige milchkaffeebraun.
<i>Lamellen:</i>	Dünn, bis 5,5 mm breit, am Stiel abgerundet, fast spitz oder stumpf gegen den Hutrand, kaum runzelig auf den Flächen, mit flockiger Schneide, ein wenig gedrängt (26-32, 1=1 oder 3), tonfarbig ockerlich, dann ockerlich rostbraun.
<i>Stiel:</i>	Leicht gekrümmt oder gebogen, gegen die Basis leicht ausgeweitet, enghohl, faserig, doch flockig an der Spitze, oben weisslich, gegen unten beige bräunlich.
<i>Fleisch:</i>	Weisslich oder sehr hellbeige im Hut und in der Stielspitze, dunkler gegen die Basis, aber nicht rostbraun, geruchlos, bitterlich.
<i>Mikroskopie:</i>	<i>Sporen</i> ziemlich hellocker, mandelförmig, fein warzig, $9-12 \times 5-7 \mu\text{m}$ , <i>Basidien</i> vier-sporig, $27-30 \times 7-7,5 \mu\text{m}$ . <i>Randhaare</i> der Lamellen keulenförmig mit ziemlich langen Stielchen oder wurmförmig länglich, am äusseren Ende oft aufgeblasen, $50-60 \times 6-9 \mu\text{m}$ am oberen und $2,5-4 \mu\text{m}$ am unteren Ende. <i>Lamellentrama</i> regulär, mit $13 \mu\text{m}$ breiten zylindrischen Hyphen. <i>Huthaut</i> mit sehr dünnen, $2-5 \mu\text{m}$ breiten Hyphen, Flocken an der Stielspitze bestehend aus langen, dünnen, wurmförmigen Haaren, bis $85 \mu\text{m}$ lang und $7 \mu\text{m}$ breit.
<i>Standort:</i>	Les Rousses, Kiefernwald in Calluna, Empetrum, Polytrichum. Lossy: in Sphagneten unter Salix und Rhamnus.
<i>Bemerkungen:</i>	Dieser Pilz stimmt recht gut überein mit der Beschreibung von Fries, 21, II, S. 299. Das Bild der Icônes desselben Autors zeigt einen Pilz mit einem dunkleren und feinschuppigem Hut; aber der Text des gleichen Werkes, S. 13 beschreibt ihn «nudo, testaceo expallente».
<i>Material:</i>	J. Favre leg., Tourbière des Rousses, Département du Jura, 27. Sept. 1937, (Herb. G-K Nr. 8165).



A gauche: *Hebeloma magnimamma*: Carpophores grandeur nature; poils d'arête des lamelles ×500; spores ×1000.

A droite: *Hebeloma alpinum*: Carpophores grandeur nature; spores ×1000; poils constituant les flocons du pied (aux extrémités de la série supérieure) ×500; six poils de l'arête des lamelles ×500.

Links: *Hebeloma magnimamma*: Fruchtkörper in natürlicher Grösse, Randhaare der Lamellen ×500, Sporen X1000.

Rechts: *Hebeloma alpinum*: Fruchtkörper in natürlicher Grösse, Sporen ×1000, Haare der Flocken an der Stielspitze (die beiden äusseren in der oberen Reihe) ×500, sechs Randhaare der Lamellen ×500.

A sinistra: *Hebeloma magnimamma*: carpofori a grandezza naturale, peli del filo delle lamelle ×500, spore ×1000.

A destra: *Hebeloma alpinum*: carpofori a grandezza naturale, spore ×1000, peli dei fiocchi del gambo (alle estremità della serie superiore) ×500, sei peli del filo delle lamelle ×500.

## ***Hebeloma alpinum* (J. Favre) Bruchet (= *H. crustuliniforme* var. *alpinum* J. Favre)**

**Hut:** Konisch-gewölbt mit breitem, stumpfem Buckel, oder halbkugelig-gewölbt ohne Buckel, in der Mitte dickfleischig, aber dünnfleischig am Rand, bis 25 mm Breite erreichend, schmierig, ocker-fuchsig oder hell milchkaffeebraun in der Mitte, rehbraun-weisslich in der Randzone, mit lange eingerolltem eingebogenem weisslichem Rand, fein flaumig, aber nicht faserig.

**Lamellen:** Ziemlich breit bis breit, bis zu 4,5 mm, mehr oder weniger am Stiel ausgebuchtet, dünn, mit Tendenz sich umzulegen, mit fein weisslich bewimpelter Schneide, wenig oder etwas gedrängt (26–54, 1 = 3 oder 1), zuerst ocker-graulich, dann ockerbraun, tränend.

- Stiel:** Enghohl oder hohl, von variabler Form, manchmal ziemlich dünn, an der Basis kaum aufgeblasen (z. B. 25 mm lang, 4 mm breit oben und 5 mm unten), manchmal kurz und gedrungen, an der Basis ziemlich erweitert (bis 22 mm lang, oben 6 mm breit und unten 7,5 mm), weiss, an der Basis kaum bräunend, mit feinfaseriger Oberfläche, an der Spitze mit weisslichen Flocken.
- Fleisch:** Weiss, an der Stielbasis ein wenig bräunlich, geruchlos oder leicht rettichartig, Geschmack bitterlich oder fast mild.
- Mikroskopie:** Sporen mandelförmig, ocker, leicht warzig,  $10,5-13 \times 6-7 \mu\text{m}$ . Basidien viersporig,  $41-47 \times 10,5-11 \mu\text{m}$ , Randhaare der Lamellen sehr lang gezogen,  $52-72 \mu\text{m}$ , am äusseren Ende aufgeblasen ( $8,5-12 \mu\text{m}$ ), mit langem schlanken Füßchen, das selten gegen die Basis leicht erweitert sein kann. Lamellentrama regulär, mit bis zu  $13 \mu\text{m}$  breiten zylindrischen Hyphen. Hutbekleidung vor der Gelifizierung durch lange, sehr dünne  $2-5 \mu\text{m}$  breite Hyphen mit Schnallen aufgebaut. Die Haare der Flocken an der Stielspitze sind den Randhaaren der Lamellen ähnlich.
- Standort:** Verbreitet in der ganzen alpinen Zone, wo ich diese Art 35 mal notiert habe, auf 2180 m bei Valbella, Val S-charl, auf 2750 m oben im Val dal Botsch, ebenso auf den Teppichen von Dryas (Silberwurz) wie auf denen der Zwerpweiden, fast immer auf Trias-Kalkböden und nur zweimal auf kristallinen Böden, wie bei Foppinas, auf 2700 m, Val Laschadura.
- Bemerkungen:** Diese Art unterscheidet sich von *H. crustuliniforme* der Ebene nur durch seine viel kleinere Wuchsform, seine im Verhältnis breiteren und weniger zahlreichen Lamellen (meine Beobachtungen in den tiefen Regionen gaben mir 47-74, 1 = 7 oder 3) und durch seinen immer hohlen Stiel.
- Material:** J. Favre leg.: Valbella 2180 m, Val S-charl, Graubünden, 27. August 1951 (Nr. G-K 13672), Val dal Botsch, 2600 m, 27. August 1949, (Nr. G-K 13674).

(Text übertragen nach der Originalbeschreibung von Jules Favre durch Olivier Monthoux.)  
 (Siehe Einführung in der Zeitschrift SZP/BSM 64(8): 148, 1986.) (Übers. B. Kobler)

## Hebeloma magnimamma (Fr.) Quélet

- Cappello:** diametro fino a 24 mm, con grosso umbone sporgente, carne molto spessa sotto l'umbone e molto sottile al margine, non igrofano, non viscoso, glabro salvo rari resti molto fini al margine del velo araneoso, bruno caffelatte.
- Lamelle:** sottili, larghe fino a 5,5 mm, al gambo arrotondate, subacute o ottuse al margine del cappello, faccie poco rugulose, filo fiocoso, un poco fitte (26-32, lamellule da 1 a 3), argilla-ocracee, poi ocracee ruggine.
- Gambo:** subflessuoso o curvato, che si allarga verso il basso, fistoloso, fibrilloso, fiocoso all'apice, biancastro in alto e beige brunastro inferiormente.
- Carne:** biancastra o beige molto pallida nel cappello e nella parte alta del gambo, bruno un po' scuro più in basso, però non bruno ruggine, inodore, amarognola.
- Microscopia:** Spore ocra abbastanza pallide, amigdaliformi, finemente verrucose,  $9-12 \times 5-7 \mu\text{m}$ . Basidi tetrasporici  $27-30 \times 7-7,5 \mu\text{m}$ . Filo delle lamelle con peli claviformi a peduncolo abbastanza lungo, o vermiformi-allungati, il più sovente rigonfi all'apice, lunghi  $50-60 \mu\text{m}$ , larghi  $6-9 \mu\text{m}$  in alto e  $2,5-4 \mu\text{m}$  in basso. Trama delle lamelle regolare con ife cilindriche di diametro fino a  $13 \mu\text{m}$ . Rivestimento pileico con ife molto esili, larghe  $2-5 \mu\text{m}$ . Fiocchi all'apice del gambo costituiti da lunghi peli esili vermiformi, lunghi fino a  $85 \mu\text{m}$  e diametro  $7 \mu\text{m}$ .
- Habitat:** Les Rousses: pineta tra Calluna, Empetrum, Polytrichum. Lossy: in sfagni sotto Salix e Rhamnus.

- Osservazioni:** Questo fungo corrisponde in modo soddisfacente alla descrizione data da Fries, 21, II, p. 299. La figura delle icone dello stesso autore mostra un fungo a cappello un poco più scuro e squamuoso, ma il testo della stessa opera, p. 13, lo descrive «nudo, testaceo expallente».
- Materiale:** J. Favre lg.: Tourbière des Rousses, départ. du Jura, 27 sett. 1937 (Herb. G—K n° 8165).

### **Hebeloma alpinum (J. Favre) Bruchet (= H. crustuliniforme var. alpinum J. Favre)**

- Cappello:** conico-convesso con largo umbone ottuso, oppure emisferico-convesso senza umbone, molto carnoso all centro ma sottile al margine, fino a 25 mm di diametro, viscoso, ocra fulvo o caffelatte pallido al centro, camoscio biancastro nella parte mediana, margine biancastro e a lungo involuto-incurvato, finemente pubescente ma non fibriloso.
- Lamelle:** da abbastanza larghe a larghe, fino a 4,5 mm, più o meno uncinate, sottili, tendenti a ripiegarsi l'una contro l'altra, filo biancastro finemente fimbriato, poco o mediamente fitte (26 a 54, lamellule 3 oppure una), dapprima ocra-grigiastre poi ocra bruno, lacrimanti.
- Gambo:** pistoloso cavo, forma variabile, talvolta abbastanza esile e un poco rigonfio alla base (per es. lungo 25 mm, diametro 4 mm in alto e 5 mm in basso), talaltra corto e tozzo, abbastanza allargato alla base (lungo fino a 22 mm, diametro 6 mm in alto e 7,5 mm in basso), bianco, un poco bruno alla base, superficie finemente fibrosa e con fiocchi biancastri all'apice.
- Carne:** bianca, un poco brunastra alla base del gambo, inodore o debole di rafano, amarognola o pressapoco dolce.
- Microscopia:** Spore amigdaliformi, ocra, leggermente verrucose,  $10,5-13 \times 6-7 \mu\text{m}$ . Basidi tetrasporici,  $41-47 \times 10,5-11 \mu\text{m}$ . Peli del filo delle lamelle molto allungati,  $52-72 \mu\text{m}$ , rigonfi all'apice ( $8,5-12 \mu\text{m}$ ) con lungo peduncolo esile, raramente un poco allargato verso la base. Trama regolare nelle lamelle, con ife cilindriche, diametro fino a  $13 \mu\text{m}$ . Rivestimento pileico, prima della gelificazione, costituito da lunghe ife molto esili con giunti a fibbia,  $2-5 \mu\text{m}$ . I peli dei fiocchi all'apice del gambo sono simili a quelli del filo delle lamelle.
- Habitat:** diffuso in tutta la zona alpina, dove l'ho notato 35 volte, da 2180 m a Valbella Val S-charl, a 2750 m nella parte alta della Val dal Botsch, sia sui tappeti a driade sia a quelli di salici nani, quasi sempre su terreno calcareo triassico e due volte soltanto su terreno cristallino, come a Foppinas, 2700 m, val Laschadura.
- Osservazioni:** questo fungo differisce da H. crustuliniforme della pianura soltanto per le sue dimensioni che sono molto più piccole, le sue lamelle sono in proporzione più larghe, meno numerose (le mie osservazioni nelle regioni a bassa quota mi hanno dato 47-74, lamellule 7 oppure 3) e per il gambo sempre cavo.
- Materiale:** J. Favre lg.: Valbella, 2180 m, Val S-charl, Grigioni, 27 ag. 1951 (n° G—K 13672); Val del Botsch, 2600 m, 27 ag. 1949, (n° G—K 13674).

(Testo trascritto da Olivier Monthoux in base alla descrizione originale di Jules Favre.) (Vedi l'introduzione in questo bollettino SZP/BSM 64 [8]: 148, 1986). (trad. E. Zenone)