

**Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch :
Beringter Erdritterling, Fam. Tricholomataceae
= tricholome ceinturé, Fam.: Tricholomataceae
= Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch, Fam.
Tricholomataceae**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **65 (1987)**

Heft 11

PDF erstellt am: **05.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936551>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch
Beringter Erdritterling, Fam. Tricholomataceae

- Hut:** Graubräunlich bis blassgrau, fein faserig bis schuppig, vor allem gegen die Hutmitte, 3–7 cm, gewölbt bis ausgebreitet.
- Lamellen:** Gedrängt, ausgebuchtet, weisslich bis blass braungrau. Nicht gilbend!
- Stiel:** Weisslich bis graubräunlich, unter einem wolligen bis fast häutigen Ring fein faser-schuppig, ± zylindrisch, alt hohl.
- Fleisch:** Weiss, mild und geruchlos.
- Sporenstaub:** Weiss, Sporen: 4–5×2,5–3 µm, ei- bis tropfenförmig, oft mit Öltropfen.
- Standort:** Auenwälder, besonders unter Salix, feuchte Laubwald-Böden. Meist gesellig. Nicht häufig.
- Bemerkungen:** Diese Art ist im Aspekt *Tricholoma sculpturatum* (Fr.) Quél. ähnlich, unterscheidet sich aber von dieser durch nicht gilbende Lamellen und den deutlich beringten Stiel. Die einzig beringte Art der Sektion *Trich. p. p.* und *Pardinicutis*.

B. Kobler

Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch
Tricholome ceinturé, Fam.: Tricholomataceae

- Chapeau:** Gris brunâtre à gris pâle, finement fibrilleux à squamuleux, avant tout vers le disque, 3–7 cm, pulviné à étalé.
- Lames:** Serrées, émarginées, blanchâtres à gris brun pâle. Non jaunissantes!
- Pied:** Blanchâtre à gris brunâtre, finement fibrilleux squamuleux au-dessous d'un anneau lai-neux à presque membraneux, plus ou moins cylindrique, creux avec l'âge.
- Chair:** Blanche, douce et inodore.
- Sporée:** Blanche.
- Spores:** 4–5×2,5–3 µm, oviformes à guttuliformes, souvent avec inclusions huileuses.
- Habitat:** Forêts riveraines, surtout sous Salix, sols humides de bois feuillus. Généralement en troupes. Pas fréquent.
- Remarques:** Cette espèce a un habitus ressemblant à *Tricholoma sculpturatum* (Fr.) Quél.; il s'en distingue néanmoins par ses lames non jaunissantes et par son pied nettement annelé. C'est la seule espèce annelée de la section ATROSQUAMOSA (Flore K. & R) ou de la section *Tricholoma p. p.* et *Pardinicutis* (Moser).

(trad.: F. Brunelli)

Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch, Fam. Tricholomataceae

- Cappello:** Da grigio brunastro a grigio pallido, da finemente fibrilloso a squamoso, specialmente verso il centro del cappello, 3–7 cm, da convesso a appianato.
- Lamelle:** Fitte, smarginate, da biancastre a bruno grigio pallido. Non ingialliscono!
- Gambo:** Da biancastro a brunastro grigio, anello da lanoso a quasi membranoso, sotto di esso finemente fibrilloso squamoso, ± cilindrico, vecchio cavo.
- Carne:** Bianca, mite e inodore.
- Sporata:** Bianca, spore 4–5×2,5–3 µm, a forma di uovo o di goccia, sovente con goccioline oleose.
- Habitat:** Boschi golenali, specialmente sotto salici, boschi umidi di latifoglie. In generale gregario. Non frequente.
- Osservazioni:** Questa specie è simile nell'aspetto a *Tricholoma sculpturatum* (Fr.) Quél., si distingue però da esso per avere lamelle che non ingialliscono e gambo con tipico anello. È l'unica specie con anello della sezione *Trich. p. p.* e *Pardinicutis*.

(trad.: E. Zenone)



Tricholoma cingulatum (Fr.) Jacobasch

(Aquarelle de Jean Mouchet)