

# **Stropharia hornemannii (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. : Üppiger Träuschling : ungeniessbar = Strophaire luxuriante, non comestible = non commestibile**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de  
mycologie**

Band (Jahr): **65 (1987)**

Heft 12

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936556>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## ***Stropharia hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. Üppiger Träuschling — Ungenießbar**

- Hut:** Elfenbeinweiss, gelbbraun, graubraun bis kastanienbraun, schmierig-klebrig, trocken glänzend, glatt, 5–15 cm breit, zuerst glockig, dann flach gewölbt, fleischig, Rand lange eingerollt, oft vom Velum behangen.
- Lamellen:** Weisslich, dann rauchgrau-violett, bei Sporenreife dunkelbraun, mässig gedrängt, ziemlich breit, angewachsen oder mit Zahn herablaufend.
- Stiel:** Weisslich bis blass gelblich mit weisslichem, weit abstehendem, gerieftem und flüchtigem Ring. Unter diesem grob abstehend und teilweise zurückgebogen schuppig, alt fast ganz verkahlend. Mehr oder weniger zylindrisch mit leicht verschmälter Spitze.
- Fleisch:** Crèmeweisslich, weich, mit unangenehmem Geruch. Geschmack bitterlich.
- Sporen:** 10,5–13×5,5–7 µm, mit deutlichem Keimporus. Sporenstaub dunkelbraun.
- Standort:** August bis Oktober im Nadelwald auf modrigen Fichtenstümpfen, oder in Verbindung mit Holzresten und Nadelstreu. Saprobiont. Kommt bis zur subalpinen Waldgrenze vor.
- Bemerkungen:** Diese Art steht *Stropharia rugoso-annulata* Farlow ex Murr., dem Riesenträuschling nahe, welcher aber auch jung einen kahlen Stiel besitzt und ausser in Kultur eher in wärmeren Lagen vorkommt.
- B. Kobler

## ***Stropharia hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. *Strophaire luxuriante*, non comestible**

- Chapeau:** blanc d'ivoire, brun jaune, brun gris à brun châtain, visqueux, brillant par le sec, lisse, diam. 5 à 15 cm, d'abord campanulé puis plan convexe, charnu; marge longtemps enroulée, souvent appendiculée de restes du voile.
- Lames:** blanchâtres, puis gris fumé à violet, brun foncé à la maturité des spores; assez serrées, plutôt larges, adnées à décurrentes par une dent.
- Pied:** blanchâtre à jaunâtre pâle; anneau blanchâtre, strié, fugace et largement écarté du pied; au-dessous, hérissé de peluches grossières écartées et parfois révoluées; devenant presque glabre avec l'âge; plus ou moins cylindrique, légèrement étréci au sommet.
- Chair:** crème blanchâtre, molle, à odeur désagréable, à saveur amarescente.
- Sporée:** brun foncé.
- Spores:** 10,5–13×5,5–7 µm, à pore germinatif évident.
- Habitat:** août–novembre, sur résineux, sur souches pourrissantes de pins, ou bien sur débris ligneux ou litière d'aiguilles. Saprophyte. Jusqu'à l'étage subalpin, à la limite des forêts.
- Remarques:** Cette espèce est proche de *Stropharia rugoso-annulata* Farlow ex Murr., *Strophaire rouge vineux*; le pied de celle-ci est néanmoins nu dès la jeunesse et, culture mise à part, vient plutôt en des stations plus chaudes.

(trad.: F. Brunelli)

## ***Stropharia hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. — Non commestibile**

- Cappello:** bianco avorio, bruno giallo, da bruno grigio a bruno castano, viscido-appiccicoso, asciutto brillante, liscio, largo da 5 a 15 cm, dapprima campanulato, poi piano-convesso, carnoso, orlo a lungo involuto, spesso provvisto da residui di velo.
- Lamelle:** biancastre, poi grigio fumo-violetto, bruno scuro a spore mature, moderatamente fitte, abbastanza larghe, adnate oppure decorrenti con dentino.
- Gambo:** da biancastro a giallognolo pallido con anello biancastro, molto distanziato, striato e fugace. Al disotto con squame grossolanamente sporgenti e in parte piegate all'indietro, vecchio glabrescente. Più o meno cilindrico o con apice leggermente attenuato.
- Carne:** biancastra crema, tenera, odore sgradevole, sapore amarognolo.
- Spore:** 10,5–13×5,5–7 µm, con poro germinativo evidente. Sporata bruno scuro.
- Habitat:** Da agosto a ottobre nei boschi di conifera su ceppaie marcescenti di abete rosso, oppure in collegamento con resti di legno e strame di conifera. Saprobionte. Cresce fino al limite subalpino del bosco.
- Osservazioni:** Questa specie è vicina a *Stropharia rugoso-annulata* Farlow ex Murr., la quale però anche giovane ha il gambo glabro e, salvo in cultura, cresce in luoghi piuttosto caldi.

(trad.: E. Zenone)



*Stropharia hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf.

(Aquarelle de Jean Mouchet)