

**Entoloma mougeotii (Quél.) Hesler (= E.
ardosiacus ss. Quél.), Bres. non Fr. : Fam.
Entolomataceae, Untergattung Leptonia =
Entoloma mougeotii Fr. Hesler : Fam.:
Entolomataceae ss.-g.: Leptonia**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **67 (1989)**

Heft 1

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936432>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Entoloma mougeotii (Quél.) Hesler (= E. ardosiacus ss. Quél.), Bres. non Fr.
Fam. Entolomataceae, Untergattung Leptonia

- Hut:** 1,5–4(5) cm breit, niedergedrückt, meist deutlich genabelt bis fast trichterig, blass blauviolett bis rosabräunlich, mit feinsten angedrückten und radial angeordneten Schüppchen bedeckt, die den helleren Untergrund kaum durchscheinen lassen, matt, Rand glatt. Im Alter verblasst die blaue Farbtonung.
- Lamellen:** Ausgebuchtet angewachsen, relativ breit, weiss, selten mit Lilaton, dann zartrosa, mässig gedrängt mit zahlreichen Lamelletten.
- Stiel:** Zylindrisch mit leicht verdickter Basis, 5–7 cm lang, 4–5 mm breit, faserig gestreift, dem Hut gleichfarben, enghohl, Basis weiss.
- Fleisch:** Schmutzig bräunlichweiss, geruch- und geschmacklos, im Hut sehr dünnfleischig.
- Sporen:** 9,5–13×6,5–8,5 µm, eiförmig-elliptisch, 5–8eckig. Sporenpulver rosa.
- Standort:** Feuchte Magerwiesen und Weiden, moosige Stellen, mit Vorliebe in montanen bis voralpinen Gebieten, im Sommer, nicht selten.
- Bemerkungen:** Diese Art ist makroskopisch an ihren schönen violettblauen Farbtönen auf Hut und Stiel, der deutlichen Nabelung und der für diese Gruppe eher grossen Fruchtkörper gut zu erkennen. Die Farbtafel zeigt den Pilz leicht vergrössert. B. Kobler
- Foto:** Michael Stappung, Döttingen

Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler Fam.: Entolomataceae ss.-g.: Leptonia

- Chapeau:** 1,5–4 (5) cm de diamètre, en général nettement déprimé à quasi cyathiforme; bleu violet pâle à rose brunâtre, recouvert de très petites mèches arrangées radialement et laissant à peine entrevoir le fond plus pâle; mat, à marge lisse. Les tonalités bleues pâlisent avec l'âge.
- Lames:** Adnées échancrées, assez larges, blanches, rarement lilacines, puis rose tendre; moyennement serrées; nombreuses lamelles et lamellules.
- Pied:** Cylindrique, légèrement épaissi vers la base; 5–7 cm × 4–5 mm; d'apparence striée par des fibrilles; concolore au chapeau, fistuleux, blanc à la base.
- Chair:** Blanc brunâtre sale; très mince dans le chapeau; insipide et inodore.
- Sporée:** Rose.
- Spores:** 9,5–13×6,5–8,5 µm, ovoïdes elliptiques, avec 5–8 angles.
- Habitat:** Lieux humides et moussus, dans les prairies maigres et les pâturages, de préférence aux étages alpins à subalpins; pas rare espèce estivale.
- Remarques:** Espèce relativement reconnaissable macroscopiquement à ses belles tonalités bleu violet sur le chapeau et le pied, à son ombilic évident et à sa taille plutôt grande pour le groupe dont elle fait partie. La photographie montre des sujets légèrement agrandis. Selon M. E. Noordeloos («Entoloma in Europe» 1987), l'épithète *ardosiacum*, parfois synonymisée avec *mougeotii*, est à exclure, en raison d'interprétations diverses par les auteurs (Bulliard 1792, Quélet 1882, Bresadola 1929, Pearson & Dennis 1948). Hesler (Nov. Hedw.) a redéfini et nommé l'espèce en 1967.
- Photo:** Michael Stappung, Döttingen
(trad., compl.: F. Brunelli)

Entoloma mougeotii (Quél.) Hesler (=E. ardosiacus ss. Quél.) Bres. non Fr.
Fam. Entolomataceae sottogenere Leptonia

- Cappello:** Largo 1,5–4 (5) cm, depresso, per lo più chiaramente ombelicato fino a quasi imbutiforme, da azzurro viola pallido a brunastro rosa, ricoperto da fini squamette appressate e ordinate radialmente, che vagamente lasciano intravedere il sottofondo più chiaro, opaco, margine liscio. In vecchiaia sbiadiscono le tonalità azzurre.
- Lamelle:** Adnate-smarginate, relativamente larghe, bianche, raramente con toni lilla, poi rosa delicato, moderatamente fitte e con numerose lamellule.
- Gambo:** Cilindrico, base leggermente ingrossata, lungo 5–7 cm, largo 4–5 mm, striato fibrilloso, concolore al cappello, fistoloso, base bianca.
- Carne:** Bianca-brunastro sporca, priva di odore e sapore significativi, molto sottile nel cappello.
- Spore:** 9,5–13×6,5–8,5 µm, ovali-ellittiche, a 5–8 angoli. Sporata rosa.
- Habitat:** Prati magri umidi, pascoli, posti muschiosi, con preferenza per le zone montane e subalpine, in estate, non raro.
- Osservazioni:** Questa specie è ben caratterizzata dalle belle tonalità viola azzurro del cappello e del gambo, e per questo gruppo, dai carpofori relativamente grandi e chiaramente ombelicati. La tavola a colori mostra funghi un poco ingranditi.
- Foto:** Michael Stappung, Döttingen
(trad. E. Zenone)

