

Vapko-Mitteilungen = Communications Vapko = Comunicazioni Vapko

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **67 (1989)**

Heft 9/10

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Russula aquosa Leclair, **Russula acquosa** (Sezione Piperinae, sottosezione Atropurpurinae)

- Cappello:** Diametro 2,5—9 cm, molto carnoso ma fragilissimo; inizialmente emisferico, presto pianeggiante, con l'età imbutiforme; margine translucido e con carne membranosa, sovente irregolarmente sinuoso e scanalato tuberculoso fino ad 1 cm; rosso ciliegia con toni lilla, sovente brunastro al centro; spesso sbiadisce, lasciando delle chiazze lavate di rosa; ma non diventa mai bianco puro. Pellicola pileica viscosa, brillante anche da secco, quasi interamente separabile, da microstruttura granulosa.
- Lamelle:** Da smarginate a quasi libere, nettamente spaziate con l'età, ventricose, larghe 4—10 mm; taglio intero; poche biforcazioni; inizialmente bianche, poi grigio sporco biancastra. Sporata da biancastra a quasi crema.
- Gambo:** 2,5—4—9×0,8—2,3 cm; base abitualmente ingrossata clavata; verso l'apice, prima della dilatazione d'inserzione con le lamelle, ha strangolature caratteristiche; bianco, poi sporcato di grigio-bianco e acquoso, prima di decomporsi da grigio-bruno sporco fino a grigio; fragilissimo, da giovane farcito, poi da midolloso a cavo. Superficie esterna setosa, finemente scanalato, quasi reticolato; rivestimento acquoso, pressoché ialino. Base a volte munita di rizoide miceliare.
- Carne:** Prima dura, presto fragile e gonfia d'acqua; al gambo spugnosa e morbida; bianca, rosa solamente qua e là sotto la cuticola. Odore insignificante, a volte leggermente iodico o rafanoide. Sapore molto variabile, da subdolce a nettamente acre, abitualmente appena piccante e leggermente raspante. Reazione al guaiaco debole e lenta, al formolo nulla o leggermente rosa.
- Microscopia:** Spore 7—8,5×5,5—7 µm, verruche con numerose congiunzioni, d'aspetto subreticolato, verruche ottuse ed alte fino a 0,75 µm, in parte lievemente amiloidi. Peli del rivestimento pileico cilindrici, in parte curvati e ramificati, larghi 2—4,5 µm, frammisti a numerosi dermatocistidi caratteristici, claviformi, larghi fino a 10 µm, a contenuto grigiastro. Basidi tetrasporici, 30—50×6—11 µm.
- Habitat:** Sovente nei sfagneti, torbiere, ma anche fra il muschio in boschi di peccio, pini e betulle su terreno acido. Su terreno gneissico, subalpino, Foresta Nera. Da agosto a ottobre. Non comune. Non si é ancora potuto dimostrare alcuna associazione micorrizica con determinate piante. Luogo di raccolta: Ibacher Kreuz, palude sovracquatica, alt. 1060 m. 25.9.1987.
- Note:** Questo bel fungo spettacolare viene spesso scambiato con forme di *R. emetica*, la quale hanno colore rosso cinnabarino e la base del piede meno clavata. Dermatocistidi ben marcati da una base corta e stretta con immediato svasamento clavato, larghi 8—10 µm, separando nettamente questa specie dalla sottosezione *Emeticinae*.

Foto: Michael Stappung, Döttingen

Testo e disegni: Bernhard Kobler, Zürich

Traduzione: Carmine Lavorato, Zürich

Vapko - Mitteilungen
Communications Vapko
Comunicazioni Vapko



VAPKO-Materialverkauf

Aushilfsweise hat den Verkauf übernommen:

Frau Ruth Bänziger, Im Storchen 6, 8212 Neuhausen a. Rhf., Tel. 053 24 16 39