

Il fungo del mese : *Agrocybe pputaminum* (Mre.) Sing. = Der Pilz des Monats : Falber Ackerling = Le champignon du mois

Autor(en): **Riva, Alfredo**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **75 (1997)**

Heft 12

PDF erstellt am: **11.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936396>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrücke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Agrocybe putaminum (Mre.) Sing.

Alfredo Riva


Via Pusterla 12, 6828 Balerna

- Cappello:** 4–6 (–8) cm, inizialmente convesso poi subito ondulato irregolare e con bordo lobato. A maturità quasi appianato con mantenimento di un accenno di umbone. Margine ricurvo, cuticola sottile e quasi eccedente al bordo, non levabile, igrofana. Giallo ocra fino a ocra-bruno pallido.
- Gambo:** 0,8–1,5 (–2) × 8–10 (–12) cm, ingrossato verso la base che può anche presentarsi bulbosa. Notevolmente striato longitudinalmente, debolmente fibrilloso sotto le lamelle, non presenta nessun resto di velo o anello.
- Carne:** scarsa nel cappello, fibrosa-fistolosa nel gambo, farinoso-amara, priva di odori particolari.
- Lamelle:** relativamente fitte, con lamellule, inizialmente bruno chiaro poi a maturità più scure per sporata bruno-tabacco.
- Spore:** 9–10 (–11,5) × 4,5–5 (–7) μm, a forma di limone con parete spessa ben visibile.
- Cheilocistidi:** a forma di clava, talvolta utriforimi, senza appendici.
- Habitat:** su cumuli di legno macinato (castagno, robinia, frassino) depositato da un paio d'anni e pure su campo prativo, prima della aratura, in migliaia di esemplari; terreno concimato con compostaggio, Bedigliora (Malcantone), Cantone Ticino, maggio-giugno 1995 e 1996.
- Osservazioni:** ci permettiamo di segnalare e dare una nuova iconografia di questa specie poiché poco nota e poco rappresentata in letteratura. Cresce in esemplari numerosi, isolati o cespitosi, associata a *Agrocybe praecox* (Pers.:Fr.) Fayod e a *Stropharia rugosoannulata* Farlow. Per facilitare la determinazione ai principianti diremo che si può affermare che si tratta di una *Agrocybe praecox* senza anello.
- Fotografie e disegni:** A. Riva (foto 1 in habitat, foto 2 in atelier).
- Bibliografia:** Moser, M., *Kleine Kryptogamenflora*, ed. italiana pag. 308.
Nauta, N. M., *Revisione delle specie olandesi del Genere Agrocybe*.
- Iconografia:** Moser-Jülich, *Farbatlas der Basidiomyceten*, *Agrocybe* III 2.

Disegni/Zeichnungen/Dessins au trait:

- A spore / Sporen/ spores
B basidi e basidioli / Basidien und Basidiolen / basides et basidioles
C cheilocistidi / Cheilozystiden / cheilocystides
D trama, ife lamelle / Trama, Lamellenhyphen / trame, hyphes des lames
E caulocistidi / Kaulozystiden / caulocystides.





A. H. H. V. V.
6 giugno 1996

Agrocybe putaminum (Mre) Sing.

**Agrocybe putaminum (Mre.) Sing.
Falber Ackerling**

Alfredo Riva

Via Pusterla 12, 6828 Balerna

- Hut:** 4–6 (–8) cm, zuerst gewölbt, dann unregelmässig gewellt und Rand gelappt. Bei Reife ausgebreitet und mit der Spur eines Buckels. Rand eingebogen, Huthaut dünn und den Rand leicht überlappend, nicht ablösbar, hygrophan. Ockergelb bis hell ockerbraun.
- Stiel:** 0,8–1,5 (–2) × 8–10 (–12) cm. Gegen die Basis verdickt bis fast knollig. Auffallend längsgestreift, unter den Lamellen schwach faserig, weder Reste eines Velums noch eines Ringes zeigend.
- Fleisch:** Dünn im Hut, faserig-hohl im Stiel. Geschmack mehlig-bitter, ohne bestimmten Geruch.
- Lamellen:** Ziemlich gedrängt, mit Lamelletten, zuerst hellbraun, dann durch den tabakbraunen Sporenstaub bei Reife dunkler.
- Sporen:** 9–10 (–11,5) × 4,5–5 (–7) µm, zitronenförmig, mit gut sichtbarer dicker Wand.
- Cheilozystiden:** Keulen- manchmal schlauchförmig, ohne Anhängsel.
- Standort:** Auf Hackholzhäufen (Kastanie, Robinie, Esche), der vor ein paar Jahren deponiert wurde. In Tausenden von Exemplaren auf einem Acker vor dem Pflügen. Der Boden war mit Kompost gedüngt. Bedigliora (Malcantone), Kanton Tessin, Mai–Juni 1995 und 1996.
- Bemerkungen:** Wir erachten es als zweckmässig, diese Art in Wort und Bild vorzustellen, da sie relativ unbekannt und in der Literatur selten beschrieben ist. Sie wächst in zahlreichen Exemplaren, isoliert oder büschelig, vergesellschaftet mit *Agrocybe praecox* (Pers.:Fr.) Fayod und *Stropharia rugosoannulata* Farlow. Um den Anfängern die Bestimmung zu erleichtern, könnte man ihnen sagen, es handle sich um eine *Agrocybe praecox* ohne Ring!
- Fotografien und Zeichnungen:** A. Riva (Foto 1 im Habitat, Foto 2 im Atelier).
- Literatur und Ikonografie:** Siehe italienischen Text.
- Übersetzung:** Bernhard Kobler

Agrocybe putaminum (Mre.) Sing.

Alfredo Riva

Via Pusterla 12, 6828 Balerna

- Chapeau:** 4–6 (–8) cm, d'abord convexe, puis vite onduleux irrégulier et à marge lobée, presque aplani à maturité et avec un mamelon à peine marqué; surface hygrophane, jaune ocracé à brun ocracé pâle; cuticule non séparable, pelliculaire, presque excédente à la marge.

- Pied:** 0,8–1,5 (–2) × 8–10 (–12) cm, renflé vers la base, celle-ci pouvant être bulbeuse, remarquablement strié longitudinalement, un peu fibrilleux sous l'insertion des lames, dépourvu de restes de voile ou d'anneau.
- Chair:** mince dans le chapeau, fibreuse-fistuleuse dans le pied, saveur farineuse à amère, sans odeur particulière.
- Lames:** assez serrées, inégales, d'abord brun pâle, plus tard plus foncées par une sporée brun tabac.
- Spores:** 9–10 (–11,5) × 4,5–5 (–7) µm, citriformes, à parois nettement épaisses.
- Cheilocystides:** clavées, parfois utriformes, sans prolongement apical.
- Habitat:** sur tas de copeaux de bois (châtaignier, robinier, frêne) déposés deux ans auparavant et aussi sur terrain agricole herbeux et composté, avant le labour, par milliers d'exemplaires, Bedigliora (Malcantone) TI, mai–juin 1995 et 1996.
- Remarques:** nous pensons utile de signaler cette espèce, peu connue et peu représentée dans la littérature, et d'en publier une nouvelle iconographie. Elle vient en troupes nombreuses de basidiomes isolés ou cespiteux, en compagnie d'*Agrocybe praecox* (Pers.:Fr.) Fayod et de *Stropharia rugosoannulata* Farlow. Pour une première approche de détermination sur le terrain, on pourrait dire qu'il s'agit d'un *Agrocybe praecox* sans anneau.
- Photos et dessins au trait:** A. Riva (photo 1 in situ, photo 2 en laboratoire); légende des dessins, voir au bas de la page en italien.
- Littérature et iconographie:** cf. texte original en italien.
- Traduction:** F. Brunelli.
- N.d.t.:** Les deux caractères notés en gras dans la «Flore» de K. & R.: «naissant des noyaux enfouis de pruniers et de cerisiers» et «cystides... avec un prolongement... couvert d'oxalate calcique» ne sont pas constants.

* * *

Aus anderen Zeitschriften

Revue des revues

Spigolature micologiche

Bulletin de la Société Mycologique de France, Band 112, Heft 2, 1996

Guy Fourré: Les problèmes scientifiques et économiques liés aux importations massives de truffes chinoises

Seit September 1993 sind auf dem französischen Markt chinesische Trüffeln erschienen, die der «einheimischen» Art (*Tuber melanosporum*, «Périgord-Trüffel») äusserst ähnlich sind. Ende 1994 und anfangs 1995 wurden etwa 24 Tonnen importiert, zu einem mittleren Preis von 327 FF/kg. In der gleichen Zeit betrug die Ernte der französischen Trüffel ca. 10 Tonnen und der Preis erreichte auf gewissen Märkten 4000 FF/kg.

Bei der chinesischen Trüffel handelt es sich um *Tuber indicum* Cooke & Masee; die Art wurde zuerst aus Indien (aus dem Westen von Nepal auf 3000 m Höhe) beschrieben. Sie hat etwas flachere Warzen als die Périgord-Trüffel. Auch das Aroma ist etwas anders, was allerdings nur von Spezialisten festgestellt werden kann. Am besten kann sie mikroskopisch an den Nadeln der Sporen unterschieden werden. Die französischen Importe stammen aus der Volksrepublik China (aus Ausläufern des Himalaya).

H. Baumgartner, Wettsteinallee 147, 4058 Basel