

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft  
**Band:** 20 (1913)

**Artikel:** Die Grossschmetterlinge von Frauenfeld und der weitem thurgauischen Umgebung  
**Autor:** Wehrli, Eugen  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-594040>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 19.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Die Großschmetterlinge von Frauenfeld und der weitem thurgauischen Umgebung.

Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Kantons Thurgau.

Von Dr. Eugen Wehrli, Augenarzt in Frauenfeld.

Vorliegende Arbeit bringt eine Bereicherung der bisher bekannten Lepidopteren des Thurgaus um 22 Gattungen, 133 Arten und 226 Varietäten und Abarten, ferner eine große Menge neuer sicherer thurgauischer Standorte<sup>1</sup> fast für alle seltenen Falter, die hier vorkommen.

Als neu<sup>2</sup> wurde aufgeführt, was in der thurgauischen Literatur bisher im engern Gebiete des Kantons nicht nachgewiesen worden war.

Außerdem gelang der Nachweis einer ganzen Anzahl in der Schweiz bisher nicht gefangener Arten und Abarten. Es konnten auch einige bisher nicht beschriebene, überhaupt neue Formen aufgestellt werden, einzelne vielleicht Produkte der abnormen klimatischen Verhältnisse der Jahre 1911 und 1912, welchen jedenfalls eine gewisse Einwirkung auf die Bildung vieler ungewöhnlicher Varietäten, im Sinne von Temperaturaberrationen, nicht abgesprochen werden kann.

Eine so wesentliche Bereicherung der thurgauischen Lepidopterenfauna wäre nach den bereits vorliegenden, recht vollständigen Verzeichnissen mehrerer erfolgreicher Sammler nicht möglich gewesen, wenn nicht größeres, eigenartiges, fast ganz unerforschtes Gebiet zur Verfügung gestanden hätte, und wenn der Fang nicht nach ganz bestimmten Richtlinien erfolgt wäre, welche durch die vorausgegangene, sehr intensive

<sup>1</sup> Die neuen Standorte sind durch Kursivschrift hervorgehoben.

<sup>2</sup> Für das Gebiet neue Falter sind mit einem Sternchen bezeichnet.

Erforschung der Pflanzenwelt, ganz besonders der Umgebung von Frauenfeld, und durch Verwertung der pflanzengeographischen Verhältnisse speziell des Thurggebietes sich ergaben<sup>1</sup> und welche mir eine monographische Bearbeitung des Materials aufzwangen.

Als erstem, sehr ergiebigem Areal, einer terra incognita im kleinen, wurde die größte Aufmerksamkeit zugewandt dem Inundationsgebiete der Thur mit seinen ausgedehnten Schilfdschungeln und vielen Altwassern, seinen großen zusammenhängenden, vielfach fast undurchdringlichen Dornen- und Weidendickichten und den unabsehbaren, meist trockenen Streue- und Schilfwiesen, die stellenweise, z. B. auf der großen Allmend, fast steppenartigen Charakter annehmen. In diesen Distrikten, welche auch eigenartige Vegetationsbilder hervorbringen, gelang der Nachweis mancher für die Schweiz und den Kanton neuer Arten und Abarten, und überdies stellte es sich heraus, daß hier viele, in unserer Heimat sonst sehr seltene Falter, die Bedingungen zu häufigem Vorkommen finden.

Auf ein zweites, ebenfalls kaum lepidopterologisch untersuchtes Gebiet habe ich dann auch mein besonderes Augenmerk gerichtet, nämlich auf das regenarme Xerophytengebiet, das Schaffhausen, Dießenhofen, den untern Thurlauf bis fast nach Frauenfeld, ferner Steinegg und Kalchrain in sich schließt. Von diesem, dem sog. Schaffhauserbecken, haben sich die westlichen und pannonisch-pontischen Florenbestandteile auf drei Wegen in den Thurgau ergossen; nämlich: 1) den warmen Hängen des Flußlaufes der Thur entlang; 2) über Stammheim-Hüttwilen ins Seetal und 3) dem Untersee entlang bis Konstanz.

Von diesen drei Invasionsdistrikten konnte besonders der erste, wesentlichste, dem Laufe der Thur folgend, in sehr zahlreichen Exkursionen besucht werden. Die vorausgegangene botanische und pflanzengeographische Erforschung kam hiebei ganz besonders zustatten, und es wurden denn auch beim Fange speziell die Standorte jurassischer und westlicher Pflanzen berücksichtigt.

<sup>1</sup> Beitrag zu einer Flora des Kantons Thurgau von *O. Nügel* und *E. Wehrli*. *Mitteilg. der Thurg. Naturf. Ges.* 1890, S. 121. — Neue Beiträge zur Flora des Kantons Thurgau. *Ibid.* 1894, S. 27. Von *Otto Nügel* und *Eugen Wehrli*. — Ueber die Pflanzengeographie des Thurgau. *Mitteilungen* 1898 und 1900. Von Dr. *Otto Nügel*, Zürich.

Vor allem sind es die weingesegneten Hänge und Lehnen des Höhenzuges des rechten Thurufers, von Ueßlingen, Ittingen, Weiningen, Ochsenfurt bis Pfyn, welche, Frauenfeld am nächsten gelegen, das Ziel sehr häufiger, meist nächtlicher, Exkursionen bildeten.

Als isolierter Vorposten jurassischer Pflanzen wächst z. B. bei Ittingen, wo anstehender nagelfluhartiger Fels sich findet, *Helleborus foetidus*, in Gesellschaft mit *Dentaria pinnata* u. a.

Von pannonisch-pontischen Einwanderern sind erwähnenswert bei Fahrhof-Neunforn *Cytisus nigricans*, *Linum tenuifolium*, *Globularia*, *Euphrasia lutea*; bei Ochsenfurt die drei *Genista*-Arten, *Anemone pulsatilla*, *Peucedanum Cervaria* und *Oreoselinum*, *Viola alba* u. a.

Ein kleiner Teil der genannten Arten geht noch weiter thuraufwärts, ferner auf das linke Thurufer und ins Murgtal, welches faunistisch bis Matzingen untersucht wurde.

Eine besondere Stellung nimmt botanisch der Sonnenberg-Immenberg ein, mit den westlichen Arten *Quercus pubescens*, *Rosa agrestis* und vielen pontischen Pflanzen.

Diese pflanzengeographische Abschweifung war notwendig, um das analoge Vorkommen vieler westlicher und jurassischer Falter und ihrer Abarten, die in unserem Gebiete nicht ohne weiteres erwartet werden konnten, zu erklären.

Alle diesbezüglichen Einzelheiten finden sich im vorliegenden Verzeichnisse niedergelegt; der mir nur sehr karg bemessene Raum verbietet mir leider, auf Details jetzt schon einzugehen; diese sollen in einer spätern Arbeit eingehende Würdigung finden. Hier mag nur folgendes kurz Erwähnung finden:

Betrachtet man die Regenkarte von *R. Billwiler* (Geogr. Lexikon der Schweiz, Bd. IV, S. 705), so fallen uns sofort als größere regenarme Trockengebiete (Regenmenge unter 90 cm) das bereits erwähnte große Schaffhauser und Thurgauer Gebiet auf, das fast bis Frauenfeld reicht und Steinegg und Kalchrain in sich begreift.<sup>1</sup> Größere regenarme Distrikte finden sich noch in der Gegend des Neuenburgersees, dann am Genfersee und im Rhonetal des Wallis. Kleinere Inseln dazwischen nur bei Baden (Aargau), Basel und im St. Galler und Graubündner Rheintal.

<sup>1</sup> Vgl. auch Dr. *Heß*, Die Niederschlags- und Abflußverhältnisse im Auf fanggebiete der Thur. Mitteilg. der Thurg. Naturf. Gesellsch. 1898. S. 58.

Die Gegend von Dießenhofen (Regenmenge 80,5 cm), die bei genauer Durchforschung noch vieles Neue bringen wird, ergab an bemerkenswerten westlichen Arten die *Eumenis fagi* var. *selene*, die *Epinephele Tithonus*, den *Carcharodus lava-terae* Esp. und die *Stegania cararia* Hb.

Für mehrere Falter läßt sich nun, eine interessante Tatsache, ein ganz isoliertes Vorkommen in den obengenannten, weit voneinander entfernten Trockengebieten konstatieren. So findet sich die *Agrotis umbrosa* Hb., ziemlich häufig bei Frauenfeld, in der Schweiz sonst nur noch in der Trockeninsel Baselland, dann in Deutschland in den regenarmen Strichen der Rheinebene bei Karlsruhe und Speier.

Die *Codonia quercimontaria* wurde bisher häufiger nur bei Frauenfeld und dann wieder in der Nähe der großen regenarmen Zone des Neuenburgersees (Auvernier, Biel, Büren) und im Wallis (Plan Cerisier und La Croix)<sup>1</sup> gefangen.

Die sehr seltene *Nola centonalis* Hb., von der hier sogar eine für die Schweiz neue Abart, ab. *fasciata* Rbl., vorkommt, fliegt außer an den warmen Hängen von Ittingen und Ochsenfurt nur noch im Walliser Rhonetal (Martigny, Fully, Sion, Sierre) und im Rheintale (Ilanz, Igis, Ragaz).

Eine ähnliche Verbreitung wie die vorige zeigen die *Tephro. extraversaria*, *expallidata*.

*Aplasta ononaria* wurde bei Herdern (82 cm) und Müllheim, außerdem noch im Basler (Hünigen), Genfer-, Walliser- und Neuenburger Trockengebiet erbeutet.

Diese interessanten Tatsachen, die ihr Analogon in der sprungweisen oder besser oasenartigen Verbreitung mancher Pflanzen finden (*Helleborus foetidus* kommt zwischen Aargauer Jura und Thurgau, weder im Kanton Zürich noch Schaffhausen, sondern nur noch bei Ittingen vor.<sup>2</sup> *Carex gynobasis* fehlt zwischen Neuenburg und Baden, 95 km, u. a.), beweisen deutlich, einen wie großen Einfluß die Nähe des Schaffhauser Beckens mit seinen vielen westlichen und östlichen Einwanderern auf unsere Fauna und Flora ausübt.

Dem nachahmenswerten Beispiel von *Vorbrodt* und *Reutti* folgend, die sich streng an die Grenzen ihres Landes hielten und nur das als schweizerisch bzw. badisch aufzählten, was

<sup>1</sup> Die außerkantonalen Angaben nach *Vorbrodt* l. c. z. Teil a. d. Manuskripte.

<sup>2</sup> *Nägeli*, Ueber westliche Florenelemente in der Nordostschweiz. Ber. d. schweiz. bot. Ges. 1905. Heft XV, S. 3 u. 9.

tatsächlich in ihrem Gebiete gefunden wurde, das übrige mit Fragezeichen, Kleindruck und in Klammern brachten, habe ich mich, dem Titel und den gesteckten Grenzen gemäß, durchaus an das thurgauische Kantonsgebiet gehalten; es widerstrebte mir, Tiere, die ausschließlich bisher nur in den Kantonen Zürich oder Schaffhausen oder in Südbaden gefangen wurden, als thurgauisch zu bezeichnen. Jeder Sammler weiß, daß sehr oft gerade Schmetterlinge ganz lokal in kleinsten Bezirken (kleine Wäldchen, Hänge oder Sumpfwiesen) vorkommen und auf Dutzende und mehr Kilometer im Umkreis niemals angetroffen werden. Ich nenne als typisches Beispiel die *Agrotis umbrosa*, welche nur an der Thur bei Frauenfeld an ganz umschriebener Lokalität zu finden ist und in der ganzen Schweiz sonst nur noch bei Liestal gefangen wurde. Es lassen sich ferner eine ganze Menge Falter geltend machen, die im Thurgau mehrorts und zum Teil nicht selten fliegen und die im angrenzenden Südbaden bisher nicht beobachtet worden sind, z. B. *Agrotis punicea*, *Coenobia rufa*, *Cod. quercimontaria*, *Lar. Blomeri*, *immanata*, *Asth. anseraria*, *Tephrocl. laquearia*, *expallidata*, *extraversaria*, *silenata*. Umgekehrt besitzt Baden eine ganze Anzahl im Thurgau durchaus fehlende Falter, von welchen nur der im Hegau vorkommende *Parnassius apollo* genannt sei.

Es sind in diesem Verzeichnisse auch einzelne Angaben aus älteren Sammlungen berücksichtigt worden, in welchen viele Tiere ohne genaue Zeit- und Fundortsangaben, neben ausländischen, durch Kauf oder Tausch oder durch Zucht fremden Materials erhaltenen, stecken. Ich habe mir Mühe gegeben, durch eigene Anschauung und gewissenhafte Erkundigungen mir ein Urteil über den Ursprung der Falter und die Zuverlässigkeit der Angaben zu bilden und glaube bezüglich Unterdrückung und Korrektur mancher derselben den richtigen Weg eingeschlagen und größere Fehler vermieden zu haben. Natürlich war es von Wert, die Angaben der ältern Sammler durch neuere Funde zu bestätigen.

In der Nomenklatur bin ich dem im Erscheinen begriffenen Werke *Vorbrodts* (Die Schmetterlinge der Schweiz), gefolgt, auf welches ich auch, was die Literatur anbetrifft, verweise. Seine auf den Thurgau sich beziehenden Angaben, besonders die von *Müller-Rutz* (M.-R.) habe ich ebenfalls verwertet.

Weitaus der größte Teil meiner Falter wurde durch Lichtfang und Ködern erhalten, durch Zucht nur sehr wenig, speziell fast keine Abarten. Die Fangmethoden haben, wie *Müller-Rutz*<sup>1</sup> durch Vergleiche schlagend nachgewiesen, auf die Häufigkeitsangaben einen bestimmenden Einfluß. Ein Sammler, der viel züchtet, wird in dieser Beziehung bei manchen Tieren zu andern Resultaten kommen als ich.

Alle Standortsangaben, hinter welchen kein Autor in Klammern beigefügt ist, rühren vom Verfasser her; für alle diese Falter befinden sich Belegexemplare mit genauer Bezeichnung des Orts und der Zeit des Fanges in seiner Sammlung.

Zum Schlusse bleibt mir noch die Erfüllung der angenehmen Pflicht, allen den Herren, die mir bei dieser Arbeit ihre Unterstützung angedeihen ließen, meinen besten Dank auszusprechen. Ganz besonders verpflichtet bin ich Herrn Prof. *Standfuß* in Zürich und Herrn Oberstl. *Vorbrodt* in Bern, welche die Güte hatten, mir zahllose Falter zu bestimmen und zu verifizieren. Letzterer hat es sich nicht verdrießen lassen, meine Sammlung und mein Manuskript durchzusehen und mehrere Hundert ihm zugesandte Eupithezien, ebensoviel Zygänen und eine Menge anderer Schmetterlinge schwieriger Gattungen, zum Teil in Verbindung mit Herrn *De Rougemont*, zu sichten und zu bestimmen. Einzelne fragliche Arten wurden an Herrn *Püngeler* in Aachen zur Determination gesandt.

Herr *Ziegler-Reinacher* (Z.-R.) stellte mir zur Durchsicht seine überaus reichhaltige Sammlung, Herr Lehrer *Braun* in Steckborn die Schalchsche Sammlung, die Herren *Guhl* und *Spillmann* in Steckborn ihre kleinen Privatsammlungen und Herr Prof. *Wegelin* die Sammlungen Eugster und Sulzberger des nat.-hist. Museums in Frauenfeld in dankenswerter Weise zur Verfügung. Herr *Pfähler*, Apotheker in Schaffhausen, sandte mir sehr zuvorkommend, nebst seinen eigenen Beobachtungen, das Verzeichnis der Lepidopteren von Schaffhausen von Wanner-Schachenmann, das einige sehr interessante thurgauische Angaben enthält.

Die Abkürzungen sind dieselben wie in der *Wegelinschen* Zusammenstellung<sup>2</sup>; dieser habe ich auch ganz vereinzelt

<sup>1</sup> *Müller-Rutz*, Jahresber. der St. Galler Naturwiss. Ges. 1897/98.

<sup>2</sup> *H. Wegelin*, Beiträge zur Schmetterlingsfauna des Kts. Thurgau. Mitteilg. der Thurg. Naturf. Ges. Heft XVIII.

Standortsangaben von *Müller-Rutz*, *Himmel*, Dr. *Gramann* und *v. Bodman* stammend entnommen (alle unter Nennung des Namens des Fängers), da, wo eigene Fundorte fehlten, oder wo es von allgemeinem Interesse zu sein schien.

## Rhopalocera.

### Papilio L.

Podalirius L. n. s.

\* *ab. undecimlineatus* Eim. Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. ornatus* Wheel. Aadorf (Z.-R.).

Machaon L. h.

\* *ab. bimaculatus* Eim. Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. dissolutus* Sch. (= fenestrella Cuno). Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. immaculatus* Schultz. 1 Stück Frfld.

\* *ab. convexifasciatus* Cuno. Aadorf (Z.-R.), F'feld.

\* *ab. concavifasciatus* Cuno. Aadorf (Z.-R.), F'feld.

\* *ab. rufopunctatus* Wh. Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. rubromaculatus* Schultz. F'feld.

### Aporia Hüb.

Crataegi L. n. s.

### Pieris Schranck.

Brassicae L. g.

Rapae L. g.

Napi L. z. h.

*ab. napaeae* Esp. Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. napella* Lamb. Aadorf (Z.-R.). Von *Lycaena*-Größe; von Herrn Ziegler 1911 im Garten gefangen. 1 Stück.

\* *ab. intermedia* Krul. Hüttwilen.

Daplidice L. *Steckborn* (Schalch). Aadorf (Z.-R.). *Schaaren* (Wanner).

### Euchloë Hüb.

Cardamines L. h.

\* *ab. immaculata* Pabst. Aadorf (Z.-R.)



**Leptidia** Billb.

Sinapis L. h.

var. Lathyri Hüb. *F'feld*.

var. Diniensis Hb. Bernrain (Himmel).

**Colias** Fabr.

Hyale L. h.

\**ab. obsoleta* Tutt. u. *unimaculata* Tutt. Aadorf (Z.-R.)

Edusa Fab. h.

ab. Helice Hüb. Aadorf (Z.-R.)

**Gonepteryx** Leach.

Rhamni L. g.

**Apatura** Fab.Iris L. n. s. *F'feld*, *Herdern*, *Steckborn*, *Murkart* etc.Ilia Schiff. s. *Steckborn* (Guhl, Schalch).var. Clytie Schiff. Viel häufiger als die Stammform.  
*F'feld*, *Murkart*, *Steckborn* (Schalch).**Limenitis** Fab.

Sibilla L. h.

Camilla Schiff. s. *F'feld*, Aadorf n. s. (Z.-R.), *Steckborn*  
(Schalch).Populi L. s. *F'feld*, *Gachnang*.ab. Tremulae Esp. ♂ *Steckborn* (Schalch), *F'feld*.**Pyrameis** Hüb.

Atalanta L. n. s.

\**ab. fracta* Tutt. Aadorf (Z.-R.).

Cardui L. h.

**Vanessa** Fab.

Jo L.

\**ab. cyanosticta* Rayn. *F'feld* 2 Ex., Aadorf (Z.-R.).

Urticae L. g.

Polychloros L. n. s.

Antiopa L. z. h.

**Polygonia** Hüb.

C.-album L. s. h.

\**ab. hutchinsoni* Kob. Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. variegata* Tutt., pallidior Tutt. F'feld.

\* *ab. pusilla* Stz. Unter der Stammform. F'feld.

*Arachnia* Hb.

\* *levana* L. var. *prorsa* L. Steckborn (Guhl) 1 Ex.; wohl vom benachbarten Baden, wo die Art nach Reutti verbreitet ist, verflogenes Stück.

**Melitaea** Fab.

Aurinia Rott. h.

Cinxia L. h.

Phoebe Knoch. *Steckborn* (Schalch), *Aadorf* (Z.-R.)

Didyma O. n. s.

Athalia Rott. h.

ab. *navarina* Selys. *Aadorf* (Z.-R.).

Parthenie BKh. g.

Dictynna Esp. n. s.

**Argynnis** Fab.

Selene Schiff. s. *Murkart*, *F'feld*.

Euphrosyne L. h.

\* *ab. transversa* Tutt. (Vorbr. S. 58.) Zwei gute Uebergangsstücke von Frauenfeld und Nergeten.

Dia L. h.

\* *ab. vittata* Spul. Herdern 1 Expl.; die breite schwarze Mittelbinde nicht ganz vollständig.

Ino Esp. n. s.

Lathomia L. n. s.

Aglaja L. h.

Niobe L. s.

var. *Eris* Meig. *F'feld* 2 Stück, *Aadorf* (Z.-R.).

Adippe L.

\* *ab. bajuvarica* Sp. *Aadorf* (Z.-R.).

Paphia L. h.

ab. *valesina* Esp. *F'feld*.

**Melanargia.**

Galathea L. g. In der Form *fulvata* Lowi. (Vgl. Vorbrodt, S. 70).

\* *ab. flava* Tutt. *Aadorf* (Z.-R.).

\* *ab. vispardi* Jull. *Aadorf* (Z.-R.).

**Maniola** Schck. (= *Erebia* Dal.).

Medusa Fab. h.

*ab. mantoides* Gram. F'feld. 1 Uebergangsstück.

Aethiops Esp. (*Medea* Hüb.) h.

*ab. Leucotoenia* Stdg. *Herdern*, Aadorf (Z.-R.).

Ligea L. h.

*Eumenis* Scop. (*Satyrus* Latr.)

\* *fagi* Scop. (= *hermione* L.) Stammform fehlt.

\* *ab. selene* Fourer. Schaarenwald bei Dießenhofen. (Vorbrodts det.) Siehe Vorbrodts Bd. I, S. 88. (Ferner bei Gailingen gegenüber Dießenhofen [Wanner]).

**Satyrus** Latr.

Semele L. z. s. F'feld, *Steckborn* (Guhl), Aadorf (Z.-R.).

Dryas Sc. (*Phaedra* L.). n. s.

\* *var. Tripunctatus* Neubgr. Sonnenberg.

**Pararge** Hüb.

Aegeria L. var. *Egerides* Stg. h. auf Waldwegen.

\* *ab. pallida* Tutt. Sonnenberg.

Megera L. h.

Maera L. *Herdern*, *Hörnli* h., sonst s. *Steckborn*.

Achine Sc. (*Dejanira* L.). F'feld. n. s.

**Aphantopus** Wall.

Hyperantus L. h.

*ab. arete* Müll. Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. vidua* Müll. F'feld.

**Epinephele** Hüb.

Jurtina L.

\* *ab. Caeca* Rbl. F'feld.

\* *Tithonus* L. Langwiesen; hart an der thurgauischen Grenze (Wanner).

**Coenonympha** Hüb.

\* *Iphis Schiff.* s. s. F'feld. 1 Stück (Koll. Sulzberger). Unbestimmt unter *hero* L.

*Hero* L. F'feld an verschiedenen Standorten. n. s.

*Arcania* L. h.

\* *ab. obsoleta* Tutt. *Herdern*.

Pamphilus L. g.

\* *ab. bipupillata* Cosm. Hungersbühl, Ochsenfurt. Nur die Unterseite der V. fl. typisch verändert.

Tiphon Rott. s. F'feld, Hüttwilen n. s.

var. *Philoxenus* Esp. *Hüttwilerseen, Aadorf* (Z.-R.)

### **Nemeobius** Steph.

Lucina L. z. h. *F'feld, Rohr, Sonnenberg, Ittingen.*

### **Thecla** Fab.

Linceus Esp. (= Spini Schiff.). s. *Murkart, F'feld.*

\* *W-album* Kn. s. F'feld 1910 n. s., seither nicht mehr gef. Aadorf (Z.-R.).

Ilicis Esp. s. *Murkart.*

Pruni L. s. *Ochsenfurt, F'feld.*

[Acaciae F. Die Angabe Aadorf beruht auf Irrtum.]

### **Callophrys** Billb.

Rubi L.

\* *ab. caecus* Geoffr. F'feld. Nur 1 weißer Punkt auf den h. Fl. Aadorf (Z.-R.).

### **Zephyrus** Dalm.

Quercus L. s. *Steckborn* (Schalch), Aadorf (Z.-R.), F'feld.

Betulae L. n. h. F'feld, *Steckborn* (Guhl).

\* *ab. spinosae* Gerh. Aadorf (Z.-R.).

### **Chrysophanus** Hüb.

Hippothoë L. s. *F'feld, H'dern, Hörnli.* n. s. *Schaaren* (Wann.).

Tityrus Poda (= Dorilis Hufn.). h.

\* *ab. fulvomarginalis* Schultz Gottl.

\* *ab. fulva* Lamb. Unter d. Art. n. s.

Phlaeas L. s. *Steckborn* (Schalch), Aadorf (Z.-R.), F'feld (Koll. Sulzberger), Tägerwilen (Himmel).

### **Tarucus** Moore (= Lampides Hb.).

Telicanus Lang. Am 4. resp. 11. IX. 1891 am Gaißberg ob Kreuzlingen von Himmel gefangen.

### **Everes** Hb.

Argiades Pall. (= amyntas S. V.). s. *Herten, Blumenstein.*

Die kleine Form polysperchon Bergstr. Aadorf (Z.-R.), F'feld (nat.-hist. Mus. vielfach).

**Zizera** Moore.

Minimus Füßlin (= alsus S. V.) h.

**Lycaena** Fab.

Argus Schiff. (= false, Argus L. = argyrognomon Bergstr.).

n. h. F'feld, Horn (lokal h.).

\* *ab. caerulea* Courv. Horn.

\* *Aegon* Schiff. n. s. F'feld, Horn, Ittingen, Thur.

Medon Esp. (= astrarche Bgstr.). Herdern, Aadorf (Z.-R.),  
Hudelmoos (M.-R.).

Icarus Rott. sehr g.

*ab. caerulea* Fuchs. n. s. F'feld von verschiedenen  
Standorten.

\* *ab. punctifera* Courv. s. s. Von d. gr. Allmend.

Zeichnungsaberrationen:

\* *Crassipuncta* Courv. Unter der Art. F'feld. z. h.

\* *centrijuncta* Courv. Sonnenberg, Kalchrain, Horn,  
F'feld. Nicht typisch, nur Uebergänge.

\* *costa-juncta* Courv. F'feld. 1 Stück. Neu für die  
Schweiz.

\* *retro-juncta* Courv. F'feld. 1 Stück. Neu für die  
Schweiz.

\* *arcuata* Courv. (= polyphemus Esp.). n. s. Häufigste  
Zeich. ab.

\* *semiarcuata* Courv. s. 1 Exempl. von *coerulea* auf  
1 V. fl. Ochsenfurt.

\* *limbo-juncta* Courv. Sonnenberg, Murkart.

\* *multiconfluens* Courv. Typ. d der Tabelle Courv.<sup>1</sup>  
s. s. Rohr. 1 Stück. Neu für die Schweiz.

\* *tripuncta* Courv. Mehrfach um F'feld.

\* *parvipuncta* Courv. Unter der Art.

\* *unipuncta* Courv. = *iphis* Meig. F'feld. n. s.

\* *Alexius* Frr. (= *impuncta* Courv. = *icarinus* Scrib.) n. s.  
F'feld. Siehe Vorbrodts, S. 461.

Hylas Esp. s.

\* *ab. novapuncta* Courv. Sonnenberg.

Bellargus Rott. n. s.

*ab. coerulea* Courv. (= *Ceronus* Esp.). F'feld n. s.  
unter der Art.

<sup>1</sup> Siehe Vorbrodts, Die Schmetterlinge der Schweiz, Bd. I, Lief. 2.

ab. *punctulata* Courv. (= *punctifera*). F'feld.

\* *ab. salacia* Bergstr. s. s. F'feld.

\* *ab. tripuncta* Courv. F'feld. Mehrfach.

\* *ab. unipuncta* Courv. Ebenso.

\* *ab. impuncta* Courv. s. 1 St. von F'feld; aber nur der r. Vfl., der l. *unipuncta* Courv.

\* *ab. centrojuncta* Courv. s. Von Herdern 1 Exempl. (nur Uebergang).

Coridon Poda. g.

\* *ab. pallida* Tutt. Aadorf (Z.-R.).

ab. *caeca* Courv. (= *cinnus* Hb.) Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. quadripuncta* Courv. s. Kalchrain. 2 Exempl.

\* *ab. tripuncta* Courv. s. Kalchrain. 1 Exempl.

\* *ab. impuncta* Courv. s. Kalchrain 1 Exempl.

\* *unipuncta* Courv. s. Kalchr. Nur auf dem r. Vfl. eines Exemplars typisch, der andere normal.

\* *paucipuncta* Courv. s. F'feld.

\* *semiarcurata* Courv. s. Von Ochsenfurt. 1 St.

Damon Schiff. In manchen Jahren häufig, dann wieder völlig verschwunden; z. B. in den letzten 3 Jahren um F'feld kein Stück zu fangen. Alle meine Exemplare stammen vom Hörnli, wo er häufig war.

\* *ab. parvipuncta* Courv. } vom Hörnli in einem Expl.  
\* *ab. paucipuncta* Courv. }

Semiargus Rott. h. besonders auf Rietwiesen.

Cyllarus Rott. s. F'feld, Rohr.

Alcon F. s. F'feld (Thur), Steckborn, Schaaren (Wanner).

\* *ab. novopuncta* Courv. Untersee bei Steckborn. Vfl. je einen Basalpunkt tragend.

Euphemus Hüb. s. Schaarenwiese b. Dießenhofen (Wanner).

Arion L. selten und einzeln. F'feld, Herdern, Steckborn.

### Cyaniris Dalm.

Argiolus L. h.

### Pamphila F.

Palaemon Pall. h.

### Adopaea Billb.

Lineola O. s. Bisher nur von Herdern u. Ittingen je 1 St.

Thaumas Hufn. h.

Actaeon Esp. g.

**Augiades** Hüb.

Comma L. h.

Sylvanus Esp. h.

**Carcharodus** Hüb.

\* *Lavaterae* Esp. Schaaren (Wanner).

Alceae Esp. s. *Aadorf* (Z.-R.) s. 1 Stück. *Schaaren* (Wanner).

Althaeae Hb. *F'feld* mehrfach aber n. h.

**Hesperia** Latr.

[*Carthami* Hüb. Elgg (Gramann).]

\* *Serratulae* Rbr. *F'feld* (Murkart). 1 Stück.

Sao Hüb. n. s. bei *F'feld*.

Alveus Hüb. s. *Aadorf* (Z.-R.).

Malvae L. g.

**Thanaos** Boisd.

Tages L. h.

## Heterocera.

**Acherontia** Ochsenfurt.

Atropos L. s. *F'feld*, *Steckborn* (Schalch).

**Sphinx** L. (= *Smerinthus* O.).

Ocellata L. h.

**Amorpha** Kirb.

Populi L. n. s. In dunkelgrauen Stücken.

\* *ab. grisea*. s. Rötlich bis rotbraun.

\* *ab. ferruginea* — *fasciata* Gillm.

\* *ab. fuchsi* Bart. *Aadorf* (Z.-R.).

**Mimas** Hb. (= *Dilina* Dalm.).

Tiliae L. s. *F'feld*.

\* *ab. brunnea* Bart. *Steckborn* (Schalch), Nat.-histor. Sammlg. *F'feld*.

\* *ab. Centripuncta* Clark. *F'feld* (Wegelin) Nat.-hist. Sammlg.

**Deilephila** Lasp.

Nerii L. 1 Exemplar gez. aus in F'feld gefundenen Raupen  
(von Herrn Lehrer Steiger, 1877). Auch Koll. Sulzbgr.

**Herse** Oken (= *Protoparce* Burm.).

Convolvuli L. h.

\* *ab. obscura* Tutt. Aadorf (Z.-R.).

**Hyloicus** Hüb.

Pinastri L. n. s. Oefters am Licht.

\* *ab. virgata* Tutt. Murkart b. F'feld.

Ligustri L. h. Kommt gern ans Licht.

**Celerio** Oken (= *Deilephila* Ochsh.).

Vespertilio Fab. F'feld (Sulzberger). 1 St. in meiner Sammlung,  
von Sulzberger erhalten.

Galii Rott. s. s. Aadorf (Z.-R.).

Euphorbiae L. n. h. F'feld, *Steckborn* (Guhl, Spillmann).

*ab. rubescens* Garb. F'feld (Koll. Sulzberger).

Lineata Fab. var. *Livornica* Esp. s. s. Im Jahre 1883 mehrfach an Gartenverbennen erbeutet

**Pergesa** Walk (= *Chaerocampa* Dup.).

Elpenor L. h.

**Metopsilus** Duncan.

Porcellus L. h.

\* *ab. clara* Tutt. Aadorf (Z.-R.).

**Pterogon** Boisd.

Proserpina Pall. s. s. Aadorf (Z.-R.) vielfach, F'feld 1 Expl.  
(Koll. Sulzbgr.).

**Macroglossa** Scopoli.

Stellatarum L. g.

**Haemorrhagia** Grote (= *Hemaris* Dalm.).

Tityus L. (= *bombylifomis* Esp. = *scabiosae* Z.) n. s. F'feld.

Fuciformis L. (= *bombylifomis* O.). F'feld wie vor., etwas häufiger.

**Cerura** Schranck.

Furcula L. s. Ochsenfurt.



Bifida Hüb. s. *F'feld* (Gas). Von der *Thur* mehrere Expl. durch Lichtfang im Mai.

**Dicranura** Boisd.

Vinula L. h.

**Stauropus** Germar.

Fagi L. Die zweite Generation Juni-Juli rings um *F'feld* nicht selten am Licht (7. VI.—14. VII. 11 u. 12); von der ersten noch kein Stück erbeutet. Ob gewöhnlich nur eine Generation im Freien?

**Hoplitis** Hüb.

Milhauseri Fab. Bisher nur Kreuzlingen (Bodman). Bei Moos-Häuslenen am Stamme einer großen einzelnen Eiche leere Kocons gefunden.

**Gluphisia** Boisd.

Crenata Esp. Mehrfach um *Ittingen* und von der *Thur*, alle im Juni.

**Drymonia** Hüb.

\* *Querna* F. s. s. 1 Stück von der *Thur*, *F'feld*.

*Trimacula* Esp. Wie vorige. *F'feld*.

\* *ab. Dodonaea* Hb. Häufiger als die Stammform. *F'feld*.

*Chaonia* Hüb. s. Die häufigste der 3 Arten, mehrfach um *F'feld*.

**Pheosia** Hüb.

*Tremula* Cl. (*Dictaea* Esp.). s. *F'feld*. 1 Exempl. an Gaslat.

*Gnoma* F. (= *Dictaeoides* Esp.) s. 2 Stück von der *Thur F'feld*.

**Notodonta** Ochsh.

*Ziczac* L. h.

*Dromdarius* L. Seltener als vorige Art. 1 Exemplar von *Ittingen*.

*Phoebe* Sb. (= *Tritophus* S. V.). s. s. *F'feld* 1 Stück (6.VI.11).

*Tritophus* Esp. (*Torva* Hüb.) Aadorf n. s. am Licht (Z.-R.), *F'feld* (Koll. Sulzbgr. 2 St.).

\* *Anceps* Goetze (= *trepida* Esp.). Um *F'feld* n. s. am Licht Mai-Juni.

**Ochrostigma** Hüb.

Melagona Bkh. Von mehreren Standorten bei *F'feld*.

\* *Velitaris* Rott. Aadorf (Z.-R.). 2 Stück.

**Odontosia** Hb.

\* *Carmelita* Esp. s. s. Aadorf (Z.-R.).

**Lophopteryx** Steph.

Camelina L. *F'feld*. h. an Licht bes. a. d. Thur.

ab. *Giraffina* Hüb. Aadorf, *F'feld*.

Cuculla Esp. s. s. *F'feld* 3 Stück; auch von Aadorf (Z.-R.).

**Pterostoma** Germ.

Palpina L. *F'feld* am Licht g.

**Ptilophora** Steph.

Plumigera Esp. s. *F'feld*. 1 Stück gez. *Rohr*.

**Phalera** Hüb.

Bucephala L. g.

**Pygaera** Ochsh.

Anastomosis L. s. Thur bei *F'feld*, mehrfach am Licht.

\* *ab. tristis* Stdgr. s. Thur bei *F'feld* mehrere Expl.

Neu für die Schweiz.

Curvatula L. n. s. *F'feld*, *Thur*.

Anachoreta F. Etwas seltener als vorige, von den *gleichen Standorten*; auch von *Murkart*.

Pigra Hfn. *F'feld* n. h.

\* *ab. obscurior* Stgr. 1 dunkles Uebergangsstück *F'feld*.

**Thaumetopoea** Hüb.

Processionea L. Fast jedes Jahr werden im Kanton Raupennester gefunden; doch verursacht die Raupe keinen nennenswerten Schaden. Die Raupenhaare können sehr gefährliche Augenentzündungen hervorrufen. Vorsicht bei Zucht!

**Orgyia** Ochsh.

Gonostigma F. *F'feld*. 1 ♂ gez. *Steckborn* (Schalch). 1 Expl.

Antiqua L. h.

**Dasychira** Steph.

Fascelina L. n. h. *Steckborn* (Schalch). Aadorf (Z.-R.).  
 Pudibunda L. An Licht sehr g.

**Euproctis** Hüb.

Chrysorrhoea L. F'feld, *Steckborn* (Schalch).  
 \* ab. *punctigera* Teich. Aadorf (Z.-R.).

**Porthesia** Steph.

Similis Fueßl. F'feld, *Steckborn* (Schalch).

**Arctornis** Germ.

L-nigrum Müll. Nicht selten am Licht, von verschiedenen Standorten rings um *F'feld*. — Die Farbe dieses Falters wird als weiß beschrieben; meine Exemplare sind alle stark grünlich überflogen.

**Stilpnotia** Westw.

Salicis L. n. h. *F'feld*, *Nergeten*, *Thur*, *Steckborn* (Schalch).

**Limantria** Hüb.

*Dispar* L. *Steckborn* (Schalch), *Schaaren* (Wanner), *Kreuzl.* (Himmel). 1 St.  
*Monacha* L., Alljährlich in vereinzelt Exemplaren, am Licht, ♂ von verschiedenen Standorten, besonders über der *Thur*.

**Malacosoma** Hüb.

Neustria L. h.  
 \* ab. *virgata* Tutt. Aadorf (Z.-R.).  
 \* ab. *pyri* Scop. F'feld.  
 \* ab. *unicolor* Aig. Aadorf (Z.-R.).  
*Castrense* L. Aadorf (Z.-R.). 1 Stück gez., Raupe von dort.  
*Populi* L. *Steckborn* (Schalch), *F'feld* (Koll. Sulzbgr).

**Trichiura** Steph.

Crataegi L. *Steckborn* (Schalch), F'feld.

**Eriogaster** Germ.

Lanestris L. F'feld (Koll. Sulzbgr.), *Steckborn* (Schalch).  
 Catax L. Dußnang (Eugster) Sammlungen.

**Lasiocampa** Schranck.

Quercus L. h.

Trifolii Esp. n. s.

ab. Iberica Gn. Aadorf (Z.-R.).

**Macrothylacia** Ramb.

Rubi L. h.

\* ab. *approximata* Tutt. Aadorf (Z.-R.).\* ab. *fasciata* Tutt. Aadorf (Z.-R.).\* ab. *unilinea* Tutt. Aadorf (Z.-R.).**Selenephora** Ramb.\* *Lunigera* Esp. Stammform fehlt bisher.\* ab. *lobulina* Esp. 1911 und 1912 von verschiedenen Stellen bei F'feld; alle Falter am Licht.**Cosmotriche** Hüb.

Potatoria L.

\* ab. *inversa* Caradj. Aadorf (Z.-R.).\* ab. *lutescens* Tutt. F'feld. 1 Uebergangsstück, dessen äußere Vfl.-Hälfte ockergelb gefärbt ist.**Epicnaptera** Ramb.Tremulifolia Hüb. s. F'feld (Koll. Sulzbgr.), *Steckborn* (Schalch).**Gastropacha** Ochsh.

Quercifolia L. Am Licht n. s.

**Odonestis** Germ.Pruni L. F'feld, *Steckborn* (Schalch), Aadorf (Z.-R.).**Dendrolimus** Germ.Pini L. Die graue Stammform selten, nur von der *Thur* bei F'feld; viel häufiger ist hier die braune, einfarbige:\* ab. *unicolor-brunnea* Rbl. in Föhrenbeständen; der Falter geht gern ans Licht.**Endromis** Ochsh.

Versicolora L. s. F'feld. 1 St. an Gaslaterne.

**Lemonia** Hüb.Dumi L. s. *Steckborn* (Schalch) mehrfach. Die Raupe bei F'feld. Aadorf (Z.-R.) in Mehrzahl.

**Saturnia** Schranck.

Pavonia L. h.

**Aglia** Ochsh.

Tau L. n. s.

**Drepana** Schranck.\* *Curvatula* Bkh. Aadorf (Z.-R.).Falcataria L. *F'feld* n. s.\* *Harpagula* Esp. s. *F'feld* (nat.-hist. Sammlg.).

Lacertinaria L. Aadorf (Z.-R.).

Binaria Hfn. *F'feld* mehrfach.Cultraria F. *F'feld* n. s.\* *ab. aestiva* Spr. *F'feld*. Sommerform.**Cilix** Leach.Glaucata Scop. *F'feld* öfter am Licht, besonders *jenseits der Thur.***Thyris** Ochsh.Fenestrella Scop. *F'feld*. n. s. Gern auf den Blütendolden von Sambucus und Valeriana; zwei Generationen, Mai und Juli.**Panthea** Hüb.Coenobita Esp. Im Kanton bisher nur ein Stück in Aadorf (Z.-R.), um *F'feld* am Licht n. s., *Murkart, Ittingen.* Auch die prächtige Raupe von *Ristenb.***Trichosea** Grote.Ludifica L. s. *F'feld* 1 Exempl.**Diptera** Hüb.Alpium Osbeck. *F'feld* am Licht n. s.**Demas** Steph.Coryli L. *F'feld* n. s.**Acronycta** Ochsh.

Leporina L. Aadorf (Z.-R) öfter aus der Raupe gez.

ab. *Bradyporina* Tr. Aadorf (Z.-R.), dort häufiger als die Stammform.Aceris L. *F'feld* n. h.

Megacephala F. F'feld h.

\* *Alni* L. Schaarenwald W. Sch.

Strigosa F. Aadorf (Z.-R.). Je 1 St. von d. *Thur* und von *Ittingen*.

Tridens Sch. F'feld.

Psi L. F'feld n. h.

(*Cuspis* Hüb. Aadorf (Z.-R.)?)

Auricoma T. F'feld am Köder g.

Euphorbiae F. Aadorf (Z.-R.) die Raupe öfter, aber ohne den Falter zu ergeben.

Rumicis L. h.

ab. *Salicis* Curt. Aadorf (Z.-R.).

### **Craniophora** Snell.

Ligustri F. F'feld am Köder und Licht n. s.

### **Agrotis** Ochsh.

Strigula Th. Nur von *Nergeten*; dort häufig am Licht, und beim Dämmerungsfang, an Heidekraut.

Signum F. Bei *Warth* h. am Licht.

Janthina Esp. s. F'feld, *Ochsenfurt*.

\* *ab. latemarginata* Rüb. 2 St. *Thur* b. F'feld.

Fimbria L. Nicht sehr häufig. F'feld, *Sonnenberg*, *Thur*.

\* *ab. solani* F. F'feld gez., *Wellenberg* (Köder).

\* *Punicea* Hb. Um F'feld an versch. Stellen häufig am Licht, besonders b. *Murkart*. Die Exemplare von 1912 kleiner als die von 1911.

Augur F. s. F'feld am Köder 9. IX. 11. 1 St.

Pronuba L. h.

ab. *Innuba* Pr. F'feld h.

\* *Orbona* Hfn. Aadorf (Z.-R.).

Comes Hüb. F'feld n. s. am Köder, auch im Garten.

Triangulum Hfn. F'feld h. am Licht und Köder.

Baja F. F'feld h. auf Disteln und am Köder.

\* *ab. grisea* Tutt. Unter d. Art n. s.

\* *Candelarum* Stgr. Vom Hörnli 1 St. 14. VII. 12. Aadorf (Sulzer).

C-nigrum L. h. bei F'feld.

Ditrapezium Bkh. *Wie vorige*.

*ab. nigrescens* (nov. ab.) mit schwarzviolettem V'flügel u. scharfer Zeichnung, gef. b. F'feld a. d. *Thur*.

Stigmatica Hüb. n. h. *F'feld* (Blumenstein), *Thur*, *Sonnenberg*.  
Xanthographa Fab. h. am Köder.

\* *ab. rufa* Tutt. *F'feld*.

\* *ab. nigra* Tutt. *F'feld*.

\* *Umbrosa* Hb. *F'feld* häufig am Köder und auf Distelnblüten  
an d. *Thur*, 1910 u. 1912.<sup>1</sup> In der Schweiz sonst nur  
noch b. Liestal gef.<sup>2</sup>

Rubi View. *Thur* bei *F'feld*. h. am L. 1 St. am Köder im  
Garten.

Brunnea F. *F'feld* n. s.

[*Dahli* Hb. Elgg (Gramann).]

Primulae Esp. *F'feld* h.

\* *ab. conflua* Tr. Vom Hörnli.

\* *Cuprea* Hb. 2 Stück vom Hörnli. 1 am Köder, 1 auf  
Distelblüte.

Plecta L. *F'feld* g.

\* *Leucogaster* Frr. Aadorf (Z.-R.). 2 Expl. am Köder beim  
Hause gef.

[*Birivia* Hüb. Elgg (Gram.), Kreuzl. (Bodman).]

\* *Decora* Hüb. 3 Stück vom Hörnli.

Putris L. *Thur* bei *F'feld* n. s., auch von *Murkart* 1 St.

*Cinerea* Hb. 2 St., eines an Gaslaterne *F'feld*, das andere  
von *Murkart* beim Lichtfang.

Exclamationis L. h. besonders am Köder.

\* *ab. pallida* Tutt. Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. rufescens* Tutt. *F'feld*.

\* *ab. picea* Hw. *F'feld*.

\* *ab. plaga* Stt. *F'feld*. 2 St. im Garten am Köder;  
auch 1 Uebergangsstück zur *ab. juncta* Tutt. Neu  
für die Schweiz.

\* *ab. quadrimacula* (nov. aberr.) Zwischen den 3 Makeln,  
unterhalb der Randmakel ein vierter isolierter,  
scharf begrenzter, tiefbrauner Fleck.

\* *ab. Wehrlii* Vorbrodtt nov. aberr. ♀ Form der  
*picea* Hw. Vfl. im Wurzel- und Saumfeld mit  
3—4 mm breiten ockergelb schillernden Quer-  
binden. V.

\* *Obelisca* Hb. *F'feld* (Koll. Sulzbgr).

<sup>1</sup> *Wehrli*, Mittlg. schweiz. eutom. Ges. Bd. XII, Heft 2, S. 48.

<sup>2</sup> *Seiler*, Noctuiden von Liestal. Tät.-Ber. Naturf. Ges. Baselland 1902/03, S. 57.

Ypsilon Rott. z. h. am Köder.

Segetum Schiff. Wie vorige.

\* *ab. pallida* Stgr. F'feld, Aadorf (Z.-R.).

\* *ab. nigricornis* Vitl. F'feld, Aadorf (Z.-R.).

Crassa Hüb. s. Aadorf (Z.-R.). 4 Stück.

\* *Trux* Hb. F'feld (Koll. Sulzbgr.). Aadorf (Z.-R.).

Praecox L. Aadorf (Z.-R.).

Prasina F. F'feld n. s.

Occulta L. Aadorf (Z.-R.).

### Sora Hem.

Rubricosa F. F'feld mehrfach.

\* *ab. rufa* Hw. Aadorf (Z.-R.).

Leucographa Hüb. F'feld seltener als vorige.

### Charaeas Steph.

Graminis L. s. s. F'feld 1 Stück.

### Epineuronia Rebel.

Popularis F. F'feld h. besonders an d. Thur.

Cespitis F. Aadorf (Z.-R.).

### Mamestra Hüb.

Leucophaea View. F'feld am Licht n. s. in einer Form, die wesentlich dunkler grau ist als die viel seltenere helle Stammform.

\* *ab. ravidata* Esp. F'feld, Thur. Mittelfeld dunkler, aber nicht maximal.

\* *ab. hilaris* (nov. aberr.) Wellenlinie und W'zeichen breit, lebhaft weiß, scharf, Zapfenmakel unscharf, Nieren- und Ringmakel breit weiß umrandet, auch die basalen Querlinien weiß ausgefüllt; die Pfeilflecken undeutlich und reduziert. Außenwinkel der Hinter-Fl. breit schwärzlich.

Advena F. F'feld am Licht s. Thur.

Nebulosa Hfn. h. am Licht. F'feld.

Brassicae L. g.

Persicariae L. h.

\* *Splendens* Hüb. s. F'feld (Thur), Wellenberg, Aadorf (Z.-R.).

(Von Kreuzlingen (Himmel) nur von der badischen Seite.)

Oleracea L. F'feld h.



Genistae Bkh. *F'feld* am Licht n. s.

Dissimilis Knoch. *F'feld* h. Kreuzlingen (Himmel).

\* *ab. W-latinum* Esp. *F'feld* (Thur).

\* *ab. confluens* Ev. Uebergänge von Ittingen.

\* *ab. errata* Gn. *F'feld* (Thur). Uebergangsformen.

Thalassina Rott. *F'feld* an vielen Stellen.

Contigua Vill. *F'feld*, *Ittingen*, *Murkart*, *Thur*.

Pisi L. g.

\* *Trifolii* Rott. 1 St. *F'feld*, Gaslaterne.

Nana Hufn. (= *Dentina* Esp.) h. am Licht.

*ab. latenai* Pier. *Ittingen*.

Reticulata Vill. *Aadorf* (Z.-R.), Müllh. (M.-R.).

\* *Marmorosa* Bkh. Alpin-jurassische Art. 1911 und 1912  
10 Exempl. von versch. Standorten bei *F'feld* am Licht  
erbeutet. Dunkle Stücke erinnern an

\* *ab. microdon* Gn. Ist sicher hier heimisch, da fast  
alle Falter tadellos und ungefliegen waren.

Chrysozona Bkh. *F'feld*.

Serena F. *F'feld* mehrfach.

### **Dianthoecia** Boisd.

Compta F. s. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.), *Steckborn* (Schalch),  
*Aadorf* 3 St. (Z.-R.).

\* *Capsincola* Hüb. s. *F'feld* (Thur), auch Koll. Sulzbgr.

Cucubali Füeßl. *F'feld* n. s.; häufigste der Gattung.

Carpophaga Bkh. s. *F'feld* (Thur), *Murkart*.

### **Bombycia** Steph.

Viminalis F. *F'feld* n. s. am Licht.

### **Miana** Steph.

Ophiogramma Esp. *F'feld*, *Thur* h. am Licht.

\* *ab. maerens* Stgr. s. s. *F'feld*, *Thur*, sonst nur noch  
von Büren (Rätzer) in d. Schweiz.

Strigilis Cl. h. am Licht.

Latruncula Hb. Viel seltener als vorige. *Thur*, *Wellenberg*.

\* *ab. aethiops* H. W. In Uebergangsformen *F'feld*.

Bicoloria Vill. h. am Köder.

\* *ab. furuncula* Hb. *F'feld*, *Aadorf* (Z.-R.).

\* *ab. rufuncula* Hm. *F'feld*, *Aadorf* (Z.-R.).

*ab. vinctuncula* Hb. *F'feld*, öfter am Köder, *Aadorf*  
(Z.-R.).

**Bryophila** Treischke.

Raptricula Hüb. *F'feld*. Veranda 2 Exempl.

\* *ab. Deceptricula* Hb. Aadorf (Z.-R.).

Fraudatricula Hüb. Aadorf (Z.-R.).

Ravula Hüb. *Murkart*.

\* *Muralis* Forst. *F'feld* (Koll. Sulzbgr., 2 Exemplare), Aadorf (Z.-R.).

Perla F. *F'feld*. Veranda 2 Exempl.

Algae F. s. *F'feld* (Garten). 1 St.

**Diloba** Boisd.

Caeruleocephala L. *F'feld* (Koll. Sulzbgr. 1 St.). (Die Raupe mehrfach), Steckborn (Schalch).

\* *ab. separata* Schultz. Aadorf (Z.-R.).

**Thalpophila** Hb. (= *Celaena* Steph.).

Matura Hfn. *F'feld*, *Thur* h. am Köder, *Sonnenberg*.

**Hadena** Schranck.

Porphyrea Esp. *F'feld* h.

\* *Funerea* Hein. s. *F'feld* 3 Exempl.

\* *ab. albomacula* Gramm. Aadorf (Z.-R.).

Adusta Esp. s. *F'feld*, *Hörnli*, Aadorf (Z.-R.).

Sordida Bkh. s. Nur von *Ittingen*.

\* *Furva* Hb. Aadorf (Z.-R.). 2 St.

Monoglypha Hfn. h.

\* *ab. intacta* Peters. *F'feld*, *Hörnli*.

\* *ab. obscura* Th. Mieg. *F'feld*.

\* *ab. infusata* Buch. Wellenberg b. *F'feld*.

\* *Lateritia* Hfn. *F'feld*, *Thur* (bisher nur von Wollmatingen).

Lithoxylea F. *F'feld* n. s. *Steckborn* (Schalch).

Sublustris Esp. *F'feld* n. s.

Rurea F. *F'feld* h.

*ab. Alopecurus* Esp. *F'feld* z. h.

Hepatica Hüb. s. *Ochsenfurt* 1 St.

\* *Scolopacina* Esp. *F'feld* n. h.

Basilinea F. *F'feld* g.

\* *Gemina* Hb. s. *F'feld*.

*ab. remissa* Tr. *F'feld*, Aadorf (Z.-R.).

\* *Illyria* Fr. Um *F'feld* an mehreren Orten am Licht (11 Exempl.).

Secalis Bjerk. h.

\* *ab. secalina* Hb. F'feld n. s. mit gelber und weißer Nierenmakel.

*ab. nictitans* Esp. F'feld.

*ab. leucostigma* Esp. F'feld mehrfach.

*ab. struvei* Rag. F'feld (Garten, am Köder), Thur.

*Apamea* Tr.

\* *Testacea* Hb. Aadorf (Z.-R.) 4 St. Schaaren (Wanner).

**Aporophila** Gn.

*Lutulenta* Bkh. Aadorf (Z.-R).

**Ammoconia** Lederer.

*Caecimacula* F. F'feld am Köder n. s.

**Polia** Ochsh.

*Chi* L. n. s. F'feld. Der Falter sitzt gern an Steinmauern.

**Brachionycha** Hüb.

*Sphinx* Hfn. Aadorf (Z.-R.), Amriswil (M.-R.), F'feld die Raupe mehrfach.

\* *Nubeculosa* Esp. Aadorf (Z.-R.).

**Miselia** Ochsh.

*Oxyacanthae* L. F'feld h. am Köder.

**Chariptera** Gn.

*Viridana* Walch. s. F'feld 2 Stück, Juli, am Licht. Müllh. (M.-R.).

**Dichonia** Hüb.

*Aprilina* L. s. F'feld am Köder.

**Dryobota** Led.

*Protea* Bkh. F'feld (Koll. Sulzbgr.) 2 St., Aadorf (Z.-R.).

**Dipterygia** Steph.

*Scabriuscula* L. F'feld (Koll. Sulzbgr.) 1 Stück.

**Hyppa** Dup.

[*Rectilinea* Esp. Wollmatingen (Himmel).]

**Rhizogramma** Led.

*Detersa* Esp. (*Petrorhiza* Bkh.). F'feld s., auch am Köder.

**Chloantha** Gn.

Radiosa Esp. Aadorf (Z.-R.). (1 Stück bezettelt mit Aadorf.)

Polyodon Cl. *F'feld* n. s. am Licht.

Hyperici F. Aadorf (Z.-R.). (Fraglich; 2 gekaufte und 2 un-  
bezeichnete Exempl.)

**Trachea** Hub.

Atriplicis L. *F'feld*, *Steckborn* (Schalch).

**Euplexia** Steph.

Lucipara L. *F'feld* am Licht g.

**Phlogophora** Tr.

Scita Hüb. *F'feld* (Koll. Sulzbgr. 3 St.), *Steckborn* (Schalch).

**Brotolomia** Led.

Meticulosa L. *F'feld* h. am Köder.

**Mania** Tr.

Maura L. n. s. am Köder und unter Brücken.

\* *ab. striata* Tutt. Ein der südlichen Form nach Vor-  
brodt nahekommendes Stück von Ochsenfurt. Auch  
von Aadorf (Z.-R.).

**Naenia** Steph.

Typica L. s. *F'feld* am Köder n. s. besonders an d. *Thur*,  
1 St. im Garten.

**Helotropha** L. D.

\* *Leucostigma* Hb. *F'feld*, *Thur* z. h. am Licht. Erhält durch  
diese Fänge erst das Heimatrecht in der Schweiz.

\* *ab. albipuncta* Tutt. unter d. Art. Neu f. d. Schweiz.

\* *var. fibrosa* Hb. *F'feld*, *Thur*.

\* *ab. lunina* Hw. *F'feld*, *Thur*. Neu für die Schweiz.

**Hydroecia** Gn.

Nictitans Bkh. *F'feld* n. s.; auch vom Hörnli.

\* *ab. erythrostigma* Hw. *F'feld*, *Thur*.

Micacea Esp. z. h. *F'feld*, *Thur* h. am Licht. Auch im  
Garten am Köder. In helleren und dunkleren graubraunen  
und braunen Exemplaren; kleine nur 13 mm Größe  
statt 17—20. 1912. *Thur*. Kreuzl. (Himmel).

**Gortyna** Hüb.

Ochracea Hüb. Aadorf (Z.-R.) mehrfach.

**Nonagria** O.

\* *Typhae* Thunb. F'feld 1 Stück am Licht. (Schloß.)

\* *Neurica* Hb. F'feld, Thur.<sup>1</sup> n. s. 1910, 1911 und 1912, sonst s. s. Durch den Fang in mehreren Jahren und in größerer Zahl als in der Schweiz heimisch nachgewiesen.

**Coenobia** Steph.

\* *Rufa* Hw. F'feld 1 gefl. Exempl. am Licht. In der Schweiz bisher nur von Dübendorf 2 Expl. (Vorbrodts, S. 345).

**Senta** Steph.

\* *Maritima* Tausch. F'feld, Thur 1911 und 1912 am Licht n. s. In der Schweiz bisher nur von Bühren u. Kerzers je 2 Exempl. erbeutet. (Vorbrodts S. 345.)

\* *ab. bipunctata* Hw. F'feld, Thur 1 Stück. Einziges Exemplar in der Schweiz.

**Tapinostola** Led.

Fulva Hüb. F'feld, Thur mehrfach am Licht.

\* *ab. fluxa* Tr. Aadorf (Z.-R.).

**Calamia** Hüb.

Lutosa Hüb. Aadorf (Z.-R.). (Ortsangabe unsicher.)

**Leucania** Hüb.

\* *Impudens* Hb. *ab. pudorina* Hb. Die rötliche Form b. F'feld n. s.; die graue scheint zu fehlen.

*Impura* Hüb. F'feld g.

*Pallens* L. s. F'feld.

*ab. ectypa* Hb. Müllh. (M.-R.).

\* *Straminea* Tr. F'feld, Thur z. h., sonst in der Schweiz nur an wenigen Orten; Schaaren (Wanner).

\* *Obsoleta* Hb. s. s. F'feld, Thur 1 Stück.

\* *Comma* L. *ab. turbida* Hb. F'feld, Thur mehrfach. (Siehe Vorbrodts S. 350. Die graubraune Stammform scheint zu fehlen.)

*L-album* L. F'feld n. s.

*Vitellina* Hüb. Aadorf (Z.-R.) 2 St.

<sup>1</sup> Vgl. Wehrli, l. c. S. 49.

Conigera F. *F'feld* g.

Albipuncta W. V. *F'feld* h.

\* *ab. albilinea* (nov. aberr.). Der weiße Punkt der Vfl. zu einer bis z. innern Querstreifen reichenden weißen horizontalen Linie verlängert.

Lythargyria Esp. Wie vorige, in grauen und rötlichen Stücken.

\* *Turca* L. 2 St. von Ittingen, 1 Thur.

### Grammesia Steph.

Trigrammica Hfn. *F'feld* h. am Licht.

### Caradrina Ochsh.

Quadripunctata F. (*Cubicularis* Bkh.). *F'feld* h.

Morpheus Hfn. s. *Murkart*, *Thur* b. *F'feld* je 1 St., *Aadorf* (Z.-R.).

\* *Alsines* Brahm. *F'feld* h. von vielen Orten, auch im Garten am Köder. *Aadorf* h. (Z.-R.).

Ambigua F. *F'feld*, *Thur* n. s. am Köder.

Taraxaci Hüb. g. *F'feld*.

[*Pulmonaris* Esp. Die Angabe Dußnang scheint unrichtig; in der Eugsterschen Sammlg. finde ich kein Belegexemplar.]

### Petilampa Aur.

Arcuosa Hw. s. *F'feld*, *Aadorf* (Z.-R.), Müllh. (M.-R.) 1 St.

### Rusina B.

\* *Umbratica* Gäze. *F'feld* n. s. am Licht.

### Amphipyra Ochsh.

Tragopognis L. h. am Köder.

Perflua F. *F'feld*, *Thur* öfter; *Sonnenberg*.

Pyramidea L. g. am Köder.

\* *ab. virgata* Tutt. *F'feld*, *Aadorf* (Z.-R.).

### Taeniocampa Gn.

Gothica L. h. Von rein grauen Stücken

\* *ab. pallida* Tutt. zu rotbraunen

\* *ab. brunnea* Tutt. in Uebergängen. *F'feld*, *Aadorf* (Z.-R.).

\* *var. Gothicina* H. s. *Aadorf* (Z.-R.) 1 Stück. *F'feld* im Garten am Köder 1 St.

Miniosa F. *F'feld.* s. 1 Stück. *Herdern* mehrfach. Von *Ittingen* die Raupe.

Pulverulenta Esp. *F'feld* n. s.

\**ab. rufa* Tutt. Vfl. ausgespr. rötlich. Rohr, *Herdern*.

Populi Ström. s. Müllh. (M.-R.), Aadorf (Z.-R.), *Ochsenfurt*, *Herdern*. 1913 n. s.

\**ab. atropunctata* Geest. Wellenlinie mit einer ziemlich vollständigen Reihe schwarzer Punkte. *Herdern*. 1 Stück *F'feld*. (Neu für die Schweiz.)

\**ab. atropurpurea* Geest. *Herdern* 1 St. (Neu für die Schweiz.)

Stabilis View. g. *F'feld.* Alle Uebergänge von rein grauen

\**ab. grisea* Spub. zu gelbgrauen

\**ab. pallida* Tutt. und von heller zu dunkler rotbraunen

\**ab. rufa* Tutt. Stücken.

\**ab. juncta* Hw. Beide Makeln verbunden, in grauen und braunen Stücken. *F'feld* mehrfach gef. und gez.

\**ab. suffusa* Tutt. Aadorf (Z.-R.).

\**ab. obliqua* Vill. Aadorf (Z.-R.).

\**ab. rufannulatus* Hw. Aadorf (Z.-R.), *F'feld*.

Incerta Hfn. g. *F'feld.* In vollständiger Serie von:

\**pallida* Lamp. \**pallidior* Stgr. bis

\**fuscata* Hw.

Opima Hüb. *F'feld* n. h. 6 St., Müllh. (M.-R.), Aadorf (Z.-R.).

Gracilis F. *F'feld* n. s. grau

\**ab. pallida* Stgr. bis hell rotbraun,

\**ab. brunnea* Tutt. mit Uebergängen.

Munda Esp. h.

\**ab. striata* Tutt. *Herdern*.

var. *immaculata* Stdg. *F'feld*, *Rohr*.

Beide in hellgrauen

\**ab. pallida* Tutt. und roten Exempl.

*ab. rufa* Tutt. mit allen Zwischennuancen.

\**ab. geminata* Hn. *Rohr* 7. III. 13.

### Panolis Hüb.

Flammea Hb. (= *piniperda* Pr.). *F'feld* 1912 h. (1911 an denselben Stellen kein Stück).

\**ab. griseovariegata* Gze. (= *grisea* Tutt.) Von Aadorf (Z.-R.) sicher 1 Expl. *Herdern* 2 Stück.

**Mesagona** Boisd.

\* *Oxalina* Hüb. F'feld mehrfach.

\* *Acetosellae* F. Aadorf (Z.-R.) sicher.

**Dicycla** Gu.

\* *O. O. L.* Aadorf (Z.-R.).

**Calymnia** Hüb.

*Pyralina* View. F'feld n. s. am Licht.

\* *Affinis* L. Aadorf (Z.-R.). (Wahrscheinlich aus d. Thurgau.)

[*Diffinis* L. Sicher nicht aus Aadorf (Z.-R.).]

*Trapezina* L. F'feld g. In hell- und dunkelgrauen

\* *ab. grisea* Tutt. und gelbrötlichen

\* *ab. ochrea* Tutt. Exemplaren.

**Cosmia** Ochsh.

*Paleacea* Esp. *Steckborn* (Schalch). Ob aus dem Thurgau?

**Dyschorista** Led.

*Fissipuncta* Ld. s. F'feld.

**Plastenis** Boisd.

*Retusa* L. F'feld n. s.

\* *Subtusa* F. s. s. Thur 1 St. am Licht. Aus Aadorf (Z.-R.)  
ebenfalls 1 St.

**Orthosia** Ochsh.

*Lota* Cl. F'feld h.

\* *ab. bipuncta* (nov. aberr.). F'feld 2 Stück. Mit einem  
zweiten schwarzen, braunumrandeten Fleck,  
welcher auf der Basallinie zwischen beiden  
Makeln liegt. Die Umrandung verbindet die  
beiden Makeln.

*Macilenta* Hub. Aadorf (Z.-R.) mehrfach.

*Circellaris* Hfn. F'feld n. s.

*Helvola* L. F'feld am Köder z. h.

\* *ab. punica* Bkh. (= *extincta* Spr.). F'feld.

\* *ab. unicolor* Tutt. F'feld.

*Pistacina* F. F'feld g.

\* *ab. serina* Esp. F'feld.

\* *ab. rubetra* Esp. Aadorf (Z.-R.), F'feld 1 St.

*Nitida* F. F'feld (Blumenstein öfter), *Ochsenfurt*.



Litura L. *F'feld* n. s.

\* *Laevis* Hb. s. s. *F'feld* 1 St. Bisher nur von Bern und St. Blaise bekannt. (Vorbrodts, S. 382.)

### **Xanthia** Ochsh.

\* *Sulfurago* F. Aadorf (Z.-R.). (Fraglich.)

*Aurago* F.

\* *ab. fucata* F. Esp. Aadorf (Z.-R.).

*Lutea* Ström. *F'feld*.

*Fulvago* L. *F'feld*.

\* *ab. flavescens* Esp. Aadorf (Z.-R.).

*Gilvago* L. Aadorf (Z.-R.).

### **Hoporina** Blanch.

*Croceago* F. s. *F'feld*, *Ochsenfurt*, *Osterhalden*.

### **Orrhodia** Hüb.

\* *Erythrocephala* F. Sonnenbg. 3 Exempl.

\* *Vau punctatum* Esp. *F'feld* h. (1912 am 26. und 28. XII. je 1 Exempl. am Köder im Garten.)

*Vaccinii* L. Am Köder g. *F'feld*.

\* *ab. ochrea* Tutt. 1 Expl. Herdern.

*ab. spadicea* Hb. *F'feld*, *Steckborn* (Schalch), *Kreuzlingen* (Himmel).

*ab. mixta* Stgr. *F'feld* mehrfach.

\* *ab. glabroides* Fuchs. 1 Stück von Rohr. 1913 März.

\* *Ligula* Esp. s. 1 dunkles Exemplar von Rohr am Köder; ein zweites, heller graues in der \* *ab. polita* Hb. ebenfalls von Rohr. März 1913.

*Rubiginea* F. *F'feld*. Sammlungen. 1 Stück unbezeichnet. Aadorf h. (Z.-R.).

### **Scopelosoma** Curt.

*Satellitica* L. Stammform selten (*ab. unicolor* Rätzer).

*ab. Brunnea* Lpe. Häufigste Form g. g. am Köder.

\* *ab. juncta* Spul. *F'feld* Garten. *Betelhausen*. Alle mit weißen, gelben oder roten Makeln, \* *alborufo-satellitica* Tutt.

\* *ab. rufescens* Tutt. Rohr. 1 ziegelrotes Exemplar.

### **Xylina** Tr.

\* *Semibrunnea* Hw. Aadorf (Z.-R.). 1 Stück sicher.

Socia Rott. *F'feld* mehrfach.

\* *ab. rufescens* Tutt. *F'feld* 1 stärker gelbrötliches Exemplar.

Furcifera Hfn. *F'feld* (Blumenstein).

\* *Ingrica* H. S. s. *F'feld* (Murkart).

Ornithopus Rott. *F'feld* (Blumenstein, Garten).

### Calocampa Steph.

Vetusta Hüb. *F'feld* z. h.

Exoleta L. Seltener als vorige um *F'feld*. (Garten, Herenbg.)

### Xylocampa Gn.

\* *Areola* Esp. Aadorf (Z.-R.) 2 St.

### Xylomiges Gn.

Conspicillaris L. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.), Aadorf (Z.-R.) 2 St.  
ab. *melaleuca* View. *Herdern*.

### Lithocampa Gn.

Ramosa Esp. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.) 2 St. *Herdern* 1 Stück  
am Licht. Aadorf (Z.-R.), (Sulz) mehrfach.

### Calophasia Steph.

Lunula Hfn. *F'feld* nat.-hist. Museum 1 Exempl. ohne Orts-  
angabe. Aadorf (Z.-R.) 2 St.

### Cucullia Schrank.

Verbasci L. *F'feld*. Die Raupe häufiger an Verbascum-Arten.  
Die meisten gestochen.

Scrophulariae Esp. 1911. Die Raupe an Verbascum an der  
*Thur*. Aadorf (Z.-R.).

Asteris Schiff. *F'feld*.

Umbratica L. *F'feld* g.

Campanulae F. Müllh. (M.-R.).

Lucifuga Hüb. *F'feld* öfter und mehrorts.

Lactuae Esp. *F'feld* n. s.

Chamomillae Schiff. Aadorf (Z.-R.), *Dußnang* (Eugster),  
2 Exemplare natur-histor. Museum *F'feld*, Müllh. (M.-R.),  
Aadorf (Z.-R.).

Gnaphalii Hüb. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.) Sicher von *Aadorf*  
(Z.-R.), auch von Elgg (Gram.).

**Anarta** Tr.

Myrtilli L. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.), Hudelmoos (M.-R.).

**Heliaca** H. S. (Panemeria Hüb.).

Tenebrata Sc. h.

**Heliothis** Ochsh.

Dipsacea L. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.) 4 Expl., Müllh. (M.-R.).

\* *Peltigera* Schiff. und \* *armigera* Hb. werden von Herrn Z.-R. bestimmt als bei Aadorf gefangen angegeben.

**Pyrrhia** Hüb.

Umbra Hfn. *F'feld*, *Ittingen*.

**Acontia** L. d.

\* *Luctuosa* Esp. s. *Ittingen*, *Neunforn*, *Aadorf* (Z.-R.).

**Erastria** Ochsh.

Argentula Hüb. bei *F'feld* h.

Uncula Ch. n. s. auf Rietwiesen um *F'feld*.

Venustula Hüb. Um *F'feld* an vielen Orten; auch *Sonnenberg* und *Kalchrain*. Müllh. 1 St. (M.-R.). Am besten beim Dämmerungsfang und am Licht zu erbeuten.

Deceptorica Scop. *F'feld* n. s.

Fasciana L. *F'feld* g.

\* *ab. albilinea* Hw. *Wellenberg* 2 Stück. Neu für die Schweiz.

**Rivula** Gn.

Sericealis Scop. g.

**Prothymnia** Hüb.

Viridaria Cl. *F'feld* h.

**Emmelia** Hüb.

Trabealis Scop. s. *F'feld*.

**Scoliopteryx** Germ.

Libatrix L. g.

**Telesilla** H. S.

\* *Amethystina* Hb. *F'feld*, *Thur* n. s. am Köder und Licht. Juni bis August.

**Abrostola** Ochsh.

Triplasia L. *F'feld* n. s.

Tripartita Hfn. *F'feld*, *Hörnli*.

(Die Angabe Asclepiadis Schiff Aadorf beruht auf Irrtum.)

**Plusia** Ochsh.

C-aureum Kn. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.), *Steckborn* (Schalch),  
Aadorf (Z.-R.) öfter.

Moneta F. *F'feld*, *Steckborn* (Guhl, Spillm.), *Aadorf* (Z.-R.).

Variabilis Piller. *F'feld*, (Murkart), *Hörnli*, *Aadorf* (Z.-R.),  
Kreuzl. (Himmel).

\**Modesta* Hb. Ochsenfurt, Ittingen je 2 St.

Chrysis L. *F'feld* h. in der Form der typischen *disjuncta*  
Schultz mit messinggelben, ins grünliche schillernden  
Querbänden (siehe Vorbrodt S. 420).

ab. *juncta* Tutt. *F'feld*, *Ittingen* etc. h.

Chryson Esp. Um *F'feld* n. s. Gaißberg ob Kreuzl. (Himmel).

Bractea F. *F'feld* n. s., *Blumenstein*, *Ochsenfurt*, *Ittingen*,  
*Wellenberg* und *Murkart*, *Schaaren* (Wanner).

\**Festucæ* L. s. s. *F'feld* 1 St. Auch von Aadorf (Z.-R.).

Gutta Gn. Von vielen Orten rings um *F'feld* auch von *Her-*  
*dern* und *Gottlieben* Mai, Juli, Aug. und Sept. Falter  
der 2. Generat. (= \**Aestiva* Krul.) dunkler.

Pulchrina Hw. *F'feld* n. s. am Licht.

\**ab. percontatrix* Aur. *F'feld* (Wellenberg).

Jota L. *F'feld* seltener als vorige.

ab. *Inscripta* Esp. Aadorf (Z.-R.).

Gamma L. g.

\**ab. rufescens* Tutt. *F'feld*.

**Euclidia** Ochsh.

Mi L. (= *litterata* Spr.) h.

Glyphica L. h.

\**ab. marginata* Spul. *F'feld*.

**Pseudophia** Gn.

Lunaris Schiff. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.) 2 ohne Angabe, *Steck-*  
*born* (Schalch), *Schaaren* (Wanner).

**Catocala** Schranck.

Fraxini L. s. *F'feld*, *St'born* (Schalch, Guhl) b. *Paradies* (Wann.).

\**ab. moerens* Fuchs. Aadorf (Z.-R.).

- \* *Elocata* Esp. Steckborn (Schalch) 3 Exempl.  
*Electa* Bkh. h. F'feld am Köder.  
*Nupta* L. F'feld n. s. Steckborn (Schalch).  
*Sponsa* L. *Steckborn* (Schalch), Aadorf (Z.-R.), b. *Paradies*  
(Wanner).  
*Promissa* Esp. *Steckborn* (Schalch) 3 St., auch von Aadorf  
(Z.-R.).  
*Fulminea* Scop. s. *Ochsenfurt*, F'feld am Köder, *Schaaren*  
(Wanner).  
\* *ab. xarippe* Butl. s. s. F'feld, 1 St. Typisch ein-  
ziger Standort für die Schweiz (1 Uebergangsstück  
Zürich (Vorbrot S. 435)).

### **Toxocampa** Gn.

- Pastinum* Tr. s. F'feld, *Oberwil*.  
*Viciae* Hüb. Häufigste der Gattung b. F'feld.  
\* *ab. coecula* Stgr. F'feld (Murkart), *Ochsenfurt*. (Stand-  
fuß det.) Neu für die Schweiz.  
*Craccae* F. bisher nur von *Sonnenberg*, dort n. s.

### **Laspeyria** Germ.

- Flexula* Schiff. F'feld n. s., *Schaaren* (Wanner).  
\* *ab. albina* (nov. aberrat.) Ittingen. Grundfarbe der  
Vfl. hell weißgelb; Wurzelfeld fast weiß. Die  
übrige Zeichnung scharf. Auch die Unterseite  
heller, die Saumpunkte sehr deutlich, was bei  
meinen typischen Stücken nicht der Fall ist.

### **Parascotia** Hb.

- Fuliginaria* L. Aadorf (Z.-R.) 1 Expl. im Fabrikgebäude.

### **Zanclognatha** Led.

- \* *Tarsiphumalis* Hb. s. s. F'feld. *Schaaren* (Schalch, Wanner).  
*Tarsipennalis* Tr. s. F'feld, *Murkart*.  
*Tarsicrinalis* Knoch. F'feld h.  
*Grisealis* Hüb. F'feld h.

### **Aethia** Hb. (= *Standfussia* Spr.).

- Emortualis* Schiff. s. *Horben* mehrfach.

### **Madopa** Steph.

- Salicalis* Schiff. F'feld, *Thur* z. h.

**Herminia** Latr.

\* *Derivalis* Hüb. Aadorf (Z.-R.), kommt jedenfalls auch bei F'feld vor.

**Pechipogon** Hüb.

Barbalis Cl. Um F'feld z. h. von vielen Orten.

**Bomolocha** Hüb.

Fontis Thb. s. Bisher nur von *Horben* 3 St.

**Hypena** Schranck.

Proboscidalis L. s. *Ittingen* 1 St., Amriswil (M.-R.).

[*Palpalis* Hüb. Kaum in Aadorf und Elgg.]

*Obesalis* Tr. F'feld 1 St. Müllh. (M.-R.), Amriswil (M.-R.).

[*Obsitalis* Hüb. Die Angabe Aadorf ist nicht richtig (Z.-R.).]

*Rostralis* L. h.

ab. *unicolor* Tett. F'feld (nat.-hist. Museum), Aadorf (Z.-R.).

\* ab. *variegata* Tutt. s. F'feld mehrfach.

Zur \* ab. *radiatalis* Hb. F'feld. ein Uebergang.

**Tholomiges** Led.

*Turfosalis* Wck. Bisher nur vom Hudelmoos (M.-R.).

**Habrosyne** Hüb.

*Derasa* L. F'feld n. s.

**Thyatira** Hüb.

*Batis* L. F'feld h. am Licht.

\* ab. *privata* (nov. aberr.) Der isolierte Fleck am Innenrand des Vf. fehlt. Uebrige Zeichnung normal.

**Cymatophora** Tr.

Or F. F'feld am Licht und Köder h.

\* ab. *unimaculata* Aur. F'feld mehrfach. Neu für die Schweiz.

\* ab. *unifasciata* Spul. Wie vorige. Neu für die Schweiz.

\* ab. *fuscostigmata* Strand. s. Ochsenfurt. 1 Stück mit hell gelbbraun (statt grün) ausgefüllten Makeln. Neu für die Schweiz.

Octogesima Hüb. *F'feld* seltener als vorige. An einem Expl. beidseits der eine basale Querstreifen durch die Rundmakel unterbrochen. Uebergang zu \**ab. interrupta* Spul.

\* *Fluctuosa* Hüb. *F'feld*, Murkart.

Duplaris L. *F'feld* n. s.

### **Polyploca** Hüb.

[*Ruficollis* F. Die Angabe Aadorf beruht auf Irrtum.]

Flavicornis L. *F'feld* (Koll. Sulzbgr.), Aadorf (Z.-R.), Amriswil (M.-R).

Ridens F. Aadorf (Z.-R.), *F'feld* (Koll. Sulzbgr.).

Diluta F. Aadorf (Z.-R.), Kreuzl. (Himmel); im Herbst am Köder n. s. Briefliche Mittlg.

### **Brephos** Ochsh.

Parthenias L. *F'feld*, *Hüttwilen*, *Steinegg*.

Nothum Hüb. *F'feld*, *Ochsenfurt*, *Hüttwilen*.

### **Aplasta** Hb.

\* *Ononaria* Fueßl. s. s. 2 Stück v. Herdern; fliegt am Tage. Müllh. (M.-R.) Vorbrodt, S. 1, II. Bd.

### **Pseudoterpna** Hüb.

\* *Pruinata* Hfn. *F'feld* nat.-hist. Sammlg. (Wegelin) 1 Stück. Bez. *F'feld* 2, VIII. 08. Von Kreuzlingen (Himmel) nur von der badischen Seite.

### **Geometra** Linné.

Papilionaria L. *F'feld* n. s. Von vielen Orten.

Vernaria Hüb. *F'feld* z. h. am Licht.

### **Euchloris** Hüb.

Pustulata Hfn. Kreuzlingen (Himmel). Ob im Thurgau?

### **Nemoria** Hüb.

Viridata L. *F'feld*, *Murkart*, *Wellenberg*, *Sonnenberg*, *Ittingen*.

Porrinata Z. s. Bisher nur von *Nergeten* 3 St.

### **Thalera** Hüb.

Fimbrialis Scop. s. s. Nur 1 Stück von *Weiningen* (*F'feld*).

Putata L. *Ittingen*, *Murkart* mehrfach.

Lactearia L. *F'feld* z. h.

**Hemithea** Dup.

Strigata Müller. *F'feld* n. s. am Licht.

**Acidalia** Fr.

Trilineata Sc. Bernrain (Himmel).

Similata Thnbg. Am Tage auf sonnigen Rietwiesen z. h.

\* *Ochrata* Sc. Schaarenwiese (Pfähler).

Dimidiata Hfn. *F'feld* (Garten) mehrfach. *Ochsenfurt* am Köder. *Untersee*; bisher nur im Juli und Aug. (2 Gen.).

Virgularia Hüb. n. h. *F'feld* (Garten), *Hörnli*.

Straminata Tr. s. *F'feld* 1 St.

Bisetata Hfn. *F'feld* z. h. von vielen Stellen.

Trigeminata Hw. s. *F'feld*.

[*Rusticata* Fab. Elgg (Gramann).]

Humiliata Hfn. *F'feld* h., *Untersee*.

\* *Inornata* Hw. s. s. Nergeten 1 Exempl.

Aversata L. *F'feld*. Stammform z. s. *Wellenberg*, *Bornhausen*, *Ittingen*.

ab. *Spoliata* Stdg. *F'feld* viel häufiger als die Stammform.

\* *Emarginata* L. s. s. *F'feld*. 2 St.

Immorata L. *F'feld* h.

\* *Marginepunctata* Göze. Aadorf (Z.-R.). Von Kreuzlingen (Himmel) nur von der badischen Seite.

Remutaria Hüb. *F'feld* g.

Punctata Tr. s. Je 1 St. von *Nergeten* und *Kalchrain*.

Caricaria Reutti. *F'feld* h., ebenso *Hüttwilerseen*, *Bornhausen*, *Steinegg*.

Immutata L. Auf Sumpfwiesen; *F'feld* (gr. Allmend), *Schaarenw.*, *Gottlieben*.

Umbellaria Hüb. s. Bisher nur vom *Sonnenberg* sicher.

Strigillaria Hüb. *F'feld* h.

Ornata Scop. *F'feld* h.

**Codonia** (= Ephyra Dup.).

Pendularia Cl. *F'feld*, *Murkart*, *Nergeten*.

\* *Orbicularia* Hb. Mehrfach vom Berlingerhof und Weiningen (*F'feld*). Amriswil (M.-R.) nach Vorbrodts.

Annulata Schulze. *F'feld* n. s.

Porata F. *F'feld* z. h.



\* *Quercimontaria* Bastelb. Bei F'feld lokal die häufigste Codonia in 2 Generationen Mai-Juni, Juli-Aug. F'feld, Ochsenfurt, Murkart, Hungersbühl, Wellenberg, Ittingen, Rohr, Weiningen etc.

*Punctaria* L. F'feld n. s.

\* *ab. cingulata* Fuchs. F'feld.

\* *ab. naevata* Bastelb. F'feld.

\* *Ruficiliaria* H. S. Aadorf (Z.-R.) 1 Stück.

*Linearia* Hüb. F'feld h. in Buchenbeständen.

\* *ab. strabonaria* Z. F'feld. Sommerform.

### **Rhodostrophia** Hüb.

*Vibicaria* Cl. F'feld 1911 n. s.

### **Timandra** Dup.

*Amata* L. F'feld h. bes. an d. Thur.

### **Ortholitha** Hüb.

*Plumbaria* F. s. F'feld.

*Limitata* Scop. g.

*Moeniata* Scop. s. Ittingen mehrfach. Aadorf (Z.-R.).

*Bipunctaria* Schiff. F'feld h.; auch am Hörnli.

### **Minoa** Tr.

*Murinata* Scop. F'feld g.

\* *ab. cineraria* Stdgr. Aadorf (Sulzer) nach Vorbrodt l. c.

### **Odezia** Boisd.

*Atrata* L. h. Auf Sumpfwiesen.

### **Anaitis** Dup.

*Praeformata* Hüb. s. Sonnenberg, Hörnli.

*Plagiata* L. F'feld h.

\* *ab. tangens* Fritsche. 2 St. Thur b. F'feld.

\* *ab. cotangens* Fritsche. s. Murkart. Neu f. d. Schweiz.

[*Paludata* Thnb. var. *Imbutata* Hüb. Fürstenbg. b. Konstanz (Himmel).]

### **Lobophora** Curt.

*Polycommata* Hüb. F'feld h.

*Sertata* Hüb. s. F'feld (Blumenstein), Hörnli.

*Carpinata* Bkh. F'feld n. s.

Halterata Hfn. *F'feld* n. h., *Hungersbühl*, *Murkart*, *Rohr*,  
*Ochsenfurt*.

ab. zonata Thbg. Aadorf (Z.-R.), *F'feld*.

Sexalisata Hüb. *F'feld* mehrfach; Mai, Juni, Juli.

Viretata Hüb. *F'feld*, *Blumenstein*, *Ochsenfurt*.

### **Anisopteryx** Steph.

Aescularia Schiff. *F'feld* h.

Aceraria S. V. Aadorf (Z.-R.).

### **Operophtera** Steph. (= Cheimatobia Steph.)

Boreata Hüb. s. *Halingertobel*, *Herdern* je 1 St.

Brumata L. g. ♂ am Köder zu bekommen.

### **Triphosa** Steph.

Dubitata L. *F'feld* n. s. überwintert, im April.

ab. cinereata Latr. Aadorf (Z.-R.).

### **Eucosmia** Steph.

Certata Hüb. *F'feld* n. s.

\*ab. rufescens Rbl. *F'feld*.

Undulata L. s. *F'feld*, *Murkart*, *Nergeten*.

### **Scotosia** Steph.

Vetulata Schiff. s. *Steinegg*, *Römerstr.*, *F'feld*.

### **Lygris** Hüb.

Prunata L. *F'feld* n. h.

Testata L. s. *F'feld* 1 St.

Populata L. *F'feld* n. s., *Hörnli*.

### **Larentia** Tr.

Dotata L. *F'feld* z. h.

Fulvata Först. *F'feld* n. s., besonders jenseits der Thur.

Ocellata L. *F'feld* öfter; auch vom *Hörnli*.

Bicolorata Hfn. n. s. *F'feld*, *Murkart*, *Ochsenfurt*.

Variata Schiff. h.

var. obeliscata Hüb. *F'feld*, *Murkart*, *Ittingen*, *Wellenberg*, *Römerstr.*, *Berlingerhof*.

var. Stragulata Hüb. *F'feld*, *Murkart*, *Ochsenfurt*.

Juniperata L. *F'feld*.

Siterata Hfn. *F'feld* n. s. Von vielen Orten.

- Truncata Hfn. *F'feld*, *Weiningen*; *Schaaren* (Wanner).  
 \* *ab. mediorufaria* Fuchs. *Ittingen*.  
 Immanata Hw. *F'feld* (Veranda).  
 \* *ab. marmorata* Hw. *F'feld*, *Hörnli*.  
 \* *firmata* Hb. *Steckborn* (Schalch) 1 St.  
 Olivata Bkh. *F'feld* n. s.  
 Viridaria F. *F'feld* z. h.  
 \* *Salicata* Hb. *Hörnli* 1 St. *Thurg.*  
 Fluctuata L. *F'feld*, *Nergeten*, *Thur*, *Hörnli*.  
 Didymata L. n. h. *F'feld*, *Herdern*, *Weiningen*, *Hörnli*.  
 Vespertaria Bkh. *F'feld* n. s.; auch vom *Hörnli* mehrfach.  
 Montanata Schiff. h.  
 \* *Suffumata* Hb. *F'feld* z. h. im Mai, mehrorts.  
 Quadrifasciaria Cl. *F'feld* (*Thur*), *Steckborn* (Schalch).  
 Ferrugata L. *F'feld* g.  
 ab. *Unidentaria* Hw. *Thur* n. s. am Licht; auch von  
*Nergeten*. (Vgl. *Vorbrodt*, Bd. II, S. 71.)  
 Spadicearia Bkh. *F'feld* wie vorige n. s.  
 Designata Rott. *F'feld* n. s.  
 \* *Vittata* Bkh. s. s. Nur von der *Thur*, dort vielfach am  
 Licht gef. Wohl 2 Generationen 25. V. 11 u. 29. VII. 11.  
 (*Menyanthes trifoliata* fehlt an den Fangstellen.)  
 Dilutata Bkh. *F'feld*.  
 ab. *obscurata* Stdgr. Sicher von *Aadorf* (Z.-R.).  
 \* *Cyanata* Hüb. *Aadorf* (Z.-R.) am Fenster des Wartsaales gef.  
 Tophaceata Hüb. *Amriswil* (M.-R.).  
 Verberata Sc. *Aadorf* n. s. (Z.-R.) 11 St.  
 [Riguata Hüb. Kaum von *Aadorf* (Z.-R.).]  
 Cucullata Hfn. s. Je 1 Stück von der *Thur* b. *F'feld* und  
*Römerstr.*, *Müllheim* (M.-R.) 1 St.  
 Galiata Hüb. *Aadorf* 1 St. (Z.-R.).  
 Rivata Hüb. *F'feld* n. s.  
 \* *ab. maculata* Rbl. *Ittingen*. 1 Uebergangsstück mit  
 breit weiß unterbrochenem Mittelfeld; der Vorder-  
 randsfleck aber nur auf dem r. Vf. deutlich zwei-  
 teilig. Wohl Produkt des heißen Sommers 1911,  
 sonst nur aus Kroatien. Neu für die Schweiz.  
 Albicillata Hw. h.  
 Procellata F. g.  
 Transversata Thbg. (= *Lugubrata* Stdg.) *F'feld*, *M'kart*, *Steinegg*.

Hastata L. Aadorf (Z.-R.), Schaaren (Pfähler), Haidenhaus, Seerücken 1 Stück.

[var. Subhastata Nolck. Die Angabe Aadorf beruht auf Irrtum; die betr. Falter sind aus dem Turmanntal.]

Tristata L. F'feld h.

Luctuata Hüb. F'feld, Nergeten.

\* *Molluginata* Hb. s. F'feld, Murkart, mehrfach, Hörnli.

\* ab. *constricta* (nov. aberr.) Wellenberg. Das Mittelfeld etwa in der Mitte breit weißlich unterbrochen, in eine obere und eine untere Hälfte geteilt.

Alchemillata L. F'feld h.

\* *Hydrata* Tr. s. s. Ittingen.

Minorata Tr. Amriswil (M.-R.).

Adaequata Bkh. s. Murkart, Hörnli.

Albulata Schiff. F'feld g.

Testaceata Don. F'feld, Thur h., Nergeten.

\* *Blomeri* Curt. s. s. F'feld (Blumenstein), Horben 1911 h. Kohlfirst (Wanner).

\* *Obliterata* Hfn. F'feld in Erlenschlägen h., Schaarenwald (Pfähler).

Luteata S. V. F'feld n. s.

Bilineata L. F'feld sehr g.

\* ab. *infusata* Gmppbrg. F'feld mehrfach.

Sordidata Bkh. Im ganzen Gebiet h.

\* ab. *fusco-undata* Don. F'feld, Wellenbg.

\* ab. *infusata* Stgr. Horben.

Trifasciata Bkh. (= autumnalis Ström.) F'feld g.

\* ab. *constricta* Strand. F'feld, Thur.

Silaceata Hüb. F'feld, Murkart n. s.

\* ab. *insulata* Hw. F'feld, Murkart mehrfach.

\* ab. *Deflavata* Stdgr. 1 Uebergangsstück von Murkart (insulata).

Corylata Thb. z. s. F'feld, Rohr, Murkart, Thur.

Badiata Hüb. F'feld h.

Berberata Schiff. F'feld g.

Nigrofasciaria Gz. s. Debrunnen, F'feld, Rohr.

Rubidata F. z. s. F'feld, Murkart, Horben.

Comitata L. Aadorf (Z.-R.).

**Asthena** Hüb.

Candidata Schiff. *F'feld* z. h.

- \* *Anseraria*<sup>1</sup> H. S. *F'feld* n. s. Herenbg., Sonnenbg., Rohr, Ittingen, Murkart, Ochsenfurt, Bornhausen etc., auch von Aadorf (Z.-R.). Bisher verkannt und mit der vorigen verwechselt gewesen.

**Tephroclystia** Hüb.

Oblongata Thnb. *F'feld* n. s.

- \* *Laquearia* H. S. s. s. Horben.

Pusillata S. V. *F'feld* g.

- \* *ab. tantillaria* B. *F'feld* 2 St.

Indigata Hüb. *Ochsenfurt* s.

Strobilata Bkh. (= *Abietaria* Gz.) *Horben, Haidenhaus.*

Togata Hüb. s. *Ittingen* 1911 u. 1912 je 1 St.

- \* *Venosata* F. s. *F'feld* (Thur), Wellenberg je 1 St.

- \* *Pimpinellata* Hb. s. *F'feld* (Thur), Horben.

Distinctaria H. s. Aadorf (Z.-R.). (Ortsangabe nicht ganz sicher.)

- \* *Extraversaria* H. S. *Ittingen* n. s. *F'feld* (Thur).

- \* *Expallidata* Gn. s. Horben 1 St.

Assimilata Gn. *F'feld, Thur* häufig, Amriswil (M.-R.).

- \* *Absinthiata* Cl. z. s. *F'feld* Gaslaterne, Thur 2 St.

Campanulata H. S. (= *Denotata* Hb. s. *Ittingen* 1 St., Aadorf (Z.-R.) 5 St.

- \* *Albipunctata* Hw. *F'feld, Horben, Thur, Mannenbach.*

- \* *Vulgata* Hw. s. Hörnli 1 St. Wellenbg. 1 St.

- \* *Virgaureata* Dbld. s. s. *F'feld* (Thur) 1 Stück in der Form  
\* *aestiva* Dietze. Die erste Generation 30. III. 13 bei Herdern an Weidenkätzchen.

- \* *Trisignaria* H. S. *F'feld.*

Lariciata Fr. s. *F'feld, Haidenhaus.*

Castigata Hüb. z. h. *F'feld* von vielen Orten.

*Subnotata* Hb. *F'feld.*

- \* *Helveticaria* B.

- \* *var. arceuthata* Frr. Wellenberg 1 Stück.

Satyrata Hüb. *F'feld* häufig, bes. a. d. *Thur.*

- \* *ab. subatrata* Stdgr. *F'feld* (Thur), (Püngeler det.).

- \* *Silenata* Standf. s. s. Warth 1 St.

<sup>1</sup> Vgl. Wehrli, Mitt. Schweiz. entomol. Gesellsch., Bd. XII 2, S. 50.

\* *Subfulvata* How. Hörnli 1 St.

\* *var. excelsa* Dietze. Hörnli 2 St. Püng. det.

\* *Scabiosata* Bkh. z. h. F'feld, Warth, Ochsenfurt, Wellenberg, Murkart, Herdern.

*Plumbeolata* Hw. *Ochsenfurt, Warth* z. s. je 2 St. Hudelmoos h. (M.-R.).

\* *Immundata* Z. s. Murkart, Wellenbg.

*Innotata* Hfn. Amriswil (M.-R.) 1 St.

\* *Isogrammaria* H. S. F'feld, von vielen Orten; neben *pussillata* die häufigste der Tephrr.

\* *Tenuiata* Hb. s. s. F'feld (Thur). Die Raupe von Herdern.

\* *Nanata* Hb. s. F'feld (Thur), Warth.

*Exiguata* Hüb. F'feld, Hungersb., Wellenbg., Sonnenbg.

*Lanceata* Hüb. z. h. F'feld, Osterhalden, Rohr etc. an Weidenkätzchen.

*Sobrinata* Hüb. n. h. F'feld, Warth, Murkart, Ochsenfurt.

### **Chloroclystis** Hüb.

\* *Coronata* Hb. s. s. in der Schweiz. Um F'feld vielfach, besonders an d. Thur und b. Warth, auch v. Murkart; in 2 Gen.

*Rectangulata* L. F'feld g.

\* *ab. nigro-sericeata* Hw. F'feld.

\* *ab. subaerata* Hb. s. Warth.

*Debiliata* Hüb. Murkart und Horben n. s.

\* *ab. nigropunctata* Chaut. 2 Uebergangsformen von Warth.

### **Phibalapteryx** Steph.

*Vitalbata* Hüb. F'feld z. h. auch am Licht.

\* *Tersata* Hüb. F'feld h.

\* *ab. tersatula* Stdgr. F'feld, Warth.

\* *Aemulata* Hb. Sonnenbg., Wellenbg., Warth, sonst alpin. Aadorf (Z.-R.).

### **Collix** Gn.

\* *Sparsata* Tr. s. F'feld, Warth, Murkart.

### **Abraxas** Leach.

*Grossulariata* L. F'feld n. s., auch v. Sonnenberg.

*Sylvata* Sc. z. h. F'feld, Murkart, Wellenberg.

Marginata L. *F'feld*, *Thur g.*, *Warth*, *Murkart*.

\* *ab. naevaria* Hb. *Wellenbg.*, *Warth*.

*ab. pollutaria* Hüb. *F'feld* (*Thur*).

Adustata Sch. *F'feld* z. h.

### **Bapta** Steph.

Pictaria Curt. s. s. *F'feld* 1 St., *Amriswil* (M.-R.).

Bimaculata F. *F'feld* z. h.

Temerata Hüb. *F'feld* n. s.

### **Stegania** Dup.

\* *Cararia* Hb. *Schaarenwald* (*Wanner*).

### **Deilinia** Hb.

Pusaria L. *F'feld* h.

Exanthemata Sc. *F'feld* h.

\* ? *Schaefferi* Brem. *Murkart*, *Rohr*. (Die var. *pellagraria* Gn. fehlt in der Schweiz. Vgl. *Vorbrott*, Bd. II, S. 142.)

### **Numeria** Dup.

Pulveraria L. *F'feld* h.

### **Püngeleria** Roug.

\* *Capreolaria* F. *Aadorf* (Z.-R.).

### **Ellopia** Tr.

Prosapiaria L. Stammform bisher nicht gefangen; meine rötlichen Formen sind nur geflogene *prasinaria* Hb.

*ab. prasinaria* Hb. *F'feld* h.

\* *ab. extincta* (nov. aberr.) Fl. Dunkler grün, einfarbiger, die weißen Querstreifen fast völlig verloschen, dunkelgrün angedeutet. *Ochsenfurt* 3 St.

### **Metrocampa** Latr.

Margaritata L. *F'feld* n. s. am Licht.

### **Ennomos** Tr.

Autumnaria Wernb. *Aadorf* (Z.-R.) 3 St.

\* *Alniaria* L. s. *F'feld* (*Thur*) 1 St.

Quercinaria Hfn. *F'feld* in *Buchenschlägen* n. s.

\* *ab. equestraria* F. Uebergang zu d. Form, v. *F'feld*.

Fuscantaria Hfn. s. *F'feld* 1 St.  
 Erosaria Hüb. *F'feld* (Thur) 1 St.

**Selenia** Hüb.

Bilunaria Esp. *F'feld* h.  
 ab. *jularia* Esp. Sommerform *F'feld* h., *Ittingen*,  
*Wellenberg*.

[ab. *Quercinaria* Bkh. Kreuzlingen, beruht auf Ver-  
 wechslung mit *Ennomos quercinaria* Hfn.]

Lunaria Schiff. *F'feld* n. h., *Ittingen*, *Wellenberg*.

Tetralunaria Hfn. *F'feld* n. h., *Rohr*.

\* *ab. aestiva* Stgr. Sommerform, häufiger; *Rohr*, *Mur-*  
*kart*, *Geissel*, *Ochsenfurt*, *Aadorf* (Z.-R.).

**Hygrochroa** Hüb.

Syringaria L. *F'feld* n. h., *Ochsenfurt*, *Warth*, *Wellenbg*.

**Gonodontis** Hüb.

Bidentata Cl. *F'feld* h.

**Himera** Dup.

Pennaria L. *Steckborn* (Koll. Schalch) 1 Stück unbestimmt,  
*F'feld* n. s., *Aadorf* h. (Z.-R.).

**Crocallis** Tr.

Elinguaria L. *F'feld* n. h.

**Angerona** Dup.

Prunaria L. *F'feld* h.  
 ab. *sordida* Füeßl. *F'feld* mehrfach.

**Ourapteryx** Leach.

Sambucaria L. n. h. *F'feld* (*Veranda*), *Ittingen*, *Thur*.

**Eurymene** Dup.

Dolabraria L. *F'feld*, *Ittingen*, *Ochsenfurt*, *Rohr*.

**Opisthograptis** Hüb.

Luteolata L. *F'feld* h.

**Epione** Dup.

Apiciaria Schiff. *F'feld* n. s., *Thur* h.

Advenaria Hüb. *F'feld* h.



**Venilia** Dup.

Macularia L. *F'feld* n. s.

**Semiothisa** Hüb.

Notata L. *F'feld, Thur, Warth, Murkart, Aadorf* (Z.-R.).

Alternaria Hüb. *F'feld* n. s.

Signaria Hüb. *F'feld Murkart, Ittingen.*

Liturata Cl. *F'feld* h.

**Hibernia** Latr.

Rupicapraria Hüb. *F'feld* n. s. Februar, März, abends am  
Gebüsch.

Leucophaearia Schiff. s. Bisher nur von *Rohr.*

ab. *marmorinaria* Esp. Aadorf (Z.-R.).

Aurantaria Esp. Aadorf (Z.-R.), *Steckborn* (Schalch).

Marginaria Bkh. *F'feld* h. bes. an d. Thur.

Defoliaria L. *Steckborn* (Schalch), Aadorf h. (Z.-R.), *F'feld* h.

ab. *obscurata* Stdg. Aadorf (Z.-R.) mehrfach.

**Phigalia** Dup.

Pedaria F. *F'feld* n. s.

**Biston** Leach.

\* *hispidarius* F. *Steckborn* (Schalch) 2 Exempl., ob aus dem  
Thurgau?

*Pomonarius* Hb. *Steckborn* (Schalch 2 ♂).

*Zonarius* Schiff. n, h. *F'feld, Osterhalden.*

*Hirtarius* Cl. *F'feld* n. s.

*Stratarius* Hfn. *F'feld*, seltener als vorige.

**Amphidasys** Tr.

Betularia L. *F'feld* n. s.

**Boarmia** Tr.

*Cinctaria* Schiff. *F'feld* mehrfach, *Ochsenfurt* (an blühendem  
*Prunus Padus*).

*Gemmaria* Brahm. *F'feld* n. s.

*Secundaria* Esp. *F'feld, Horben.*

*Abietaria* Hüb. *F'feld* z. h. am Licht.

*Repandata* L.

ab. *nigricata* Fuchs. s. *F'feld* (Berlingerhof).

[ab. *conversaria* Hüb. Elgg (Gramann).]

*Maculata* Stgr. Stammform in Sibirien.

\* *ab. bastelbergeri* Hirschke. ♂ u. ♀ F'feld, Murkart, Hörnli, auch in Aadorf (Z.-R.) 1 Stück. Neu für die Schweiz.

*Roboraria* Schiff. F'feld, b. Ittingen h., Murkart.

*Consortaria* F. F'feld n. s.

*Lichenaria* Hfn. s. F'feld, Murkart, Warth; Müllh. (M.-R.).

*Crepuscularia* Hüb. F'feld h. 2 Gen., März und Juli.

*Luridata* Bkh. F'feld öfter am Licht

*Punctularia* Hüb. F'feld n. s., z. B. b. Blumenstein.

### Gnophos Tr.

*Furvata* F. F'feld, Hungersbühl, Ittingen, Sonnenberg.

\* *Dilucidaria* Hb. Am Hörnli n. s.

Obscuraria Hüb.	} Alle drei von (Z.-R.) bestimmt in Aadorf gefangen angegeben; obscuraria Hb. auch vom Gaißbg. b. Kreuzl. 2 Expl. (Himmel).
* <i>Pullata</i> Tr.	
<i>Glaucinata</i> Hüb.	

### Ematurga Led.

*Atomaria* L. g.

\* *ab. ustaria* Fuchs. Wellenberg.

### Bupalus Leach.

*Piniarius* L. F'feld h.

\* *ab. flavescens* B. White. F'feld häufiger als die Stammform.

### Thamnonoma Led.

*Wauaria* L. n. h. F'feld, Bornhausen.

### Diastictis Hüb.

*Artesiaria* F. An d. Thur b. F'feld z. h., auch von Horben. Müllh. (M.-R.).

### Phasiane Dup.

*Clathrata* L. g.

*Petraria* Hüb. n. h. F'feld, Pfyn, Felben, Wellenberg.

### Scoria Steph.

*Lineata* Scop. g.

### Perconia Hüb.

[*Strigillaria* Hüb. Aadorf (Z.-R.) ??]

**Nola** Leach.

\* *Cicatricalis* Tr. s. Warth mehrfach.

*Cucullatella* L. Aadorf (Z.-R.) sicher, Amriswil (M.-R.) je  
1 Exempl.

*Confusalis* H. S. F'feld, Warth mehrfach.

\* *Centonalis* Hb. s. s. F'feld (Thur), Ittingen.

\* *ab. fasciata* Rbl. F'feld (Thur); neu für die Schweiz.

\* *Strigula* Schiff. s. Warth 1 Stück.

**Sarrothripus** Curt.

*Revayana* Sc. s. Murkart.

\* *ab. fuscilana* Schmid. Aadorf (Z.-R.).

*ab. undulana* Hüb. Aadorf (Z.-R.).

*ab. Dilutana* Hüb. F'feld (Thur), Murkart.

*ab. ramosana* Hüb. F'feld, Aadorf (Z.-R.).

\* *Degenerana* Hb. Mehrfach von Murkart, F'feld (Thur), auch  
Aadorf (Z.-R.).

**Earias** Hüb.

*Chlorana* L. F'feld (Thur) h., Niederwil, Murkart. 2 Gener.  
Mai und Juli.

**Hylophila** Hüb.

*Prasinana* L. F'feld, Murkart, Ittingen.

\* *ab. bilineata* Slevogt. Aadorf (Z.-R.).

*Bicolorana* F'ueßl. s. F'feld (Thur), Wellenbg.

**Spilosoma** Steph.

*Mendica* Clerk. F'feld n. h., Warth.

*Lubricipeda* Esp. F'feld h.

*Menthastri* Esp. F'feld h.

*ab. paucipuncta* Fuchs. F'feld (Thur).

*Urticae* Esp. s. F'feld, Ochsenfurt.

**Phragmatobia** Steph.

*Fuliginosa* L. h.

**Rhyparia** Hüb.

*Purpurata* L. F'feld n. h.

**Diacrisia** Hüb.

*Sanio* L. F'feld n. s., F'feld (Thur), Hüttwilersee, Nergeten,  
Schaarenw.

**Arctia** Schranck.\* *Villica* L. F'feld (Thur) 1 St.

Caja L. h.

**Pericallia** Hüb.Matronula L. *Fischingen* (Eugster) Sammlg. F'feld, *Ermatingen*  
Riggenbach-St. nach Frey, Lep. der Schweiz.**Callimorpha** Latr.

Dominula L. F'feld.

var. *Bithynica* Stdg. Aadorf (Z.-R.).Hera L. F'feld, *Hungersbühl*.**Coscinia** Hüb.\* *Striata* L. Steckborn (Schalch).**Hypocrita** Hüb.

Jacobaeae L. F'feld, Thur n. s.

**Deiopeia** Steph.

Pulchella L. Müllh. (M.-R.).

**Nudaria** Steph.

Mundana Cl. Kreuzlingen (Himmel) Seeburg.

**Miltochrista** Hüb.Miniata Forst. F'feld, *Ittingen*, *Thur*, *Bornhausen* n. s.**Cybosia** Hüb.Mesomella L. n. h. F'feld, *Thur*, *Murkart*, *Hüttw*.**Gnophria** Steph.

Rubricollis L. s. F'feld (Murkart) 2 St.

**Oeonistis** Hüb.Quadra L. n. h. *Murkart*, *Warth*, *Ochsenfurt*.**Setina** Schranck.

Irrorella Cl. z. s. F'feld (Thur).

**Lithosia** Fab.

Deplana Esp. F'feld h.

Griseola Hüb. F'feld (Thur) n. s.

Lurideola Zinck. F'feld, *Horben*, *Murkart*.

[Unita Hüb. Nicht von Aadorf.]

Sororcula Hfn. *F'feld* (Thur) n. s., *Sonnenberg*, *Murkart*,  
*Horben*.

Complana L. *F'feld* h.

### Zygaena Fab.

Purpuralis Brün. *F'feld* h.

ab. *Polygalae* Esp. Aadorf (Z.-R.).

\* *Scabiosae* Scheven. Hüttwilen (Vorbrodts).

Achilleae Esp. *F'feld* g.

\* *ab. semiconfluens*<sup>1</sup> Vorbrodts. Herdern, Thur, Rohr.

\* *ab. confluens* Dziuz. Rohr, Murkart, Herdern.

\* *ab. cingulata* Dziuz. Herdern.

\* *ab. viciae* Hb. Hörnli, Ochsenfurt, Herdern, Wellenbg.

\* *ab. bellis* Hb. *F'feld*.

Meliloti Esp. *F'feld* h.

\* *ab. sexmaculata* Hb. *F'feld* (Thur), Herdern, Wellenbg.

\* *ab. confusa* Stdgr. *F'feld* mehrfach.

\* *ab. confluens*<sup>1</sup> Vorbrodts. *F'feld*.

\* *var. stenzii* Frr. s. *F'feld*.

\* *var.?* *dahurica* B. 2 Exempl. mit tiefer schwarzen Vfl. und sehr breitem Saum der Hfl. von Kalchrain. Vorbrodts, dem ich sie schickte, schreibt darüber: „Die schwarzen Meliloti stimmen mit den von Pfarrer Hauri in Davos erhaltenen? *dahurica* B überein; ähnliche Stücke fing Muschamp bei Stäfa.“

Trifoli Esp. s. Aadorf (Z.-R.).

Lonicerae Esp. g.

\* *ab. centripuncta* Tutt. Weiningen.

\* *ab. trivittata* Tutt. id. Zwei Uebergangsstücke mit schmaler Verbindung der Flecken.

Filipendulae L. g.

[*ab. cytisi* Hb. Diese Form fehlt nach Vorbrodts in der Schweiz; andere paarweise Konfluenzen werden von ihm benannt werden. Solche auch von Frauenfeld.]

\* *ab. communimaculata* Selys. Hörnli.

\* *ab. dilatata*<sup>1</sup> Vorbrodts. Ochsenfurt.

<sup>1</sup> Die Namen dieser von *Vorbrodts* aufgestellten Formen sind mittlerweile wieder eingezogen und abgeändert worden.

\* *ab. confluens* Obthur. Weiningen.

*ab. unipunctata* Vorbrod<sup>1</sup> Ochsenfurt.

Transalpina Esp. (Bei F'feld bisher nicht gefangen.)

\* *ab. alpina* Bdv. Ochsenfurt, Herdern, F'feld. (Vorbrod<sup>1</sup> det.)

Carniolica Scop. (= *hedysari* Hb.). Herdern, Hörnli.

\* *Onobrychis* Schiff. Herdern. Vgl. Vorbrod<sup>1</sup> Bd. II.

### Ino Leach.

Pruni Schiff. *Steckborn* (Schalch), Aadorf öfter (Z.-R.).

Statice L. h.

[*var. manni* Ld. Elgg (Gramann).]

Globulariae Hüb. h.

### Cochlidion Hüb.

Limacodes Hfn. F'feld n. s.

### Heterogenea Knoch.

Asella S. V. Amriswil (M.-R.), *Langwiesen*, *Kohlfirst* (Wanner).

### Pachytelia Westw.

Unicolor Hfn. F'feld n. h., *Steckborn* (Schalch), *Schaaren* (Wanner).

Opacella H. S. Park von Bernrain (Himmel).

### Scioptera Rbr.

[*Plumistrella* Hüb. ?? Aadorf (Z.-R.) Nach Rebel in den südl. Hochalpen nicht unter 2000 m.

### Sterrhopteryx Hb.

Hirsutella Hüb. F'feld, *Murkart* n. s. am Licht, auch von *Ochsenfurt* und *Ittingen*.

### Epichnopteryx Hein.

Pulla Esp. n. h. F'feld (Blumenstein), *Murkart*, *Horben*.  
var. *Sieboldi* Reutti. Amriswil (M.-R.).

### Rebelia Heyl.

\* *Plumella* H. S. Horben 1 geflogenes Stück. Püngeler und Vorbrod<sup>1</sup> det. mit Fragezeichen.

### Psychidea Rbr.

\* *Bombycella* Schiff. s. s. 1 St. von Horben.

<sup>1</sup> Vergl. Fußnote auf der vorigen Seite.

**Trochilium** Scopoli.

Apiformis Cl. F'feld n. h.

**Sesia** Fab.

Sphecoformis Germ. Amriswil (M.-R.).

Cephiiformis O. Aadorf (Z.-R.) aus Hexenbesen gez.

Tipuliformis Cl. F'feld, *Steckborn* (Schalch).

Myopaeformis Bkh. *Aadorf* (Z.-R.).

Culiciformis L. Amriswil (M.-R.).

Asiliformis Rott. *Steckborn* (Schalch).

Empiformis Esp. *Hüttwilen* 2 Stück.

**Bembecia** Hb.

\* *Hylaeiformis* Lasp. s. Die Raupe von Horben in Wurzelstöcken von Himbeerstauden.

**Cossus** Fab.

Cossus L. F'feld h.

**Phragmatoecia** Newm.

Castaneae Hüb. *F'feld, Thur*, am Licht, sehr g. 1 Stück je von *Ittingen, Murkart* und *Herdern*.

**Zeuzera** Latr.

Pyrina L. s. *F'feld* 1 St. am Gas.

**Hepialus** Fab.

Humuli L. g.

Sylvinus L. *F'feld* n. h., *Sonnenberg*.

Lupulinus L. An Waldrändern h. mit pendelartigem Flug.

Hecta L. *F'feld* h. z. B. auf der großen Allmend.

## Nachtrag.

Mel. parth. Bkh.

\* ab. *albida* (nov. aberr.). O'seite aller Fl. hell weißlich; das Schwarz in Grau umgewandelt. *Herdern*.

\* Lyc. *Eumedon* Esp. Rohr 1 St., *Hüttwilen*.

\* Lar. *affinitata* Stph. Hörnli (Thurg.) 1 St.

Ell. prosap. pras. ab. *Exstincta* Wehrli. Ochsenfurt 16. VI. 13. an der gleichen Stelle das dritte Stück.

\* Teph. *valerianata* Hb. F'feld (Thur), Ochsenfurt.